FONDO PIZZOFALCONE

NAZIONALE
B. Prov.
V
131
BIBLIOTECA
VITT. EMANUELE III
NAPOLI

ECA PROVINCIALE
Armadio XIX
Palchetto 6
Num.° d' ordine 16

32.a.19



Digitized by Google

B. Shaw.
IV
131

Digitized by Google

ABRÉGÉ
DES
TRANSACTIONS
PHILOSOPHIQUES.

BOTANIQUE.

TOME PREMIER.

Seconde Partie

(Voir Preface
page XXVI)

A AIX,

Des Imprimeries de GIBELIN-DAVID & EMERIC-DAVID,
Avocats, Imprimeurs Ordinaires du Roi.

615226

ABRÉGÉ
DES
TRANSACTIONS
PHILOSOPHIQUES
DE LA
SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES.

Ouvrage traduit de l'Anglois, & rédigé par M. Gibelin, Docteur en Médecine, Membre de la Société Médicale de Londres, &c. &c.

AVEC DES PLANCHES EN TAILLE DOUCE.

BOTANIQUE.

TOME PREMIER.

A PARIS,
Chez BUISSON, Libraire, Hôtel de Coetlosquet, rue Haute-Feuille, N°. 20.

M. DCC. XC.

Avec Approbation & Privilege du Roi.

A MONSIEUR

DE BRUNY

DE LA TOUR-D'AIGUES;

Préſident au Parlement de Provence, Membre de la Société Royale d'Agriculture de Paris, &c. &c.

MONSIEUR,

Des Mémoires ſur la Botanique, l'Agriculture, le Jardinage & l'Économie rurale, tirés des Tranſactions Philoſophiques, méritent de paroître ſous les auſpices d'un vrai Philoſophe, qui joigne à une connoiſſance approfondie des productions de la Nature & des procédés des Arts, le zele le plus ardent pour leur avancement.

J'ai le bonheur de connoître en vous, Monſieur, ce Sage, dont la grande ame,

toujours ſupérieure aux événemens, n'a jamais ceſſé, dans les circonſtances les plus déſaſtreuſes, de s'occuper du progrès des Arts les plus utiles à l'Humanité. Vos Mémoires inſérés dans le Recueil publié par la Société Royale d'Agriculture de Paris en ſont une preuve ſuffiſante ; mais c'eſt ſur-tout dans votre délicieuſe retraite (*), *qu'on peut prendre une idée de ce que vous doivent les Sciences Naturelles.*

Vos amples moiſſons atteſtent l'étendue de vos lumieres en Agriculture : vos jardins, vos parcs, vos forêts renferment tous les tréſors de la Botanique : vos montagnes nourriſſent en plein air les chevres d'Angora & les brebis d'Eſpagne (**) *: vous cultivez, vous protégez les Arts & les Sciences :*

(*) La Tour-d'Aigues, ſituée à 4 lieues N. E. de la ville d'Aix en Provence.

(**) M. le Préſident de la Tour-d'Aigues a envoyé au Chevalier Banks, pour le Roi d'Angleterre, un troupeau entier de ces brebis. Sa Majeſté Britannique voulant lui témoigner le cas qu'elle fait d'un pareil préſent, & connoiſſant ſon amour pour la Botanique, a donné ordre qu'il lui ſoit expédié de ſes jardins, un aſſortiment complet des Plantes & Arbres exotiques, les plus rares & les plus précieux.

A combien de titres ne vous dois-je pas l'hommage de mon travail !

Dans tous les tems, vous avez daigné encourager mes efforts par des marques de bienveillance & d'amitié, auſſi cheres à mon cœur, que flatteuſes pour mon amour propre. Ce foible témoignage de ma reconnoiſſance ne m'acquittera point encore envers vous.

Je ſuis, avec autant d'attachement que de reſpect,

MONSIEUR;

Votre très-humble & très-obéiſſant Serviteur,
GIBELIN, D. M.

AVERTISSEMENT
DU TRADUCTEUR.

DIVERSES occupations indiſpenſables m'ont empêché de terminer auſſi-tôt que je me l'étois promis les deux Volumes de *Botanique*, *Agriculture*, &c. qui devoient ſuivre immédiatement la premiere livraiſon de mon Abrégé des Tranſactions Philoſophiques ; & des circonſtances accidentelles, inutiles à détailler ici, en ont encore retardé l'impreſſion. L'impoſſibilité où j'étois de remplir ſeul mes engagemens avec mes Souſcripteurs m'a obligé d'avoir recours à des Coopérateurs. Leur travail, dont le Public a commencé de jouir dans la ſeconde livraiſon, lui fera ſans doute regretter de ne pas voir leurs noms à la tête de tous les Volumes dont cet Ouvrage ſera compoſé. . . .

L'ordre des livraiſons que j'avois annoncé dans la Préface du premier Volume

ſe trouve interverti ; mais les Parties étant ſuffiſamment ſéparées, chacun pourra, lorſque l'Ouvrage ſera terminé, donner aux différens Volumes l'arrangement qu'il jugera convenable.

J'ai cru devoir commencer la Partie de Botanique par le Catalogue général des Plantes qui ont été préſentées, au nombre de 50 chaque année, pendant plus d'un demi-ſiecle, par la Compagnie des Apoticaires, à la Société Royale, & dont le Catalogue alphabétique a toujours été inſéré dans le Volume des Tranſactions Philoſophiques pour l'année ſuivante. Ces divers Catalogues ont été ſucceſſivement dreſſés par les ſix Auteurs qui ſuivent.

1. M. Iſaac Rand, Apoticaire, Membre de la Soc. Roy. pendant dix-huit ans, depuis le N°. 1, juſqu'au 900e.

2. M. Joſeph Miller, Apoticaire, Directeur du jardin de Chelſea, & Profeſſeur de Botanique, pendant ſept ans, depuis le 901e. juſqu'au 1250e.

3. M. John Wilmer, Docteur en Médecine, Directeur du jardin de Chelsea, & Professeur de Botanique, pendant dix-huit ans, depuis le 1251e. jusqu'au 2150e.

4. M. Guillaume Hudson, Membre de la Société Royale, Professeur de Botanique au jardin de Chelsea, pendant cinq ans, depuis le 2151e. jusqu'au 2400e.

5. M. Stanesby Alchorne, Membre de la Compagnie des Apoticaires, pendant deux ans, depuis le 2401e. jusqu'au 2500e.

6. Enfin, M. Guillaume Curtis, Professeur de Botanique au jardin de Chelsea, une seule année, depuis le 2501e. jusqu'au 2550e.

La Compagnie des Apoticaires n'étoit obligée de porter qu'à 2000, le nombre des Plantes qu'elle devoit offrir à la Société Royale, suivant la condition que lui avoit imposée le Chevalier Hans-Sloane, en lui faisant don du terrein de son jardin de Chelsea. Elle l'a porté jusqu'à 2550,

dans l'objet de ſuppléer aux doubles emplois qu'elle pouvoit avoir faits dans ſes offrandes annuelles, ſoit en préſentant à pluſieurs repriſes la même Plante ſous différens noms, ou ſous le même nom à différentes époques, ſoit en donnant pour autant d'eſpeces diſtinctes, telles que les avoit preſcrites le Donateur, un grand nombre de variétés, qui ne rempliſſoient pas ſon objet.

A l'imitation des Auteurs anglois, qui en abrégeant ſucceſſivement les Tranſactions Philoſophiques juſqu'en 1750, ont refondu, à trois repriſes, ſuivant l'ordre alphabétique, les Catalogues particuliers qui avoient paru dans les intervalles de la publication des différens Volumes de leur Abrégé, j'ai réuni tous ces différens Catalogues, & j'en ai fait un ſeul, rangé auſſi par ordre alphabétique.

Pour donner une idée du travail qu'a exigé cette refonte, il ſuffira d'obſerver que les Abréviateurs anglois n'avoient réuni que les 1400 premiers Numéros, en

trois Catalogues, qui ſont placés dans trois différens Volumes de leur Abrégé (*a*), & que le reſte ſe trouve diſtribué dans 23 Volumes des Tranſactions Philoſophiques, depuis le Volume de 1751 juſqu'à celui de 1774. Il a donc fallu compulſer à la fois 26 Volumes *in*-4°. pour placer chaque nom de Plante au rang que l'ordre alphabétique lui aſſigne....

J'ai eu ſoin de conſerver à chaque Plante le Numéro qu'elle porte dans l'original des Tranſactions Philoſophiques, & ſans doute auſſi dans l'Herbier de la Société Royale, afin que les perſonnes qui ſeront à portée de le conſulter, puiſſent y trouver & y reconnoître les Plantes ſans difficulté.

J'ai ajouté à chaque Plante autant qu'il m'a été poſſible, en ne donnant rien aux conjectures, le nom ſpécifique ou trivial de Linné; & lorſque les Auteurs du Catalogue ont employé ſa ſynonymie,

(*a*) Voyez ce que j'ai dit au ſujet de cet Ouvrage dans le Tome II de l'HISTOIRE NATURELLE, p. 117.

j'ai eu ſoin de la réformer d'après la 14e. & derniere Édition du *Syſtema Vegetabilium.* Ce travail, deſtiné à épargner aux Lecteurs l'embarras des recherches, a exigé beaucoup plus de tems & de peine que je n'en avois prévu en le commençant.

J'avois d'abord cru néceſſaire de réunir enſemble toutes les Plantes qui ſe trouvent répétées ſous différens noms ; & l'on verra par le nombre de celles qui portent pluſieurs N^os^. à la fois, que cette opération a dû coûter bien du tems. Mais l'impoſſibilité de reconnoître tous les doubles emplois ſans exception m'y a fait renoncer ; & j'y ai ſuppléé juſqu'à un certain point, en donnant à la fin du Volume une Table ſéparée des noms de Linné, qui renvoie aux différens N^os^. ſous leſquels une même eſpece peut ſe trouver déſignée dans mon Catalogue général. Cette Table ſervira de Concordance aux perſonnes qui voudront la conſulter.

Quoique j'aie par fois indiqué juſqu'aux

variétés, on verra que je n'ai pas mis par-tout le ſynonyme trivial de Linné. Souvent les Auteurs du Catalogue n'ont appliqué à une Plante qu'une phraſe de leur compoſition : ſoit que la Plante fût vraiment nouvelle, ſoit qu'ils euſſent négligé d'en rechercher la ſynonymie dans les Auteurs. Ces Plantes ainſi imparfaitement déſignées ne ſe trouvent certainement point dans Linné, du moins ſous les mêmes phraſes. Ce ne ſont la plupart du tems que des variétés, qu'il ne ſeroit peut-être pas bien difficile de rapporter à leurs eſpeces reſpectives. Mais n'ayant pas les Plantes mêmes ſous les yeux, il auroit été téméraire de ma part de prétendre les nommer. Je n'ai fait qu'ajouter à chacune de ces phraſes le nom de ſon Auteur.

Il eſt encore un grand nombre de Plantes, que je n'ai pu rapporter aux eſpeces dénommées par Linné, quoiqu'elles paroiſſent dans le Catalogue ſous des phraſes de Tournefort, des Bauhins, ou d'autres Auteurs très-connus. Pluſieurs

ſont évidemment de ſimples variétés ; mais je n'ai voulu rien haſarder. Je ne les ai point trouvées dans Linné, parce qu'il n'a preſque jamais employé que les ſynonymes des Auteurs qui ont donné des deſcriptions & des figures. Souvent j'ai été en doute ; & alors j'ai ajouté au nom trivial, ſuivant l'uſage, un point d'interrogation. Il m'auroit fallu, pour completter & perfectionner ce travail, le ſecours d'un grand nombre de livres de Botanique, qui ſont difficiles à raſſembler. Un ſeul, à la vérité, m'auroit ſuffi ; mais il n'exiſte pas. C'eſt un *Pinax*, ou une Concordance univerſelle de Botanique, dans lequel on réuniroit, ſous la Nomenclature de Linné, tous les ſynonymes de tous les Auteurs, ſans exception.

Un pareil livre ne peut ſans doute être bien fait que par un Botaniſte conſommé, qui puiſſe viſiter tous les anciens Herbiers exiſtans, & compulſer tous les livres de Botanique connus. Il eſt un homme

homme qui réunit tous les avantages néceſſaires à l'Auteur d'une pareille entrepriſe ; puiſſe-t-il en avoir l'idée & le loiſir ! C'eſt le Chevalier Banks. Son nom me diſpenſe d'en dire davantage.

Cet Ouvrage manque à la Botanique ; & tandis qu'elle s'enrichit tous les jours par de nouvelles découvertes dans toutes les parties du monde, elle laiſſe perdre une grande partie du fruit qu'on devroit retirer de la plupart des livres de Botanique, écrits avant la révolution que Linné a opérée dans cette Science ; par la raiſon qu'il eſt ſouvent impoſſible & toujours très-difficile aux Lecteurs ordinaires de ſavoir quelle eſt préciſément la Plante dont ils parlent.

J'ai fait laiſſer en blanc dans le Catalogue la place des noms générique & trivial de Linné, que je n'ai pu trouver, afin que les perſonnes plus habiles ou mieux placées que moi, puiſſent, ſi elles veulent, y ſuppléer à la main dans leur exemplaire.

Ce Catalogue pourra paroître inutile au premier coup-d'œil ; mais ſi l'on conſidere que ce n'eſt pas une ſimple liſte, priſe dans les livres ; que chacune des Plantes qui y ſont nommées & numérotées, exiſte dans l'Herbier de la Société Royale, où ſuivant l'intention du Fondateur, les Curieux ont la liberté de les examiner ; & que la plupart, ſinon toutes, ſont encore cultivées dans le jardin de Chelſea, on reconnoîtra combien ce Catalogue & le travail qu'il a exigé de ma part peuvent devenir utiles, ne fût-ce qu'en fourniſſant quelques matériaux pour la grande Concordance de Botanique, qui manque à cette Science.

La Botanique ayant été principalement enviſagée ſous ſon rapport avec l'Art de guérir, un grand nombre d'Articles ſur les Plantes appartiennent à la MATIERE MÉDICALE, & ont été effectivement employés dans le premier Volume qui a déja paru ſous ce titre. Il n'eſt conſéquemment pas reſté dans les Tranſactions

Philoſophiques un aſſez grand nombre de Mémoires ſur les différentes branches de cette Science, pour que j'aie dû en multiplier les ſubdiviſions. Je l'ai ſeulement diviſée en BOTANIQUE PROPREMENT DITE, & en PHYSIQUE VÉGÉTALE. Sous la premiere, j'ai placé tout ce qui m'a paru appartenir le plus ſpécialement à la Nomenclature & à l'Hiſtoire de cette Science; & ſous la ſeconde, ce qui a principalement rapport à l'organiſation des Végétaux.

L'AGRICULTURE n'a pas été ſuſceptible, par la même raiſon, d'être ſubdiviſée. J'en ai ſeulement détaché les Mémoires ſur le JARDINAGE, dont j'ai fait une partie ſéparée.

L'ÉCONOMIE RURALE m'a fourni un aſſez grand nombre de matériaux, parce que j'ai employé ſous ce titre pluſieurs Articles qui appartiennent plus proprement aux Arts : tels ſont les Mémoires ſur la Tannerie, ſur les Teintures, &c. Mais il a dû me ſuffire qu'ils euſſent un

rapport quelconque avec la Botanique & l'Agriculture, & par conſéquent avec l'Économie rurale, pour me déterminer à les y joindre, dans l'objet de mettre la proportion convenable entre les différentes livraiſons de cet Ouvrage.

Je me ſuis d'ailleurs conformé au plan que j'ai annoncé dans la Préface du premier Volume. J'ai élagué quand je l'ai cru néceſſaire; j'ai inſéré en entier les Mémoires courts & intéreſſants. J'ai ajouté par-tout, autant qu'il m'a été poſſible, ſoit en note, ſoit même dans le texte entre deux crochets, la Nomenclature moderne, comme néceſſaire pour fixer les idées du Lecteur ſur l'objet dont il eſt queſtion. On trouvera auſſi dans mes notes (*a*) divers éclairciſſemens, deſtinés à faciliter l'intelligence du texte.

(*a*) Ces notes ſont quelquefois intitulées *Notes du Traducteur*, quelquefois *Notes de l'Éditeur*; mais c'eſt par pure inadvertence que j'ai pris tantôt l'un, tantôt l'autre de ces titres.

J'ai eu ſoin de renvoyer à la *Collection Académique*, pour tous les Articles qui s'y trouvent, & que j'ai omis principalement par cette raiſon. Les perſonnes ſtudieuſes, à qui ſont ſpécialement deſtinées les Notices que j'ai ajoutées à la fin de chaque Partie, y trouveront ainſi une facilité de plus pour trouver les Mémoires que j'ai jugé à propos d'omettre.

Quelque peine que j'aie priſe pour donner à mon travail l'eſpece de perfection dont il étoit ſuſceptible, je ne préſume pas qu'il ne me ſoit échappé aucune erreur. Il eſt même impoſſible que dans un auſſi grand nombre de recherches qu'en a exigées le Catalogue des Plantes préſentées à la Société Royale, je n'en aie commis un aſſez grand nombre. Je ne puis que demander grace ſur ce point, ainſi que ſur mon ſtyle, auquel j'avoue que je n'ai pas eu le tems de donner toute l'attention que je devois ſans doute à la délicateſſe de mes Lecteurs.

TABLE
DES ARTICLES
CONTENUS dans ce Volume.

BOTANIQUE.
PREMIERE PARTIE.
BOTANIQUE PROPREMENT DITE.

ARTICLE PREMIER. *Catalogue des 2550 eſpeces de Plantes ; &c.* Page 1
ART. II. *Plantes rares, trouvées dans un voyage au Peck, en Derbyshire.* 257
ART. III. *Plantes obſervées dans les Alpes Tyroloiſes.* 259
ART. IV. *Plante aquatique trouvée à Bagneres, en Gaſcogne.* 261
ART. V. *Nouvelle eſpece de Fungus.* 262
ART. VI. *Établiſſement d'un nouveau genre de Plante, nommé* Salvadora. 264
ART. VII. *Sur les reſtes du jardin de Tradeſcant, à Lambeth.* 265
ART. VIII. *Détails ſur le Cannellier.* 267
ART. IX. *Notice du jardin de l'Évêque de Londres, à Fulham.* 268

ART. X. *Catalogue de quelques Plantes rares.* 272
ART. XI. *Mémoire hiſtorique ſur un genre de Plantes nommé* lichen, *&c.* 304
ART. XII. *Sur la ciguë, recommandée par le Docteur Stork.* 351
ART. XIII. *Deſcription d'une nouvelle Plante du Pérou, &c.* 353
ART. XIV. *Specimen Hiſtoriæ Naturalis volgenſis.* 355
ART. XV. *Croton ſpicatum : nova Plantæ ſpecies ex Americâ, &c.* 357
ART. XVI. *Sur les arbres qu'on ſuppoſe indigenes en Angleterre.* 358
ART. XVII. *Lettre du Docteur Ducarel, concernant les Chataigniers, &c.* 360
ART. XVIII. *Lettre de M. John Ellis, ſur une nouvelle eſpece d'*ILLICIUM, *ou d'anis étoilé.* 361
ART. XIX. *NYCTANTHES elongata : nova Planta indica, &c.* 363
ART. XX. *Sur l'époque du renouvellement de la Botanique en Angleterre, &c.* 365
ART. XXI. *Deſcription d'une Plante rare d'Amérique, du genre des brownea. Avec quelques remarques ſur ce genre.* 375
ART. XXII. *Deſcription d'une Plante, dont le ſuc eſt l'*Aſſa fœtida, 379

ART. XXIII. *Sur la qualité ſenſitive de l'arbre* Averrhoa *Carambola.* 384

ART. XXIV. *Maniere de conſerver les Plantes.* 385

ART. XXV. *Notice des Mémoires de Botanique, &c.* 387

Fin de la Table des Articles.

ERRATA.

Page 35, ligne	3, 213,	*liſez* 313.
61, ligne	28, *Coma-aurea*,	liſez *Comaurea.*
65, ligne	30, — CLUTIA,	*ôtez le filet.*
69, ligne	2, g?	liſez *c?*
Id. ligne	25, *africana*,	*liſez* africana.
76, ligne	13, antholiza,	*liſez* antholyza.
163, ligne	21, africana,	*liſez africana.*
165, ligne	21, *Lophantus*,	liſez *Lophanthus.*
192, ligne	derniere, *incana*,	*liſez* incana.
207, ligne	1, — SAPONARIA,	*ôtez le filet.*
211, ligne	30, 1011,	*liſez* 2011.
212, ligne	21, 1018,	*liſez* 2018.
221, ligne	14, *montanum*,	*liſez* montanum.
223, ligne	13, ſiſum,	*liſez* ſiſon.
225, ligne	22, *ſodomœum*,	liſez *ſodomeum.*
324, ligne	5, quien,	*liſez* qui en.
338, ligne	10, nommé,	*liſez* nommée.
355, ligne	19, *Oxicoccus*,	liſez *Oxicoccos.*

ABRÉGÉ

ABRÉGÉ
DES TRANSACTIONS PHILOSOPHIQUES.

BOTANIQUE.

PREMIERE PARTIE.
BOTANIQUE PROPREMENT DITE.

ARTICLE PREMIER.

***CATALOGUE** des 2550 especes de Plantes dont la Compagnie des Apoticaires de Londres a préſenté chaque année les exemplaires, au nombre de 50, à la Société Royale, depuis 1722, juſqu'en 1773.*

« LA Compagnie des Apoticaires de Londres établit, en 1673, un Jardin Médicinal, qu'elle a depuis enrichi d'un grand nombre de Plantes, pour

faciliter à ſes Membres l'étude de la Botanique. Le Chevalier Hans-Sloane, pour favoriſer une entrepriſe ſi utile au public, a généreuſement légué à cette Compagnie la propriété de ce Jardin, qui faiſoit partie de ſon domaine à Chelſea, à condition qu'il ſeroit entretenu, à perpétuité, comme Jardin de Plantes Médicinales; & il a obligé la Compagnie, en vertu de ce don, à préſenter, chaque année, à la Société Royale, dans une de ſes aſſemblées, 50 exemplaires de Plantes qui aient été élevées dans ce Jardin pendant l'année précédente, & qui ſoient toutes ſpécifiquement différentes les unes des autres, juſqu'à ce que le nombre de 2000 ſoit complet. Ces exemplaires, préſentés ſucceſſivement à la Société Royale, ſeront ſoigneuſement conſervés pour la ſatisfaction des perſonnes curieuſes qui pourront deſirer de les examiner. »

A

1. 1701. ABROTANUM campeſtre incanum, carlinæ odore. *C. B. P.* [Artemiſia *campeſtris.*
2. 1702. —— humile, corymbis majoribus aureis. *H. R. P.* [*Eadem.*
3. 1001. —— lini folio acriori & odorato. *T. Inſt.* Draco herba. *Park.* [Artemiſia *Dracunculus.*

4. 551. — mas anguſtifolium majus. *C. B. P.* 136. [Artemiſia *Abrotanum.*
5. 552. — mas anguſtifolium, ſegmentis foliorum tenuiſſimis. *Rand.* [
6. 601. ABSINTHIUM inſipidum, abſinthio vulgari ſimile. *C. B. P.* 139. [Artemiſia *Abſinthium. a.*
7. 602. — maritimum album. *Ger. em.* 940. Abſinth. romanum. *Off. Lond.* ramulis expanſis. *Rand.* [Artemiſia *Abſinthium.*
8. 604. — maritimum fruticoſius, ramulis erectis, tenuiſſimè diviſis foliis. *Rand.* [
9. 1651. — maritimum lavandulæ foliis. *C. B. P.* 139. [Artem. *cœruleſcens.*
10. 603. — maritimum ramulis & capitulis erectis. *Rand.* [
11. 951. — ponticum Galeni. *Ger.* [Artemiſia *pontica.*
12. 952. — tanaceti folio odoratiſſimum. *Amm. p.* 142. [Artem. *annua.*
13. 201. ABUTILON. *Dod.* 656. [Sida *Abutilon.*
14. 651. — althæodes, flore carneo, fructu globoſo. *Hort. Elt. t.* 1. [Malva *abutiloides.*
15. 452. — americanum, foliis variis, flore eleganti cœruleo, calyci inſidente. *Rand.* [
16. 453. — americanum, folio longiùs cuſpidato, fructu quinquecapſulari. *Rand.* [

17. 202. — americanum, fructu ſubrotundo pendulo, è capſulis veſicariis criſpis conflato. *Rand.* [Sida *criſpa.*

18. 1002. — americanum, ribeſii folio, flore carneo, fructu pentagono aſpero. *Houſt.* [Melochia *depreſſa.*

19. 451. — americanum, viſcoſum, graveolens, minimo flore & fructu. *Rand.* [

20. 51. — carolinianum, reptans, alceæ foliis, gilvo flore. *Rand.* [Malva *caroliniana.*

21. { 701. / 1301. } — lavateræ flore, fructu criſtato. *Hort. Elt.* [Sida *criſtata.*

22. 1401. — periplocæ acutiori folio, fructu ſtellato. *Hort. Elt.* [Sida *periplocifolia.*

23. 1101. ACACIA americana, flore albo, pinnis latiuſculis glabris, ſiliquis latis. *Houſt.* [Robinia *Pſeudacacia.*

24. 2351. ACALIPHA *virginica*, involucris femineis cordatis incifis, foliis ovato-lanceolatis petiolo longioribus. *Linn.* Mercurialis tricoccos hermaphroditica. *Pluk. Phyt. t.* 99, *f.* 4.

25. 902. ACANTHUS aculeatus. *C. B. P.* 383. [Acanthus *ſpinoſus.*

26. 901. — ſativus, vel mollis Virgilii. *C. B. P.* 383. [Acanthus *mollis.*

27. 903. — ſpinis mitioribus. *Pluk. Alm.* 6. [

28. 851. ACARNA major, caule folioſo. *C. B. P.* 379. [Cnicus *Acarna.*

29. 1851. ACER foliis trilobis integerrimis. *Fl. Leyd. Prodr.* 459. Acer trifolium. *C. B. P.* 431. [Acer *monſpeſſulanum.*

30. 351. —— fraxini foliis ſerratis. *Rand.* Acer maximum, foliis trifidis & quinqueſidis, virginianum. *Pluk. Phyt. t.* 123, *f.* 4 & 5. [Acer *Negundo.*

31. 1703. —— platanoides. *Munt. Hiſt.* [Acer *Platanoides ?*

32. 2451. —— *Pſeudoplatanus*, foliis quinquelobis, inæqualiter ſerratis, floribus racemoſis. *Linn.* Acer montanum candidum. *C. B. P.* 430.

33. 751. ACETOSA ægyptia, roſeo ſeminis involucro, folio lacero, Lippi. D. *Shaw. Phyt. Afr. Spec. N°.* 5. [Rumex *roſeus.*

34. 1102. —— arboreſcens, ex Inſulis Fortunatis. *Pluk.* [Rumex *Lunaria.*

35. 1501. —— canopica minor, Lippi. *Juſſ.* [

36. 251. —— ocymi folio, neapolitana. *C. B. P.* 114. [Rumex *bucephalophorus.*

37. 1302. —— rotundifolia repens eboracenſis, folio in medio deliquium patiente. *Mor. Hiſt.* 2. 583. [Rumex *digynus.*

38. 252. —— veſicaria peregrina. *Hort. Eyſt.* [Rumex *veſicarius.*

39. 2051. ACHILLÆA *abrotanifolia*, foliis pinnatis ſupradecompoſitis, laciniis linearibus diſtantibus. *Linn.*

40. 1652. —— *macrophylla*, foliis pinnatis, pinnis inciſo-ſerratis: extimis majoribus coadunatis. *Linn.* Ptarmica alpina, matricariæ folio. *Triumf.* 83.

41. 2101. —— *magna*, foliis bipinnatis ſubpiloſis: laciniis linearibus dentatis, auriculis decuſſatis. *Linn.*

42. {2052. 2102.} —— *Santolina*, foliis ſetaceis dentatis: denticulis ſubintegris ſubulatis reflexis. *Linn.*

43. 2053. ACHYRANTHES caule erecto, foliis ovatis, calycibus ſpicæ adpreſſis. *Wilm.* [Achyranthes *aſpera.*

44. 2151. —— lanata, caule proſtrato, ſpicis ovatis lateralibus, calycibus tomentoſis. *Mill.* Amaranthus indicus verticillatus albus, foliis lanugine incanis. *Pluk. Alm.* 27. *t.* 79, *f.* 8. Illecebrum *lanatum*, caule ſubherbaceo erecto, floribus lateralibus, foliis alternis. *Linn.*

45. 1801. ACINOS ſyriaca, folio tenuiore, capſulis hirſutis. *Mor. Hiſt.* [Ziziphora *tenuior.*

46. 1051. ACONITUM hyemale. *Ger. Park.* [Helleborus *hyemalis.*

Digitized by Google

47. 1152. —— lycoctonum cœruleum, calcari oblongo. *J. B.* [Delphinium *elatum.*

48. 1004. —— lycoctonum luteum. *C. B. P.* [Aconitum *lycoctonum.*

49. (1003.) (1351.) (2054.) —— *Napellus*, foliorum laciniis linearibus ſupernè latioribus lineâ exaratis. *Linn.* Aconitum cœruleum ſive napellus. *C. B. P.* 183.

50. 1352. —— pyrenaicum, ampliore folio tenuiùs laciniato. *T. Inſt.* 424. [Aconitum *pyrenaicum.*

51. 2301. —— *uncinatum*, floribus ſubpentagynis, foliis multilobis, corollarum galeâ longiùs extensâ. *Linn.*

52. 1151. ACORUS verus, ſive calamus aromaticus. *Off. & C. B. P.* [Acorus *Calamus. a. vulgaris.*

53. 1203. ACRIVIOLA maxima odorata, flore pleno. *Boerh.* [Tropæolum *majus.*

54. 1353. ADHATODA minor canarienſis. *Pluk.* [Juſticia *hyſſopiſolia ?*

55. 401. —— zeylanenſium. *H. L. B.* 642. [Juſticia *Adhatoda.*

56. 1201. ADIANTUM americanum. *Cornut.* [Adiantum *pedatum.*

57. 2302. —— *Capillus Veneris*, frondibus decompoſitis : foliolis alternis ; pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Linn.* Adiantum foliis coriandri. *C. B. P.* 356.

58. 1202. —— nigrum. *Offic.* [Aſplenium *Adiantum nigrum.*

59. 752. —— nigrum, radice prælongâ, arbores annoſas perreptante. *Grif. Virid. Luſit.* Filicula luſitanica, polypodii radice. *T. Inſt.* 541. [Trichomanes *canarienſe.*

60. 753. ADMIRABILIS peruviana, flore rubro. *Cluſ. Rar. Pl. Hiſt. l.* 5, *p.* 89. *Sloan. Cat. jam.* 91. [Mirabilis *Jalapa.*

61. 1153. ADONIS, aliàs cranthemum. *J. B.* [Adonis *autumnalis.*

62. 801. —— hellebori radice, buphthalmi flore. *H. L. Bat.* [Adonis *vernalis.*

63. 1451. —— ſylveſtris flore luteo, foliis longioribus. *C. B. P.* 178. [Adonis *æſtivalis.*

64. 1802. ÆGILOPS. *Lobel.* [Ægilops *ovata.*

65. 2501. ÆGOPODIUM *Podagraria*, foliis caulinis ſummis ternatis. *Linn.* Angelica ſylveſtris minor ſive erratica. *C. B. P.* 155. 3. Herba gerardi. *Ger.* 848. *fig.* 2.

66. 2055. ÆSCHYNOMENE leguminibus ſubæqualibus. *Linn.* [Æſchynomene *Sesban.*

67. 2452. ÆSCULUS *Hippocaſtanum*, floribus heptandris. *Linn.* Caſtanea folio multifido. *C. B. P.* 419.

68. 2401. ÆTHUSA *Cynapium*, foliis conformibus. *Linn.* Cicuta major, petroſelino ſimilis. *C. B. P.* 160.

69. 403. AGERATUM breviori & latiori folio. *Rand.* Ptarmica lutea ſuaveolens, corymbis longioribus & magis compactis. *T. Inſt.* 497. [Achillea *Ageratum.* (*Varietas.*)

70. 402. —— foliis ſerratis. *C. B. P.* 221. Ageratum pleriſque, herba julia quibuſdam. *J. B.* 3, *p.* 142. [Achillea *Ageratum.*

71. 404. —— hiſpanicum, amplioribus foliis; floſculis minoribus. *Rand.* [

72. 354. AGRIMONIA minor flore albo. *H. C. Boerh. Ind.* [

73. 352. —— odorata. *Cam. Hort.* [Agrimonia *eupatoria.* (*Var.*)

74. 353. —— officinarum. *T. Inſt.* 301. [Agrimonia *eupatoria.*

75. 1154. —— orientalis humilis, radice craſſiſſimâ repente, fructu in ſpicam brevem & denſam congeſto. *T. Cor.* 21. [Agrimonia *repens.*

76. 1303. AGRIMONOIDES. *Col. Ec.* 1. 145. [Agrimonia *Agrimonoides.*

77. 2352. AGROSTIS *canina*, calycibus elongatis, petalorum ariſtâ dorſali recurvâ, culmis proſtratis ſubramoſis. *Linn.* Gramen ſupinum caninum paniculatum, folio varians. *C. B. P.* 1.

78. 2353. —— *capillaris*, paniculâ capillari patente, calycib. ſubulatis æqualibus hiſpidiuſculis coloratis, floſculis muticis. *Linn.* Gramen

montanum, paniculâ ſpadiceâ delicatiore. *C. B. P.* 3.

79. 2202. — *miliacea*, petalo exteriore ariſtâ terminali rectâ ſtriatâ mediocri. *Linn.*

80. 2355. — paluſtris, paniculâ coarctatâ muticâ, calycibus æqualibus, hiſpidiuſculis coloratis; culmo repente. *Hudſ. Fl. Angl.* 27. Gramen miliaceum majus, paniculâ ſpadiceâ. *Pet. Conc. Gram.* 118. *Raii Syn.* 464. [Agroſtis *alba*.

81. 2201. — *Spica venti*, petalo exteriore ariſtâ terminali rectâ ſtriatâ mediocri. *Linn.*

82. 2354. — *ſtoloniſera*, paniculæ ramulis patentibus muticis, culmo repente, calycibus æqualibus. *Linn.* Gram. caninum ſupinum minus. *Vaill. Par.* 86.

83. 2203. AIRA *cæſpitoſa*, foliis planis, paniculâ patente, petalis baſi villoſis ariſtatiſque, ariſtâ rectâ brevi. *Linn.* Gramen ſegetum, paniculâ arundinaceâ. *C. B. P.* 3. *Theatr.* 35.

84. 2204. — *caryophyllea*, foliis ſetaceis, paniculâ divaricatâ, floribus ariſtatis diſtantibus. *Linn.* Gramen geniculatum, locuſtis purpuro-argenteis, annuum. *Raii Syn.* 407.

85. 2356. — *præcox*, foliis ſetaceis : vaginis angulatis, floribus paniculato-ſpicatis, floſculis baſi ariſtatis. *Linn.* Gramen parvum præcox, paniculâ laxâ caneſcente. *Raii Syn. p.* 407, *t.* 22, *f.* 2.

86. 2462. AJUGA *reptans*, glabra, ſtolonibus reptantibus. *Linn.* Conſolida media pratenſis cœrulea. *C. B. P.* 260.

87. 454. ALATERNOIDES africana, ericæ foliis, floribus albicantibus & muſcoſis. *H. Amſt.* 11, *p.* 1. [Phylica *ericoides*.

88. 1204. — africana, telephii Imperati folio. *H. Amſt.* [Clutia *Alaternoides*.

89. 253. ALCEA afra fruteſcens, folio groſſulariæ, flore parvo rubro. *Boerh. Ind. Alt.* 271. [Malva *capenſis*.

90. 254. — afra fruteſcens, groſſulariæ folio ampliore; unguibus florum atro-rubentibus. *Rand.* [

91. 2251. — *ficifolia*, foliis palmatis. *Linn.* Malva roſea, folio ficûs. *C. B. P.* 315.

92. 953. — tenuifolia criſpa. *J. B.* [Malva *criſpa ?*

93. 1502. — virginiana, ricini folio. *Fl. Lugd. Bat.* 2. 12. Althæa virginiana ricini folio. *H. L.* 23. *Icon.* [Napæa *lævis*.

94. 1901. —— vulgaris major, flore ex rubro roſeo. *C. B. P.* 316. [Malva *Alcea.*

95. 152. ALCHIMILLA alpina pubeſcens, minor. *H. Reg. Par.* [Alchemilla *alpina. b. hybrida.*

96. 1251. —— alpina quinquefolii folio, ſubtùs argenteo. *T. Inſt.* 218. [Alchemilla *alpina.*

97. 255. —— montana minima. *Col. Ecphr.* 146. [Aphanes *arvenſis.*

98. 151. —— vulgaris. *C. B. P.* 319. [Alchemilla *vulgaris.*

99. 501. ALKEKENGI americanum, foliis ſinuatis, hirſutum. *Houſt.* [

100. 203. —— barbadenſe patulum, parvo flore, fructu amplo, mucrone productiori. *Rand.* [

101. 205. —— curaſſavicum, foliis origani incanis, flore vietè ſulphureo, fundo purpureo. *Boerh. Ind. Alt.* 2, *p.* 66. [Phyſalis *curaſſavica.*

102. 204. —— indicum majus. *T. Inſt.* [Phyſalis *angulata.*

103. 206. —— verticillato ſimile; foliis anguſtioribus, utrinque acuminatis. *Rand.* [

104. 207. —— virginianum perenne majus; flore luteo amplo; fructu minimo. *Rand.* [Phyſalis *penſylvanica.*

105. 2252. ALLIUM *carinatum*, caule planifolio

bulbifero, ſtaminibus ſubulatis. *Linn.* Allium umbellâ bulbiferâ, vaginâ bicorni, foliis carinatis. *Hall. Al.* 27, *tab.* 1, *f.* 2.

106. 1751. — Sylveſtre latifolium, *C. B. P.* 74. Allium urſinum bifolium vernum ſylvaticum. *J. B.* 2. 565. [Allium *urſinum.*

107. 1205. ALNUS nigra. *Offic.* [Rhamnus *Frangula.*

108. 2206. ALOPECURUS agreſtis, ſpicâ cylindricâ longiſſimâ glumis glabris, culmo erecto. *Hudſ.* 23. Gramen typhoides, ſpicâ anguſtiore. *C. B. P.* 4. Alopecurus *agreſtis*, culmo ſpicato erecto, glumis lævibus. *Linn.*

109. 2208. — *bulboſus*, ſpicâ cylindricâ, culmo erecto, radice bulboſâ. *Linn. Hudſ. Fl. Angl.* 24. Gramen myoſuroides nodoſum. *Raii Syn.* 397.

110. 2207. — *geniculatus*, culmo ſpicato infracto, corollis muticis. *Linn.* Gramen aquaticum geniculatum ſpicatum. *C. B. P.* 3.

111. 2209. — *monſpelienſis*, paniculâ ſubſpicatâ, calycibus ſcabris, corollis ariſtatis. *Linn.* Gramen alopecuroides anglobritannicum maximum. *C. B. P.* 4.

112. 2210. — *paniceus*, paniculâ ſubſpicatâ, glumis villoſis, corollis ariſtatis

Linn. Gramen alopecurum minus, ſpicâ vireſcente divulsâ. *Barr. Ic.* 115, *f.* 1.

113. 2205. — pratenſis, paniculâ cylindricâ ſpiciformi, glumis villoſis, culmo erecto. *Hudſ. Fl. Angl.* 23. Gramen phalaroides, ſpicâ molli. *C. B. P.* 4. Alopecurus *pratenſis*, culmo ſpicato erecto, glumis villoſis, corollis muticis. *Linn.*

114. 1852. ALSINE marina, foliis portulacæ. *Fl. Pruſſ. p.* 12. *Ic.* 2. Anthyllis maritima centifolia. *C. B. P.* 282. Alſine centifolia, ſeu alſine cruciata marina. *Ger. Em.* 622. [Polycarpon *tetraphyllum?*

115. 258. ALTHÆA arborea, folio amplo ſerrato. *Rand.* [

116. 259. — Dioſcoridis & Plinii. *C. B. P.* 315. [Althæa *officinalis.*

117. 260. — Dioſcoridis & Plinii, folio magis undulato. *T. Inſt.* 97. [(*Eadem. Var. b.*)

118. 257. — fruteſcens, bryoniæ folio. *C. B. P.* 316. [Malva *bryonifolia.*

119. 256. — fruteſcens, folio acuto, parvo flore. *C. B. P.* 316. [Lavatera *olbia.*

120. 1452. — fruteſcens, luſitanica, folio rotundiori undulato. *T. Inſt.* [

121. 1252. ALYSSOIDES incanum, foliis ſinuatis. *T. Inſt.* 218. [Alyſſum *ſinuatum.*

122. 702. ALYSSON alpinum, hirſutum, luteum. *T. Inſt.* 217. Leucoium luteum aizoides montanum. *Col.* 2, 62. [Draba *aizoides.*

123. 1253. —— creticum, foliis angulatis, flore violaceo. *T. Cor.* 15. [Alyſſum *deltoideum.*

124. 1254. —— creticum, ſaxatile, foliis undulatis, incanis. *T. Cor.* 15. [Alyſſum *ſaxatile.*

125. 1304. —— fruticoſum incanum. *T. Inſt.* [Alyſſum *incanum.*

126. 1503. —— incanum luteum, ſerpylli folio, majus. *T. Inſt.* 217. Thlaſpi minus quibuſdam, aliis alyſſon minus. *J. B.* 2. 928. Clypeola. *Linn. Gen.* 650. [Alyſſum *calycinum.*

127. 53. —— veronicæ folio. *T. Inſt.* 217. Burſa paſtoris major, loculo oblongo. *C. B. Prodr.* [Draba *muralis.*

128. 455. AMARANTHOIDES humile, polygoni folio. *Sloan. H. Jam. t.* 37, *f.* 2. [Illecebrum *polygonoides.*

129. 955. —— lychnidis folio, capitulis argenteis. *T. Inſt.* [Gomphrena *globoſa.*

130. 956. —— lychnidis folio, capitulis purpureis. *Miller.* [(*Eadem.* (*Var.*)

131. 2357. AMARANTHUS *græcizans*, glomerulis triandris axillaribus, foliis lanceolatis obtuſis repandis. *Linn.*

132. 954. —— maximus. *Offic.* Purpureus major. *Park.* [Amaranthus *caudatus.*

133. 2103. —— *oleraceus*, glomeribus triandris pentandriſque, foliis ovatis obtuſiſſimis emarginatis rugoſis. *Linn.*

134. 1155. —— ſiculus ſpicatus. *Bocc.* [Achyranthes *aſpera. a. ſicula.*

135. 2253. —— *ſpinoſus*, racemis pentandris cylindricis erectis, axillis ſpinoſis. *Linn.* Amaranthus indicus ſpinoſus, ſpicâ herbaceâ. *Herm. L. B.* 31, *t.* 33.

136. 2001. AMARYLLIS *Atamaſco*, ſpathâ uniflorâ, corollâ æquali, piſtillo declinato. *Linn.* Lilio-narciſſus virginienſis. *Catesby. Carol.* 3, *p.* 12.

137. 2358. —— *lutea*, ſpathâ uniflorâ, corollâ æquali, ſtaminibus declinatis. *Linn.* Colchicum luteum. 1. majus. *C. B. P.* 69.

138. 261. AMBROSIA gigantea inodora; foliis aſperis trifidis. *Baniſt. Cat. Raii Hiſt. Ap.* 1928. [Ambroſia *trifida. b.*

139. 1803. —— maritima. *C. B. P.* 138. Ambroſia quibuſdam. *J. B.* 3. 190. [Ambroſia *maritima.*

140. 52. —— maritima artemiſiæ foliis inodoris, elatior. *H. L. B.* [Ambroſia *elatior.*

141.

141. 1704. AMELANCHIER. *Lobel.* [Meſpilus *Amelanchier.*

142. 1653. AMETHYSTEA *cærulea. Linn.* Amethyſtina montana erecta, foliis exiguis digitatis trifidis ſerratis, floſculis cum comâ è cæruleo jauthinis. *Amm. Ruth.* 54.

143. 1005. AMMI majus. *Offic. C. B. P.* 159. [Ammi *majus.*

144. 456. —— majus, foliis plurimùm inciſis & nonnihil criſpis. *C. B. P.* 159. [*(Ejuſd. var. a.)*

145. 208. —— perenne. *Mor. Umb.* 22. [Sium *Falcaria.*

146. 703. AMYGDALUS Sativa. *C. B. P.* 441. [Amygdalus *communis. b.*

147. 1752. ANACAMPSEROS flavo flore. *Amm. Ruth.* 96. [Sedum *Aizoon.*

148. 1551. ANAGALLIS cærulea, foliis binis terniſve ex adverſo naſcentibus. *C. B. P.* [Anagallis *Monelli.*

149. 1301. ANANTHOCYCLUS coronopi folio. *Vaill.* [Cotula *coronopifolia.*

150. 355. ANAPODOPHYLLON canadenſe Morini. *T. Inſt.* 239. [Podophyllum *peltatum.*

151. 2104. ANASTATICA *hierochuntica*, foliis obtuſis, ſpicis axillaribus breviſſimis, ſiliculis ungulatis ſpinoſis. *Linn.*

152. 1705. ANCHUSA lutea minor. *J. B.* 3. 583. Bugloſſum luteum annuum mi-

nimum. *T. Inſt.* 134. [Myoſotis *apula.*

153. 1006. — purpurea. *Park.* [

154. 1753. — *undulata*, ſtrigoſa, foliis linearibus dentatis, pedicellis bracteâ minoribus, calycibus fructiferis inflatis. *Loeſl. Linn.*

155. 2152. ANDRACHNE *Telephioides* procumbens herbacea. *Linn.* Telephioides græcum humifuſum, flore albo. *T. Cor.* 50. *Dill. Hort. Elt.* 377, *t.* 282, *f.* 364.

156. 1902. ANDROMEDA *mariana*, pedunculis aggregatis, corollis cylindricis, foliis alternis ovatis integerrimis. *Linn.*

157. 2453. — *polifolia*, pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Linn.* Erica humilis, roſmarini foliis, unedonis flore, capſulâ ciſtoide. *Pluk. Alm. tab.* 175, *f.* 3.

158. 2303. ANDROPOGON *Iſchæmum*, ſpicis digitatis plurimis, floſculis ſeſſilibus ariſtato muticoque, pedicellis lanatis. *Linn.* Gramen dactylon, ſpicis villoſis. *C. B. P.* 8.

159. 1403. ANDROSACE vulgaris latifolia annua. *T. Inſt.* 123. [Androſace *maxima.*

160. 754. ANDROSÆMUM maximum fruteſcens. *C. B. P.* 280. [Hypericum *Androſæmum.*

161. 1951. ANEMONE caule dichotomo, foliis ſuperioribus ſeſſilibus amplexicaulibus palmatis. *Wilmer.* [Anemone *penſylvanica.*

162. 2403. — *nemoroſa*, ſeminibus acutis, foliolis inciſis, caule unifloro. *Linn.* Anemone nemoroſa, flore majore. *C. B. P.* 176.

163. 2404. — *thalictroides*, floribus umbellatis, foliis caulinis ſimplicibus verticillatis, radicalibus biternatis. *Linn.* Ranunculus nemoroſus, aquilegiæ foliis virginianus, aſphodeli radice. *Pluk. Alm.* 310, *t.* 106, *f.* 4.

164. 1. — virginiana, tertiæ Matthioli ſimilis, flore parvo. *Par. Bat.* 18. [Anemone *virginiana.*

165. 457. ANEMONOSPERMOS afra; folio jacobeæ, tenuiter laciniato, flore aurantio pulcherrimo. *Boerh. Ind. Alt.* 100. [Arctotis *aſpera. b.*

166. 458. — africana, folio cardui benedicti, florum radiis intùs albicantibus. *Hort. Amſt.* 2. 45. [Arctotis *aſpera?*

167. 1404. — africana, folio & facie taraxaci incànis. *Boerh.* [Arctotis *calendulacea. b. hypochondriaca.*

168. 459. — africana, folio minùs laciniato, flore intùs aureo, foris punicante. *Rand.* [Arctotis *anguſtifolia?*

169. 2056. ANGELICA *lucida*, foliolis æqualibus ovatis inciſo-ſerratis. *Linn.*

170. 1504. ANGURIA americana, fructu echinato eduli. *T. Inſt.* 107. Anguriæ folio, fructu ovi figurâ & magnitudine, ad maturitatem pallido, ſpinoſis tuberculis, momordicæ inſtar muricato. *Pluk. Phyt. t.* 170, *f.* 3. [Cucumis *Anguria.*

171. 957. ANISUM officinarum herbariis. *C. B. P.* [Pimpinella *Aniſum.*

172. 802. ANONIS alopecuroides mitis annua, purpuraſcens. *H. Elt.* 28. [Ononis *mitiſſima.*

173. 301. —— americana, folio latiori ſubrotundo. *T. Inſt.* 409. [Crotalaria *incana.*

174. 632. —— americana ſupina, medicaginis facie; ſiliquis latis planis. *Rand.* [

175. 704. —— caroliniana, ramoſiſſima, erecta; floribus albis laxè ſpicatis, ſiliquis inflexis. *Rand.* [

176. 553. —— flore minimo; ſiliquis craſſis, in foliorum alis ſeſſilibus. *Rand.* Ononis lutea ſylveſtris, minima. *Col. Ec.* 104. [Ononis *minutiſſima.*

177. 1007. —— non ſpinoſa, viſcida, hirſuta, odore theriacæ. *Hort. Cath.* [Ononis *Natrix. c.*

178. 405. —— pulchra viſu, folio ciceris; ornithopodii ſiliquis, annuentibus. *Horth. Cath.* 18. [

179. 1306. —— purpurea, ſpicata, alopecuroides major. *Boerh.* [Ononis *alopecuroides.*

180. 1654. - - purpurea verna ſeu præcox, perennis fruteſcens, flore albo amplo. *Mor. Hiſt.* 2. 170. Cicer arboreum perenne. *Zan.* 66. [Ononis *fruticoſa.*

181. 1453. —— viſcoſa ſpinis careus lutea major. *C. B. P.* [Ononis *Natrix.*

182. 2304. ANTHEMIS *maritima*, foliis pinnatis denticulatis carnoſis nudis punctatis, caule proſtrato, calycibus ſubtomentoſis. *Linn.* Matricaria maritima. *C. B. P.* 134.

183. 2305. —— *mixta*, foliis ſimplicibus dentato-laciniatis. *Linn.* Chamæmelum annuum ramoſum, coronopi folio, flore mixto. *Hiſt. Ox.* 3. 36.

184. 2057. ANTHERICUM *annuum*, foliis carnoſis ſubulatis teretiuſculis, ſcapo ſubracemoſo. *Linn.*.

185. 905. ANTHORA. *Off.* Aconitum ſalutiferum, ſive anthora. *C. B. P.* [Aconitum *Anthora.*

186. 2211. ANTHOXANTHUM *odoratum*, ſpicâ oblongâ ovatâ, floſculis ſubpedunculatis ariſtâ longioribus. *Linn.* Gramen pratenſe, ſpicâ flaveſcente. *C. B. P.* 3.

187. 2306. ANTHYLLIS *Vulneraria*, herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, ca-

pitulo duplicato. *Linn.* Vulneraria ſupina, flore coccineo. *Dill. H. Elt.* 431, *t.* 320, *f.* 413.

188. 502. ANTIRRHINUM anguſtifolium majus peregrinum, ruberrimo flore. *H. R. P.* [

189. 904. — anguſto folio linariæ, eleganter variegato, flore rubro, rictu luteo. *Boerh.* [

190. 503. — arvenſe majus, italicum, majore flore, ex albo purpuraſcente. *Rand.* [

191. 2405. — *bipunctatum*, foliis linearibus glabris: inferioribus quaternis, caule erecto paniculato, floribus ſpicato-capitatis. *Linn.* Linaria lutea parva annua. *B. Hiſt.* 3. 457.

192. 2002. — *geniſtifolium*, foliis lanceolatis acuminatis, paniculâ virgatâ flexuosâ. *Linn.* Linaria geniſtæ folio glauco. *Herm. Par. App.* 9.

193. 2406. — *Orontium*, corollis ecaudatis, floribus ſubſpicatis, calycibus corollâ longioribus. *Linn.* Antirrhinum arvenſe majus. *C. B. P.* 212.

194. 1601. — ſiculum, linariæ folio, niveo flore. *Tilli.* [

195. 2105. — *triſte*, foliis linearibus ſparſis: inferioribus oppoſitis, nectariis

ſubulatis, floribus ſubſeſſilibus. *Linn.*

196. 408. APARINE minima D. Sherard. *Raii Syn. Ed.* 2. 118. [Galium *pariſienſe.*

197. 406. — ſemine coriandri ſaccharati. *Park. Th.* 567. [Valantia *Aparine.*

198. 407. — ſemine læviore. *Raii Hiſt.* 484. [Galium *ſpurium.*

199. 504. APARINES FOLIO anomala, vaſculo ſeminali rotundo, multa ſemina continente. *Sloan. Cat. Jam. p.* 50. *Hiſt. t.* 7, *f.* 4. [Ammannia *latifolia.*

200. 906. APHACA. *Park.* Lathyrus luteus annuus, foliis convolvuli minoris. *Mor.* [Lathyrus *Aphaca.*

201. 605. APIUM dulce, radice rapaceâ. *D. Juſſieu.* [

202. 2407. — *graveolens*, foliis caulinis cuneiformibus. *Linn.* Apium paluſtre, ſive apium officinarum. *C. B. P.* 154.

203. 606. — macedonicum. *C. B. P.* Petroſelinum macedonicum. *Off.* [Bubon *macedonicum.*

204. 607. — pyrenaicum, thapſiæ facie. *T. Inſt.* 305. [Crithmum *pyrenaicum.*

205. 608. — thapſiæ facie majus & elatius. *Rand.* Apium petreum ſive montanum album. *J. B. Pariſien-*

ſium. [Athamanta *Libanotis.*

206. 609. —— thapſiæ facie medium. *Rand.* [

207. 356. APOCYNOIDES ſubhirſuta; floribus aurantiis. *Rand.* [

208. 505. APOCINUM americanum, evonymi folio, flore ex albo virente, à D. Houſton. *Rand.* [

209. 460. —— americanum, foliis androſæmi majoris, flore lilii convallium ſuavè rubentis. *H. R. P.* [Apocinum *androſæmifolium.*

210. 1655. —— americanum ſcandens, vincæ pervincæ foliis, ſubincanum. *Par. Bat.* [Periploca *africana.*

211. 461. —— erectum, folio oblongo, flore umbellato, petalis coccineis reflexis. *Sloan. Hiſt.* 1. 206. *t.* 129, *f.* 4 & 5. [

212. 302. —— fruteſcens; ſalicis folio anguſto. *Rand.* An apocinum erectum, africanum, villoſo fructu; ſalicis folio glabro anguſto. *Par. Bat.* 24? [Aſclepias *fruticoſa?*

213. 1354. —— majus ſyriacum rectum. *Cornut.* 91. [Aſclepias *ſyriaca.*

214. 462. —— minus rectum canadenſe. *Cornut.* 93. [Aſclepias *incarnata.*

215. 209. —— ſcandens africanum, convolvuli minoris folio & caule hirſutis. *Pluk. Phyt. t.* 137, *f.* 4. [Periploca *africana.*

216. 1306. AQUILEGIA hortenſis multiplex, flore magno pleno. *C. B. P.* [Aquilegia *vulgaris. c.*

217. 1656. —— pumila præcox canadenſis. *Cornut.* [Aquilegia *canadenſis.*

218. 2454. —— *vulgaris*, nectariis incurvis. *Linn.* Aquilegia ſylveſtris. *C.B. P.* 144.

219. 357. ARACUS q. vicia ſegetum; ſingularibus ſiliquis glabris. *C. B. P.* 345. [Ervum *tetraſpermum.*

220. 755. ARALIA canadenſis. *T. Inſt.* 300. Panaces carpimon, ſive racemoſa canadenſis. *Cornut.* 74. [Aralia *racemoſa.*

221. 1052. ARBUTUS folio ſerrato. *C. B. P.* [Arbutus *Unedo.*

222. 2455. —— *Andrachne*, caule arboreo, foliis glabris integerrimis ſerratiſque, baccis polyſpermis. *Linn.* Arbutus folio non ſerrato. *C.B. P.* 460.

223. 1552. ARCTOTIS foliis ovatis dentatis, petiolis longiſſimis, ſupernè dentatis, caule ramoſo. *Fl. Leyd. Prod.* Anemonoſpermos africana, foliis plantaginis, flore ſulphureo. *Com. Rar. Pl. fig.* 35. [Arctotis *acaulis.*

224. 1706. —— ramis decumbentibus, foliis lineari-lanceolatis, rigidis, ſubtùs argenteis, flore magno aureo, pediculo longiſſimo. *Mill. Ic.* [Gorteria *rigens.*

225. 1156. ARISTOLOCHIA clematitis recta. *Off. & C. B. P.* [Ariſtolochia *Clematitis.*

226. 1903. —— longa vera. *C. B. P.* 107. *Offic.* 47. [Ariſtolochia *longa.*

227. 1355. —— piſtolochia cretica. *Wilm.* [Ariſtolochia *ſempervirens.*

228. 653. —— rotunda, flore ex purpurâ nigro. *C. B. P.* [Ariſtolochia *rotunda.*

229. 2456. ARTEMISIA *Dracunculus*, foliis lanceolatis glabris integerrimis. *Linn.* Dracunculus hortenſis. *C. B. P.* 98.

230. 2457. —— *vulgaris*, foliis pinnatifidis planis inciſis ſubtùs tomentoſis, racemis ſimplicibus recurvatis, florum radio quinquefloro. *Linn.* Artemiſia vulgaris major. *C. B. P.* 137.

231. 1008. ARUM africanum flore albo. *Par. Bat.* [Calla *æthiopica.*

232. 1207. —— maximum quod colocaſia vulgò, caulibus nigricantibus. *Hort. Lugd.* [Arum *Colocaſia ?*

233. 1053. —— venis albis, lituris nigris maculatum. *H. R. P.* [Arum *maculatum.*

234. 1804. —— zeylanicum, humile latifolium, piſtillo purpureo. *Mill.* [Arum *trilobatum.*

235. 409. ARUNDO arborea indica; amplo pediculato folio. *Rand.* Bambu altera ſpecies. *Raii Hiſt.* 1316. Beesha. *Hort. Mal. Tom.* 5, *t.* 60. [Arundo *Bambos.*

236. 1307. ASARINA caule erecto ramoſo, foliis

oblongis acutis ſeſſilibus, floribus erectis. *Wilm.* [

237. 1255. ASARUM. *Dod. Pempt.* 358. *Offic.* 54. [Aſarum *europæum.*

238. 1952. —— americanum majus. *H. R. P. Offic.* 55. [Aſarum *canadenſe.*

239. 610. ASCLEPIAS albo flore. *C. B. P.* 303. Aſclepias ſive vincetoxicum multis, floribus albicantibus. *J. B.* 2. 138. Vincetoxicum. *Dod. Pempt.* 407. [Aſclepias *Vincetoxicum.*

240. 611. —— anguſtifolia, flore flaveſcente. *H. R. P.* [(*Præcedentis varietas. a.*)

241. 2307. —— *curaſſavica*, foliis lanceolatis glabris nitidis, caule ſimplici, umbellis erectis ſolitariis lateralibus. *Linn.* Apocynum radice fibroſâ, petalis coccineis, corniculis croceis. *Dill. H. Elt.* 34, *t.* 40, *f.* 33.

242. 2003. —— *variegata*, foliis ovatis rugoſis nudis, caule ſimplici, umbellis ſubſeſſilibus: pedicellis tomentoſis. *Linn.*

243. 1904. —— *verticillata*, foliis revolutis linearibus verticillatis, caule erecto. *Linn.*

244. 1953. ASCYRUM balearicum fruteſcens, maximo flore luteo, foliis minoribus ſubtùs verrucoſis. *Salvadore.* [Hypericum *balearicum.*

245. 2308. —— *hypericoides*, foliis oblongis,

ramis ancipitibus. *Linn.* Hypericum pumilum ſempervirens, caule compreſſo ligneo, ad bina latera alato, flore luteo tetrapetalo. *Pluk. M.* 104. *Raii Hiſt.* 3. 495.

246. 1707. — magno flore. *C. B. P.* 280. [Hypericum *Aſcyron.*

247. 1454. ASPALATHUS fruteſcens minor anguſtifolius, cortice aureo. *Amm.* [Robinia *pygmæa.*

248. 959. ASPARAGUS aculeatus, ſpinis horridus. *C. B. P.* [Aſparagus *horridus.*

249. 958. — ſylveſtris, tenuiſſimo folio. *C. B. P.* [Aſparagus *officinalis. b.*

250. 262. ASPERUGO vulgaris. *T. Inſt.* 135. [Aſperugo *procumbens.*

251. 2058. ASPERULA *cynanchica*, foliis quaternis linearibus: ſuperioribus oppoſitis, caule erecto, floribus quadrifidis. *Linn.*

252. 1208. — odorata, flore albo. *Offic. & Dod.* [Aſperula *odorata.*

253. 1708. ASPHODELUS allobrogicus, magno flore lilii. *H. L.* 65. [Hemerocallis *Liliaſtrum.*

254. 1905. — foliis planis, caule ramoſo, floribus ſparſis. *Dict. Hort. Ic.* [

255. 2309. ASPLENIUM *Ruta muraria*, frondibus alternatim decompoſitis, foliolis cuneiformibus crenulatis. *Linn.*

Digitized by Google

256. 1754. — ſive ceterach. *J. B.* 3. 749. *Off.* 121. [Aſplenium *Ceterach.*

257. 153. ASTER americanus belvideræ foliis, floribus ex cœruleo albicantibus, ſpicis prælongis. *Pluk. Phyt. tab.* 78, *f.* 5. [Aſter *tenuifolius.*

258. 614. — americanus, latiſſimo aurito & ſerrato folio, floribus albidis umbellatim diſpoſitis. *Rand.* An aſter canadenſis, foliis imis amplioribus cordatis & ſerratis. *D. Sarrazin. Ac. Reg. Par.* 1720? [Aſter *macrophyllus?*

259. 615. — americanus præcox, anguſtifolius, parvo albente flore. *Rand.* [

260. 303. — americanus ſerotinus altiſſimus, folio brevi caulem ambiente. *Rand.* [

261. 613. — annuus, foliis variis, flore amplo, peramœnè purpureo: Kiangſita ſinenſis. *D. Juſſ.* Aſter chenopodii folio, annuus, flore ingenti, ſpecioſus. *Rand.* [Aſter *chinenſis.*

262. 1157. — atticus cœruleus vulgaris. *C. B. P.* [Aſter *Amellus.*

263. 1406. — cœruleus ſerotinus fruteſcens. *Tradeſc.* [

264. 1709. — caule ramoſo ſcabro perenni, foliis ovatis ſeſſilibus, pedunculis nudis unifloris. *Mill. Ic.* [Cineraria *Amelloides.*

265. 1853. — foliis lanceolatis acutis ſcabris, caule ſimplici, floribus umbellatis terminalibus. *Dict. Hort.* After ramoſus annuus canadenſis. *Mor. Hiſt.* [After *annuus.*

266. 1954. — *fruticuloſus*, foliis linearibus punctatis, pedunculis unifloris nudis. *Linn.*

267. 156. — maritimus flavus, crithmum chryſanthemum dictus. *Raii Hiſt.* 268. [Inula *crithmifolia.*

268. 55. — montanus, ſalicis glabro folio. *C. B. P.* 266. [Inula *ſalicina.*

269. 616. — Novæ Angliæ, linariæ foliis, chamæmeli floribus. *Par. Bat.* 96. [After *dumoſus.*

270. 54. — peregrinus, ciſti folio non crenato, flore magno luteo. *Pluk. Phyt. t.* 16, *f.* 2. [

271. 612. — ramoſus, annuus, canadenſis. *T. Inſt.* 482. [After *annuus.*

272. 2359. — *tenellus*, foliis ſubfiliformibus aculeato - ciliatis, pedunculis nudis, calycibus hemiſphæricis æqualibus. *Linn.*

273. 1405. — tripolii flore. *C. B. P.* [After *acris.*

274. 154. — virginianus anguſtifolius, ſerotinus, parvo albente flore. *Park. Th.* 132. [After *Tradeſcanti.*

275. 617. — virginianus latifolius, præcocior, purpuraſcente parvo flore. *Park. Th.* Afteriſcus latifolius

autumnalis. *Cornut.* 64. [After *cordifolius?*

276. 155. —— virginianus pyramidatus, hyſſopi foliis aſperis, calycis ſquamulis foliaceis. *Rand.* [After *grandiflorus?*

277. 506. ASTERISCUS annuus luſitanicus odoratus. *Boerh. Ind. Alt.* 105. [Buphthalmum *aquaticum.*

278. 803. —— coronæ ſolis flore & facie. *H. Elt.* 42. [Silphium *Aſteriſcus.*

279. 1455. —— fruteſcens, leucoii foliis viridibus & ſplendentibus. *H. Elt.* [Buphthalmum *arboreſcens.*

280. 1209. —— perennis maritimus patulus. *T. Inſt.* [Buphthalm. *maritimum.*

281. 1054. ASTEROIDES alpina, ſalicis folio. *T. Inſt.* [Buphthalmum *grandiflorum.*

282. 1308. ASTRAGALUS annuus, anguſtis floribus, pedicellis longis. *T. Inſt.* [Aſtragalus *Stella.*

283. 2059. —— chinenſis, cauleſcens procumbens, capitulis pedunculatis, leguminibus priſmaticis rectis triquetris, apice ſubulatis. *Wilm.* [Aſtragalus *bœticus?*

284. 2106. —— *contortuplicatus*, cauleſcens procumbens, leguminibus contortuplicatis canaliculatis villoſis. *Linn.*

285. 507. —— humilis, ornithopodii foliis villoſis, ſiliquis propendentibus bre-

vibus, in ſpicam congeſtis. *Rand.* [

286. 1256. — luteus annuus, monſpeliacus procumbens. *Mor. Hiſt.* [Aſtragalus *hamoſus.*

287. 1310. — luteus perennis procumbens vulgaris, ſive ſylveſtris. *Mor. Hiſt.* [Aſtragalus *glycyphyllos.*

288. 1103. — luteus perennis, ſiliquâ gemellâ rotundâ. *T. Inſt.* [Aſtragalus *Cicer.*

289. 1309. — orientalis altiſſimus, galegæ foliis. *T. Inſt.* [Aſtragalus *galegiformis.*

290. 1505. — orientalis maximus incanus erectus, caule ab imo ad ſummum florido. *T. Cor.* 29. [Aſtragalus *chriſtianus.*

291. 852. — perennis, hirſutus, alopecuroides, galegæ foliis, floribus luteis. *Rand.* [

292. 1805. — *piloſus*, cauleſcens erectus piloſus, floribus ſpicatis, leguminibus ſubulatis piloſis. *Linn.*

293. 1104. — pumilus, ſiliquâ epiglottidis formâ. *T. Inſt.* [Aſtragalus *Epiglottis.*

294. 1710. — repens minor, flore cæruleo, ſiliquâ epiglottidi ſimili. *Boerh. Ind. Pl.* [Aſtragalus *Hypoglottis ?*

295. 756. ASTRANTIA major, corouâ floris candidâ. *T. Inſt.* 314. [Aſtrantia *major.* 296.

296. 757. — major, coronâ floris purpuraſcente. *T. Inſt.* 314. [*(Eadem.)*

297. 654. ATRIPLEX halimoides, latifolia dentata. *Rand.* [

298. 1554. — ſylveſtris, fructu roſeo compreſſo vel ſtellato. *C. B. P.* [Atriplex *roſea.*

299. 1105. ATRIPLICIS marinæ ſpecies, Valerandi. *J. B.* [

300. 1657. ATROPA *phyſaloides*, caule herbaceo, foliis ſinuato-angulatis, calycibus clauſis acutangulis. *Linn.* Alkekengi amplo flore violaceo. *Feuill. Per.* 724, *t.* 16.

301. 2214. AVENA *fatua*, paniculata, calycibus trifloris, floſculis omnibus ariſtatis, baſique piloſis. *Linn.* Avena ſylveſtris piloſa, ariſtis recurvis. *Hiſt. Ox.* 3. 209, *t.* 7, *f.* 5.

302. 2215. — *fragilis*, ſpicata, calycibus quadrifloris, floſculo longioribus. *Linn.* Gramen loliaceum ſpurium hirſutum, ariſtis geniculatis. *Bar. Ic.* 905, *f.* 1, 2, 3.

303. 2213. — *nuda*, paniculata, calycibus trifloris receptaculo calycem excedente, petalis dorſo ariſtatis; tertio floſculo mutico. *Linn.* Avena nuda. *C. B. P.* 23. *Raii Syn.* 289.

304. 2212. — *ſativa*, paniculata, calycibus diſ-

permis, ſeminibus lævibus, altero ariſtato. *Linn.* Avena alba. *C. B. P.* 23.

305. 1854. AZALEA ramis infrà flores folioſis. *Fl. Virg.* [Azalea *viſcoſa*.

B

306. 1356. BACCHARIS africana, coronopi folio. *Vaill. Acad.* [

307. 1555. — *ivæfolia*, foliis lanceolatis longitudinaliter dentato-ſerratis. *Linn.* Senecio africanus arboreſcens, folio ſerrato. *Boerh.* 117.

308. 2310. BALLOTA *alba*, foliis cordatis indiviſis ſerratis, calycibus ſubtruncatis. *Linn.* Ballote flore albo. *T. Inſt.* 185.

309. 2502. — *nigra*, foliis cordatis indiviſis ſerratis, calycibus acuminatis. *Linn.* Marrubium nigrum fœtidum. *C. B. P.* 230. Marrubium nigrum. *Ger.* 566.

310. 1506. BALLOTE, folio geranii batrachioides. *Gmel. Am. Ruth.* 47. [Ballota *lanata*.

311. 1158. BALSAMINA fœmina. *C. B. P.* [Impatiens *Balſamina*.

312. { 961. / 1407. } BALSAMITA foliis agerati. *Vaill.* Bellis ſpinoſa foliis agerati. *C. B. P.* Santolina ſpinoſa, foliis

agerati. *T. Inſt. Boerh.* [Chryſanthemum *floſculoſum.*

213. 1009. —— major. *Dod.* Coſtus hortorum. *Offic.* [Tanacetum *Balſamita.*

314. 1357. BARBA-JOVIS africana, foliis viridibus pinnatis; flore cœruleo. *Boerh.* [Pſoralea *pinnata.*

315. 263. —— caroliniana, arboreſcens; pſeudo acaciæ foliis, *baſtard indigo* incolis. *Rand.* [Amorpha *fruticoſa.*

316. 1106. —— hiſpanica incana flore luteo. *T. Inſt.* [Anthyllis *cytiſoides.*

317. 1055. BARBAREA. *J. B.* flore ſimplici. *Park.* [Eryſimum *Barbarea.*

318. 1711. BARLERIA *coccinea*, inermis, foliis ovatis denticulatis petiolatis. *Linn.* Barleria, ſolani folio, flore coccineo. *Plum. Nov. Gen.* 31.

319. 1906. BASTERIA foliis ovatis oppoſitis, floribus lateralibus, caule fruticoſo ramoſo. *Dict. Hort.* [Calycanthus *floridus.*

320. 853. BAUHINIA non aculeata, folio ſubrotundo, bicorni, floribus albis. *D. Houſt.* [Bauhinia *divaricata?*

321. 2. BELLIS africana, capitulo aphyllo luteo, coronopi folio, caulibus procumbentibus. *H. L. Bat.* [Cotula *coronopifolia.*

322. 1159. —— radice repente, latioribus ſerra-

tis foliis. *Mor. Præl. Bot. Hiſt. Ox.* 3, 29. [Chryſanthemum *ſerotinum.*

323. 2408. BERBERIS *vulgaris*, pedunculis racemoſis. *Linn.* Berberis dumetorum. *C. B. P.* 454.

324. 960. BETONICA alpina incana purpurea. *Barr. Ic.* [Betonica *hirſuta.*

325. 508. —— calpenſis longiore folio. *Rand.* An betonica rubicundiſſimo flore, Montis Aurei. *H. R. P?* [

326. 509. —— major danica. *Park. Th.* 615. [

327. 304. —— maxima, ſcrophulariæ folio; flore è luteo palleſcente. *Schol. Bot.* 64. [

328. 305. —— maxima, ſcrophulariæ folio; floribus incarnatis. *Par. Bat.* 106. [

329. 758. —— orientalis, folio anguſtiſſimo & longiſſimo, ſpicâ florum craſſiori. *T. Cor.* 13. [Betonica *orientalis.*

330. 510. —— purpurea. *C. B. P.* 231. [Betonica *officinalis.*

331. 2458. BETULA *nana*, foliis orbiculatis crenatis. *Lin.* Betula pumila. *Loeſl. Pruſſ.* 10.

332. 854. BIDENS americana, flore albo radiato; foliis inferioribus trilobatis, ſuperioribus ſubrotundis acutè crenatis. *Rand.* [

333. 511. —— americana graminifolia & ramoſiſſima. *Rand.* Hieracium fruticoſum, anguſtiſſimis gramineis

foliis, capitulis parvis. *Sloan. Hiſt. T.* 1, 255, *t.* 249, *fig.* 3. [Pectis *linifolia.*

334. 211. — americana nodiflora, foliis latis acuminatis. *Rand.* Chryſanthemum conyzoides nodiflorum, ſemine roſtrato bidente. *Sloan. Hiſt. T.* 1, 62, *t.* 154, *fig.* 4. [Verbeſina *nodiflora.*

335. 512. — americana trifolia & quinquefolia; flore albo amplo radiato. *Rand.* An bidens trifolia, americana, leucanthemi flore. *T. Inſt.* 462 ? [

336. 1507. — americana, triphylla, angelicæ folio, flore radiato. *Plum.* [Coreopſis *chryſantha.*

337. 705. — americana triphylla, flore barbulis latis albis radiato. *Rand.* [

338. 706. — americana triphylla, flore luteo, capite folioſo. *Rand.* An bidens canadenſis latifolia, flore luteo. *T. Inſt.* 461 ? [Bidens *frondoſa ?*

339. 759. — americana triphylla, foliis anguſtis acutis. *Rand.* Chryſanthemum virginianum, folio acutiore lævi trifoliato; ſeu anagyridis folio. *H. Ox.* 3, *p.* 21. [Coreopſis *tripteris.*

340. { 210. / 2254. } — *bipinnata*, foliis bipinnatis inciſis, calycibus involucratis, corollis ſeuiradiatis, ſeminibus

divergentibus. *Linn.* Bidens americanâ, apii folio. *T. Inſt.* 462. Chryſanthemum americanum, coridis indi folio. *Herm. Par.* 123, *t.* 123.

341. 2311. — *bullata*, foliis ovatis ſerratis; inferioribus oppoſitis; ſuperioribus ternatis: intermedio majore. *Linn.*

342. 1755. — calyce oblongo ſquamoſo, ſeminibus radii corollâ non deciduâ coronatis. *Mill. Ic.* [Zinnia *pauciflora.*

343. 212. — caroliniana, florum radiis latiſſimis, inſigniter dentatis; ſemine alato, per maturitatem convoluto. *Rand.* [Coreopſis *lanceolata.*

344. 1160. — foliis non diſſectis. *T. Inſt.* [

345. 2107. — foliis trifidis quinatiſque ſerratis petiolatis, pedunculis longiſſimis. *Wilm.* [

346. 1010. — foliis tripartito-diviſis. *T. Inſt.* [Bidens *tripartita.*

56. — indica, hieracii folio, caule alato. *T. Inſt.* 462. [Verbeſina *alata.*

347. { 855. / 2255. } — *piloſa*, foliis pinnatis ſubpiloſis, caule geniculis barbatis, calycibus involucro ſimplici, ſeminibus divergentibus. *Linn.* Bidens latifolia hirſutior, ſemine anguſtiore radiato. *H. Elt.* 51, *tab.* 43, *f.* 51.

348. 856. —— ſcabra, flore niveo, folio panduræformi. *H. Elt. p.* 54. [Bidens *nivea.*

349. 857. BIGNONIA americana, fraxini folio, flore amplo phœniceo. *T. Inſt.* 164. [Bignonia *radicans.*

350. 858. —— americana, fraxini folio, minor, flore coccineo. *Rand.* [Bignonia *radicans. a.*

351. 1955. —— urucu, foliis ampliſſimis, carolinjana. *D. Catesby.* [Bignonia *Catalpa.*

352. 1107. BISTORTA major, radice minùs intortâ. *C. B. P.* [Polygonum *Biſtorta.*

353. 1358. BLATTARIA alba, *C. B. P.* 241. [Verbaſcum *Blattaria. b.*

354. 1508. BLITUM fragiferum majus vulgare; ſpinachia fragifera. *Ald. H. Farn.* 85. [Blitum *capitatum.*

355. 1712. —— kali minus album dict. *Wilm.* Kali minus. *Ger. Em.* 535. [Chenopodium *maritimum.*

356. 57. —— monoſpermum indicum aculeatum. *Breyn. Prodr.* 18. [Amaranthus *ſpinoſus.*

357. 1056. —— perenne: bonus Henricus. *J. B.* 9. [Chenopodium *Bonus Henricus.*

358. 58. —— quod amaranthus græcus, ſylveſtris anguſtifolius. *T. Cor.* 17. [

359. 2060. BOERHAAVIA *diffusa*, caule lævi diffuso, foliis ovatis. *Linn.*

360. 1257. BORAGO constantinopolitana, flore reflexo cœruleo, calyce vesicario. *T. Cor.* [Borago *orientalis.*

361. 2108. —— *indica*, foliis ramificationum oppositis amplexicaulibus, pedunculis unifloris. *Linn.*

362. 1855. BRASSICA foliis infimis ovato-lanceolatis, serrato-dentatis, summis linearibus integerrimis. *Wilm.* [

363. { 358. / 907. } —— orientalis perfoliata, flore albo, siliquâ quadrangulâ. *T. Cor.* 16. Brassica campestris, perfoliata alba. *C. B. P.* [Brassica *orientalis.*

364. 2216. BRIZA *Eragrostis*, spiculis lanceolatis: flosculis viginti. *Linn.* Gramen paniculis elegantissimis. *C. B. P.* 2. *Hist. Ox.* 3. 204, *t.* 6, *f.* 52.

365. 2217. —— pinnata, spicâ distichâ, spiculis ovato-lanceolatis. *Hudf.* Gramen filiceum, paniculis integris. *Bocc. Sic.* 62, *t.* 33, *f.* 2. [(Cum præcedenti conferre jubet Linnæus.)

366. 1856. BROMUS *ciliatus*, paniculâ nutante, foliis utrinque subpilosis, glumis ciliatis. *Linn.*

367. 2222. —— *distachyos*, spicis duabus erec-

tis alternis. *Linn.* Gramen ſpicâ brizæ minus. *C. B. P.* 9. *Pluk. Phyt. t.* 33, *f.* 1.

368. 2221. — *giganteus*, paniculâ nutante, ſpiculis quadrifloris: ariſtis brevioribus. *Linn.* Gramen ſylvaticum glabrum, paniculâ recurvâ. *Vaill. Par.* 93, *t.* 18, *f.* 3.

369. 2219. — *mollis*, paniculâ erectiuſculâ, ſpicis ovatis pubeſcentibus: ariſtis rectis, foliis molliſſimè villoſis. *Linn.* Gramen avenaceum pratenſe, paniculâ ſquamatâ & villosâ. *Hiſt. Ox.* 3, 213, *t.* 7, *f.* 18.

370. 2220. — *rubens*, paniculâ faſciculatâ, ſpiculis ſubſeſſilibus, villoſis, ariſtis erectis. *Linn.* Gramen paniculâ molli rubente. *J. B.* 2. 265.

371. 2218. — *ſecalinus*, paniculâ patente, ſpicis ovatis: ariſtis rectis, ſeminibus diſtinctis. *Linn.* Gramen avenaceum ſegetale majus, glumâ turgidiore. *Hiſt. Ox.* 3, *t.* 7, *f.* 17.

372. 157. BRUNELLA caroliniana, magno flore dilutè cœruleo, internodiis prælongis. *Rand.* [

373. 1312. — folio laciniato. *C. B. P.* 261. [Prunella *laciniata.*

374. 359. — laciniata, flore elegantiſſimè ſul-

phureo. *Boerh. Ind. Alt.* 169. [Prunella *vulgaris. e.*

375. 1311. — major, folio non diſſecto. *C. B. P.* 260. *Off.* 386. [Prunella *vulgaris.*

376. 158. — Novæ Angliæ major; foliis longiùs mucronatis. *Rand.* [

377. 2153. BRYONIA *africana*, foliis palmatis quinquepartitis utrinque lævibus: laciniis pinnatifidis. *Linn.* Bryonia africana laciniata, tuberosâ radice, floribus herbaceis. *Herm. Par.* 107, *t.* 108.

378. 2409. — *alba*, foliis palmatis, utrinque calloſo-ſcabris. *Linn.* Bryonia alba, baccis nigris. *C. B. P.* 297.

379. 1313. BUGLOSSUM creticum majus, flore cœruleo purpuraſcente. *H. R. P.* [

380. 1358. — creticum verrucoſum, perlatum quibuſdam. *H. R. P.* [Lycopſis *variegata.*

381. 1011. — latifolium ſempervirens. *C. B. P.* [Anchuſa *ſempervirens.*

382. 213. — luſitanicum, bullatis foliis. *Mor. Hort. Bleſ.* 1. [Lycopſis *variegata.*

383. 1658. — luſitanicum, echii folio undulato. *T. Inſt.* 134. [Anchuſa *undulata.*

384. 1659. — luſitanicum, foliis aſperis oblongis anguſtioribus & criſpis. *T. Inſt.* [

385. 1012. —— orientale, flore luteo. *T. Cor.* 6. [Lithoſpermum *orientale.*

386. 962. BUGULA orientalis villoſa, flore inverſo cœruleo, albâ maculâ notato. *T. Cor.* 14. [Ajuga *orientalis.*

387. 1956. BULBOCASTANUM. *J. B.* 3, *p.* 30. Majus, folio apii. *C. B. P.* 162. [Bunium *Bulbocaſtanum.*

388. 1456. BULBOCODIUM crocifolium, flore parvo violaceo. *T. Cor.* 50. [Ixia *Bulbocodium ?*

389. 2503. BUNIAS *orientalis*, ſiliculis ovatis gibbis verrucoſis. *Linn.* Crambe orientalis, dentis leonis folio, erucaginis facie. *T. Cor.* 41.

390. 551. BUPHTHALMUM creticum, cotulæ facie, flore albo. *Breyn. Cent.* 1, *f.* 75. [Anthemis *valentina.*

391. 1210. —— orientale, tanaceti minoris folio, flore luteo ampliſſimo. *T. Cor.* [

392. { 707. / 2109. } BUPLEVRUM arboreſcens, ſalicis folio. *T. Inſt.* 310. Seſeli æthiopicum frutex. *Dod.* 312. Buplevrum *fruticoſum*, fruteſcens, foliis obovatis integerrimis. *Linn.*

393. 3. —— anguſtifolium. *Dod.* 633. [Buplevrum *junceum.*

394. 1359. —— foliis linearibus acutis ſeſſilibus. *Fl. Leyd.* [Buplevrum *tenuiſſimum.*

395. 1957. —— *odontites*, involucellis pentaphyllis acutis, univerſali triphyllo, floſculo centrali altiore, ramis divaricatis. *Linn.*

396. 1108. BURSA PASTORIS major, folio ſinuato eleganti, inſtar coronopi repentis. *C. B. P.* [

397. 2410. BUXUS *ſempervirens*. *Linn.* Buxus ſempervirens. *C. B. P.* 471.

C

398. {1602. 2504.} CACALIA *ſuaveolens*, caule herbaceo, foliis haſtato-ſagittatis denticulatis, petiolis ſupernè dilatatis. *Linn.*

399. 1756. CACTUS *flagelliformis*, repens, decemangularis. *Linn.*

400. 1509. CAKILE maritima, ampliore folio. *T. Cor.* 49. Cakile, ſeu eruca marina, latifolia. *J. B.* 2, 868. [Bunias *Cakile. b.*

401. 1603. CALAMINTHA hiſpanica fruteſcens, mari folio. *T. Inſt.* 194. [Meliſſa *fruticoſa.*

402. 4. —— magno flore. *C. B. P.* 229. [Meliſſa *grandiflora.*

403. 2004. —— montana prælta, pulegii odore, dentatis foliis, floribus dilutè cœruleis, ex longo ramoſo & brachiato pedunculo prodeuntibus. *Bocc. Muſ. p.* 2, 45. [Meliſſa *Nepeta. b.*

404. 708. — pulegii odore ſive nepeta. *C. B. P.* 228. Calamintha. *Off. Lond.* [Meliſſa *Nepeta.*

405. 709. — vulgaris vel officinarum Germaniæ. *C. B. P.* 228. [Meliſſa *Calamintha.*

406. 2505. CALCEOLARIA *pinnata*, foliis pinnatis. *Linn.* Calceolaria foliis ſcabioſæ vulgaris. *Feuill. Per.* 3, 12, *f.* 7.

407. 710. CALCITRAPOIDES procumbens cichorii folio, flore purpuraſcente. *Iſn. Act. Par. Ann.* 1719. [Centaurea *Iſnardi.*

408. 59. — pumila, ſupina, tenuifolia, calyce turbinato. *Vaill. Act. Par.* [

409. 1556. CALENDULA foliis linearibus denticulatis & integerrimis. *Fl. Leyd.* Dimorphotheca ſtatices folio. *Vaill.* [Calendula *graminifolia.*

410. {1604. 1857.} — foliis obversè ovatis denticulatis, caule fruticoſo perenni. *Fl. Leyd. Prodr.* 531. [Calendula *fruticoſa.*

411. 859. — minor arvenſis. *H. L. Bat.* [

412. 1211. — minor hiſpanica. *H. L. Bat.* [

413. 1109. — polyanthos maxima. *C. B. P.* [

414. 214. CALTHA africana; flore intùs albo foris violaceo. *T. Inſt.* 499. [Calendula *pluvialis.*

415. 2459. — *paluſtris. Linn.* Caltha paluſtris, flore ſimplici. *C. B. P.* 276.

416. 1111. CALTHOIDES, foliis oblongis, cæſiis, craſſis. *Shaw. Spècim.* [

417. 863. CAMARA americana, foliis parvis ſubrotundis, floribus foliolis interceptis. *Rand.* [Lantana *involucrata.*

418. 864. — americana, ſalviæ foliis mucronatis; floribus luteis. *Rand.* [

419. 860. — americana, urticæ foliis latioribus, ſpinoſa, floribus miniatis. *Rand.* [Lantana *aculeata.*

420. 862. — americana, urticæ foliis minoribus, flore vario. *Rand.* [

421. 861. — americana urticæ folio, floribus miniatis. *Rand.* [

422. 1409. — foliis ſubrotundis rugoſis, flore cœruleo. *Houſt.* [

423. 711. CAMPANULA canarienſis, atriplicis folio, tuberosâ radice. *T. Inſt.* 109. [Canarina *Campanula.*

424. (2256. 1259. 1314.) — *Erinus*, caule dichotomo, foliis ſeſſilibus: ſuperioribus oppoſitis tridentatis. *Linn.* Erini, ſeu rapunculi minimum genus. *Col. Phyt.* 122, *tab.* 28. Campanula minor, annua, foliis inciſis. *H. L. B. Mor. Hiſt.* 2, 458.

425. 1013. — hortenſis, folio & flore oblongo. *C. B. P.* 94. [Campanula *Medium.*

426. 1605. — hortenſis, rapunculi radice repente. *Mor. Hiſt.* 2, 460. Campanula repens, flore minore

cœruleo. *J. B.* 2, 706. [Campanula *rapunculoides.*

427. 1713. —— maxima, foliis latiſſimis. *C. B. P.* 94. [Campanula *latifolia.*

428. 760. —— pentagonia, perfoliata. *Mor. H. Ox.* 2, 457. [Campanula *perfoliata.*

429. 1014. —— perſicæ folio, flore albo pleno. *Lob.* [Campanula *perſicifolia.*

430. 712. —— pratenſis, flore conglomerato. *C. B. P.* 94. [Campanula *glomerata.*

431. 1907. CAMPHOROSMA *monſpelienſis*, foliis hirſutis linearibus. *Linn.* Camphorata hirſuta. *C. B. P.* 486.

432. { 655. / 1057. } CANELLA alba, cujus cortex eſt cortex winteranus. *Off. Lond.* Arbor baccifera, laurifolia, aromatica, fructu viridi calyculato, racemoſo. *Sloan. Hiſt. Jam. t.* 191, *f.* 2. [Winterania *Canella.*

433. 2005. CANNA *glauca*, foliis lanceolatis petiolatis enervibus. *Linn.*

434. 410. —— indica, radice albâ alexipharmacâ. *Sloan. Cat. Jam. Hiſt. t.* 149, *f.* 2. [Thalia *geniculata.*

435. 656. CANNABINA cretica fructifera. *T. Cor.* 52. [

436. 908. CANNABIS ſativa alba. *Off.* [Cannabis *ſativa.*

437. 1660. CANNACORUS, flore coccineo ſplendente. *T. Inſt.* Canna ameri-

cana, flore fulgenti coccineo ſplendente. *H. L. B.* [Canna *indica.*

438. 2257. CAPPARIS *ſpinoſa*, pedunculis unifloris ſolitariis, ſtipulis ſpinoſis, foliis annuis, capſulis ovalibus. *Linn.* Capparis ſpinoſa, fructu minore, folio rotundo. *C. B. P.* 480.

439. 865. CAPRIFOLIUM germanicum. *Dod.* [Lonicera *Periclymenum.*

440. 2460. CAPSICUM *annuum*, caule herbaceo, pedunculis ſolitariis. *Linn.* Piper indicum vulgatiſſimum. *C. B. P.* 102.

441. 2461. — *fruteſcens*, caule fruticoſo ſcabriuſculo, pedunculis ſolitariis. *Linn.* Capſicum minus, fructu parvo pyramidali erecto. *Sloan. Hiſt.* 1, 240, *t.* 146, *f.* 2.

442. 1959. CARDAMINE 201. Naſturtium pratenſe majus. *Park. Off.* 103. [Cardamine *pratenſis ?*

443. 1958. — alpina trifoliata. *Cluſ. Hiſt.* 127. Naſturtium alpinum trifolium. *C. B. P.* 104. [Cardamine *trifolia.*

444. 513. — annua, glabra, parvo flore, foliis vix ſinuatis. *Rand.* [

445. 216. — impatiens, altera hirſutior. *Raii Syn.* [Cardamine *hirſuta.*

446. 215. — impatiens, vulgò ſium minus impatiens.

patiens. *Ger.* [Cardamine *impatiens ?*

447. 514. — ſicula, foliis fumariæ. *T. Inſt.* 224. [

448. 1908. CARDIACA. *J. B.* 3, 56. Marrubium cardiaca dictum. *C. B. P.* 230. *Off.* 104. [Leonurus *Cardiaca.*

449. 1057. — flore caneſcente. *Amm.* [Leonurus *tataricus ?*

450. 1015. CARDUUS acaulis minor, flore purpureo. *Mill.* Carlina acaulos, minore purpureo flore. *C. B. P.* 380. [Carduus *acaulis.*

451. 1016. — aculeatus, ptarmicæ auſtriacæ folio. *Triumf.* [

452. 1408. — albis maculis notatus exoticus, flore albo. *C. B. P.* 381. [Carduus *ſyriacus. a.*

453. 1457. — caneſcens, aculeis flaveſcentibus munitus. *Boerh.* [

454. 5. — capite rotundo tomentoſo. *C. B. P.* 382. [Carduus *eriophorus.*

455. 1410. — creticus, rapi folio. *T. Inſt.* [Centaurea *romana.*

456. 804. — galactites. *J. B.* 3, 54. [Centaurea *galactites.*

457. 713. — humilis alatus, ſive carduus Mariæ annuus, folio lituris obſcuris notato. *H. C. Boerh. Ind. Alt.* 136. [Centaurea *galactites. a.*

458. 1557. — luſitanicus luteus, foliis coro-

nopi glabris & rigidis. *T. Inſt.* [

459. 2110. CARICA *Papaya*, foliorum lobis ſinuatis. *Linn.*

460. 264. CARLINA patula, atractylidis folio & facie. *T. Inſt.* 500. [Carlina *corymboſa.*

461. 964. CARTHAMUS africanus, folio ilicis, flore aureo. *Boerh.* [Atractylis *oppoſitifolia.*

462. 2154. —— *corymboſus*, floribus corymboſis numeroſis. *Linn.* Chamæleo niger. *Dalec. Hiſt.* 1454. Chamæleon niger umbellatus, flore cœruleo hyacinthino. *C. B. P.* 38.

463. 1161. —— officinarum, flore croceo. *T. Inſt.* [Carthamus *tinctorius.*

464. 805. CARYOPHYLLATA alpina lutea. *C. B. P.* 322. [Geum *montanum.*

465. 412. —— aquatica, nutante flore. *C. B. P.* 321. [Geum *rivale.*

466. 413. —— major, nutante flore. *Rand.* [Geum *montanum. a.*

467. 1260. —— montana, flore luteo nutante. *H. R. P.* [*(Idem.)*

468. 414. —— virginiana, albo flore minore; radice inodorâ. *H. L. Bat.* 121. [Geum *virginianum.*

469. 411. —— vulgaris. *C. B. P.* 321. [Geum *urbanum.*

470. 1112. CARYOPHYLLUS barbatus ſylveſtris. *C. B. P.* [Dianthus *Armeria.*

471. 1606. —— minimus muralis. *C. B. P.* 211. lychnis minima muralis. *Mor. Hiſt.* 2, 547. [Gypſophila *muralis.*

472. 1714. —— montanus umbellatus, floribus variis luteis ferrugineis, italicus. *Barr. Obſ.* 648. [Dianthus *ferrugineus.*

473. 1163. —— ſinenſis, flore vario. *Rand. Hort. Chelſ.* [

474. 1510. —— ſylveſtris prolifer. *C. B. P.* 209. Armeria prolifera. *Lob. Ic.* 449. [Dianthus *prolifer.*

475. 60. CASSIA decaphylla, orobi pannonici foliis mucronatis. *Rand.* [Caſſia *occidentalis.*

476. { 515. / 2111. } —— *marilandica*, foliis octojugis, ovato-oblongis æqualibus, glandulâ baſeos petiolorum. *Linn.* Caſſia marilandica, pinnis foliorum oblongis, calyce floris reflexo. *Mart. H. Pl. Rar. Dec.* 3, *n°.* 1.

477. 911. CASSIDA alpina, ſupina, magno flore. *T. Cor.* [Scutellaria *lupulina.*

478. 360. —— cretica fruticoſa, catariæ folio, flore albo. *T. Cor.* 11. [Scutellaria *cretica.*

479. 362. —— orientalis, chamædryos folio, flore luteo. *T. Cor.* 11. [Scutellaria *orientalis.*

480. 361. —— paluſtris vulgatior, flore cœru-

leo. *T. Inſt.* 182. [Scutellaria *galericulata.*

481. 1511. —— peregrina, meliſſæ folio. *T. Inſt.* 182. [

482. 761. CASSINE veræ perquàm ſimilis arbuſcula, phillyreæ foliis antagoniſtis, ex provinciâ carolinienſi. *Pluk. Mant. p.* 40. *Phyt. t.* 381. *f.* 3. [Viburnum *caſſinoides.*

483. 2312. CASSYTA *filiformis*, filiformis laxa. *Linn.* Cuſcuta baccifera barbadenſium. *Pluk. Phyt. t.* 172, *f.* 2.

484. 1162. CATANANCE flore luteo, latiore folio. *T. Inſt.* [Catananche *lutea.*

485. 1458. —— quorumdam. *Lugd.* 1190. [Catananche *cœrulea.*

486. 1960. CATARIA anguſtifolia major. *T. Inſt.* 202. [Nepeta *Cataria. b.*

487. 62. —— anguſtifolia minor. *T. Inſt.* 202. [Nepeta *Cataria. c.*

488. 64. —— hiſpanica, betonicæ folio anguſtiori, flore albo. *T. Inſt.* 202. [Nepeta *nuda.*

489. 1715. —— hiſpanica, betonicæ folio anguſtiori, flore cœruleo. *T. Inſt.* [Nepeta *violacea.*

490. 65. —— luſitanica erecta, betonicæ folio, tuberosâ radice. *T. Inſt.* [Nepeta *tuberoſa.*

491. 61. —— major vulgaris. *T. Inſt.* 202. [Nepeta *Cataria.*

492. 1315. —— minor alpina. *T. Inſt.* 202. [Nepeta *italica.*

493. 67. —— orientalis, teucrii folio, lavendulæ odore, verticillis florum craſſiſſimis. *T. Cor.* 13. [

494. 66. —— quæ horminum ſpicatum, lavendulæ flore & odore. *Bocc. Rar.* 48. [Nepeta *hirſuta.*

495. 1261. —— quæ nepeta minor, foliis meliſſæ turcicæ. *Hort. Cath.* [Nepeta *Cataria.*

496. 63. —— quæ nepeta pannonica major & elatior. *H. Ox.* 3, 415. [Nepeta *pannonica.*

497. 2061. CAUCALIS *daucoides*, umbellis trifidis aphyllis, umbellulis triſpermis triphyllis. *Linn.*

498. 159. —— hiſpanica. *Cam. Hort.* 37, *fig. xj.* [

499. {415. 1512.} —— major daucoides tingitana. *Mor. Umb.* 65. Caucalis monſpeliaca, echinato magno fructu. *C. B. P.* 153. [Daucus *muricatus.*

500. {1661. 2155.} CEANOTHUS *americanus*, foliis trinerviis. *Linn.* Evonymus Novi Belgii, corni fœminæ foliis. *Comm. H. Amſt.* 1, 167, *tab.* 86.

501. 1909. CEDRUS folio cupreſſi, media, majoribus baccis. *C. B. P.* 487. Cedrus phœnicea altera Plinii & Theophraſti. *Lob.* 221. [Juniperus *lycia.*

502. 1716. CELASTRUS *pyracanthus*, ſpinis

nudis, ramis teretibus, foliis acutis. *Linn.* Lycium. *Boerh. Ind. Alt.* 2, 237.

503. 1558. CELTIS fructu obſcurè purpuraſcente. *T. Inſt.* 612. [Celtis *occidentalis.*

504. 2313. CENCHRUS *racemoſus*, paniculâ ſpicatâ, glumis muricatis, ſetis ciliaribus. *Linn.* Gramen caninum maritimum aſperum. *B. Prodr.* 2, *t.* 2.

505. 2462. CENTAUREA *benedicta*, calycibus duplicato-ſpinoſis lanatis involucratis, foliis ſemidecurrentibus denticulato-ſpinoſis. *Linn.* Carduus ſylveſtris hirſutus, ſive carduus benedictus. *C. B. P.* 378.

506. 1662. — *collina*, calycibus ciliatis inermibus ſpinoſis, foliis radicalibus bipinnatifidis, caule acutangulo. *Linn.* Jacea lutea ſexta. *Tab. Hiſt.* 436.

507. 2411. — *Cyanus*, calycibus ſerratis, foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis. *Linn.*

508. 1559. — *melitenſis*, calycibus duplicato-ſpinoſis confertis terminalibus, foliis decurrentibus lanceolatis ſinuoſis inermibus. *Linn.*

509. 2360. — *moſchata. b. Amberboi*, calycibus inermibus ſubrotundis glabris: ſquamis ovatis, foliis ly-

rato - dentatis. *Linn.* Cyanus orientalis major, foliis magis diſſectis, flore luteo. *Mor. Hiſt.* 3, *p.* 135, *ſ.* 7, *t.* 25, *f.* 9.

510. 1360. —— *peregrina*, calycibus ſetaceo-ſpinoſis, foliis lanceolatis petiolatis : infernè dentatis. *Linn.*

511. 1561. —— *raguſina*, calycibus ciliatis, foliis tomentoſis pinnatifidis : foliolis obtuſis ovatis integerrimis: exterioribus majoribus. *Linn.* Jacea epidaurica candidiſſima & tomentoſa. *T. Inſt.* 445.

512. 1560. —— *ſolſtitialis*, calycibus duplicato-ſpinoſis ſolitariis, foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis, radicalibus ſyrato-pinnatifidis. *Linn.*

513. 265. CENTAURIUM foliis cinaræ. *Cornut.* 72. [Cnicus *centauroides.*

514. 1113. —— majus alpinum luteum. *C. B. P.* [Centaurea *alpina.*

515. 909. —— majus, foliis in plures laciniias diviſis. *C. B. P. Off.* [Centaurea *Centaurium.*

516. 1961. —— minus. *C. B. P.* 278. *Offic.* 117. [Gentiana *Centaurium.*

517. 763. CEPA aſcalonica. *Matthiol.* 556. [Allium *aſcalonicum.*

518. 762. —— fiſſilis. *Matthiol.* 555. [

519. 1607. CEPHALANTHUS *occidentalis*, foliis oppoſitis ternatiſque. *Linn.* Sca-

biosa dendroides americana, ternis foliis caulem ambientibus, floribus ochroleucis. *Pluk. Alm.* 336.

520. 1806. CERASTIUM *pentandrum*, floribus pentandris, petalis integris. *Linn. Loefl. Desc.* 26.

521. 2062. —— *tomentosum*, foliis oblongis tomentosis, pedunculis ramosis, capsulis globosis. *Linn.* Caryophyllus holosteus tomentosus anguſtifolius. *C. B. P.* 210.

522. 1858. CERASUS foliis ovatis. *Linn. H. Cliff.* Cerasus sylvestris amara mahaleb putata. *J. B.* 1, 227. [Prunus *Mahaleb.*

523. 1757. —— pumila canadensis, oblongo anguſto folio, fructu parvo. *Duham. Mill. Ic.* [Prunus *canadensis.*

524. 1717. —— racemosa sylvestris, fructu non eduli rubro. *H. R. P.* Cerasia racemosa rubra 2. *Tabern. Ic.* 987. [Prunus *Padus.*

525. 1758. CERATOCARPUS *arenarius. Linn.*

526. 1459. CERATOCEPHALUS virgin. tripteris, foliis lævibus, flore luteo radiato. *Vaill.* [

527. 1562. CERINTHE alpina perennis, flore striato. *T. Inst.* Glastum montanum. *Dalec.* 1, 1204. [

528. 1115. —— major flore verſicolore. *J. B.* [Cerinthe *minor. d ?*

529. 1316. —— minor flavo flore. *C. B. P.* 258. [Cerinthe *minor.*

530. 1608. —— quorumdam major, flore ex rubro purpuraſcente. *J. B.* 3, 603. [Cerinthe *major.*

531. 1719. CHÆROPHYLLUM paluſtre latifolium, flore albo. *Boerh.* 70. Myrrhis paluſtris latifolia rubra. *T. Inſt.* 315. [Chærophyllum *hirſutum.*

532. 1164. CHAMÆCERASUS alpina, fructu gemino rubro. *C. B. P.* [Lonicera *Xyloſteum.*

533. 416. CHAMÆDRYS alpina fruteſcens, folio ſplendente. *T. Inſt.* 205. [Teucrium *lucidum.*

534. 307. —— foliis parvis leviter crenatis. *Rand.* [

535. 308. —— fruteſcens; teucrium vulgò. *T. Inſt.* 205. [Teucrium *flavum.*

536. 1718. —— hiſpanica, tenuifolia multiflora. *H. R. P. t.* 205. [Teucrium *multiflorum.*

537. 209. —— laciniatis foliis. *Lob. Ic.* 385. [Teucrium *Botrys.*

538. 210. —— quæ teucrium hiſpanicum ſupinum, verbenæ tenuifoliæ foliis, D. Goiffon. *D. Juſſieu.* [

539. 306. —— vulgò vera exiſtimata. *J. B.* 3, 288. [Teucrium *Chamædrys ?*

540. 806. CHAMÆLEA tricoccos. *C. B. P.* 462. [Cneorum *tricoccon.*

541. 419. CHAMÆMELUM hiſpanicum, humile, ramoſiſſimum; cotulæ fœtidæ facie. *Rand.* [

542. 418. —— incanum; abſinthii vulgaris folio. *D. Vaill. Act. Par.* 1720. [

543. 417. —— montanum; abſinthii folio; parthenii odore. *Hort. Cath.* [

544. 516. —— trimeſtre, nudum, capitulis minimis. *Rand.* [

545. 1212. CHAMÆPITYS lutea vulgaris, folio trifido. *C. B. P. & Offic.* [Teucrium *Chamæpitys.*

546. 2412. CHEIRANTHUS *Cheiri*, foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoſo. *Linn.* Leucoium luteum vulgare. *C. B. P.* 202.

547. 1663. CHELIDONIUM majus, foliis & flore minutiſſimè laciniatis. *H. R. P.* 49. [Chelidonium *majus. b.*

548. 1859. —— minimum canadenſe acaulon. *Cornut.* Sanguinaria. *H. Elth.* [Sanguinaria *canadenſis.*

549. 420. CHELONE acadienſis, flore albo. *T. Act. Par.* 1720. *Joſſelyn.* [Chelone *glabra.*

550. 2506. —— *glabra. b*, foliis lanceolatis ſerratis: ſummis oppoſitis. *Linn.* Chelone floribus ſpecioſis pulcherrimis, colore roſæ damaſcenæ. *Gron. Virg.* 71. *Mill. Ic.* 62, *t.* 93. [Chelone *obliqua.*

551. 866. CHENOPODIO-MORUS media, foliis argutè dentatis. *Rand.* [

552. 1317. —— minor. *Boerh. Ind.* 91. [

553. 807. CHENOPODIUM ambrosioides, folio sinuato, *T. Inst.* 506. [Chenopodium *Botrys.*

554. 808. —— ambrosioides mexicanum. *T. Inst.* 506. [Chenopodium *ambrosioides.*

555. 764. —— ambrosioides mexicanum fruticosum. *Rand.* [

556. {1807. 2361.} —— *aristatum*, foliis lanceolatis subcarnosis integerrimis, corymbis dichotomis aristatis axillaribus. *Linn.*

557. 867. —— botryos folio subtùs candicante. *Rand.* Atriplex sylvestris 2. *Tab. Ic.* 407. [Chenopodium *glaucum.*

558. 2006. —— foliis filiformibus acutiusculis, caule erecto. *Linn. H. Upsal.* 55. [Salsola *altissima.*

559. 868. —— folio laciniato, majus: pes anserinus Fuchsii. *Rand.* [Chenopodium *rubrum.*

560. 869. —— folio sinuato, candicante. *T. Inst.* 506. Atriplex sylvestris. *Tab. Ic.* 406. [Chenopodium *album.*

561. 1609. —— lini folio villoso. *T. Inst.* 506. Linaria scoparia. *C. B. P.* 212. [Chenopodium *Scoparia.*

562. 1720. —— ſtramonii folio. *Vaill.* [Chenopodium *hybridum.*

563. 2507. —— *Vulvaria*, foliis integerrimis rhomboideo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Linn.* Atriplex fœtida. *C. B. P.* 119. *Ger. Em.* 327.

564. 2063. CHIONANTHUS *virginicus*, pedunculis trifidis trifloris. *Linn.*

565. 1808. CHIRONIA *fruteſcens*, foliis lanceolatis ſubtomentoſis, calycibus campanulatis. *Linn.*

566. 870. CHONDRILLA ſonchi folio, flore luteo-palleſcente. *T. Inſt.* 475. [Prenanthes *muralis.*

567. 1262. —— ſonchi folio, flore purpuraſcente major. *T. Inſt.* 475. [Prenanthes *purpurea.*

568. 1460. —— viminea. *J. B.* 2, 1021. [Chondrilla *juncea.*

569. 765. CHRISTOPHORIANA americana procerior & longiùs ſpicata. *Dill. H. Elth. t.* 67. [Actæa *racemoſa.*

570. 1110. —— vulgaris. *Park.* [Actæa *ſpicata.*

571. 517. CHRYSANTHEMOIDES oſteoſpermon, africanum arboreum, foliis populi albæ. *Boerh. Ind. Alt.* 104. [Oſteoſpermum *moniliferum.*

572. 1165. CHRYSANTHEMUM bermudenſe, leucoii folio craſſo. *Pluk.* [Buphthalmum *arboreſcens?*

573. 2314. — *corymboſum*, foliis pinnatis inciſo-ſerratis, caule multifloro. *Linn.* Tanacetum montanum inodorum, minore flore. *C. B. P.* 132.

574. 1116. — creticum. *Ger. Park.* [Chryſanthemum *coronarium.*

575. 69. — flore luteo, aphyllo minore. *Barr. Ic.* 452. [

576. 1117. — flore pleno. *T. Inſt.* [Chryſanthemum *coronarium. c ?*

577. 2112. — *indicum*, foliis ſimplicibus ovatis ſinuatis angulatis ſerratis acutis. *Linn.*

578. 2413. — *Leucanthemum*, foliis amplexicaulibus oblongis: ſupernè ſerratis infernè dentatis. *Linn.* Bellis ſylveſtris, caule folioſo, major. *C. B. P.* 261.

579. 1118. — mixtum, flore pleno. *H. Eyſt.* [Chryſanthemum *coronarium. c ?*

580. 6. — perenne minus, ſalicis folio glabro. *H. Ox. P.* 3, 21. [Buphthalmum *grandiflorum.*

581. 68. — tenuifolium, flore bullato aureo. *Barr. Ic.* 450. [

582. 2156. CHRYSOCOMA *Coma-aurea*, fruticoſa, foliis linearibus rectis glabris dorſo decurrentibus. *Linn.* Conyza æthiopica, flore bullato aureo, pinaſtri brevioribus fo-

liis lætè virentibus. *Pluk. Abrt.* 400, *t.* 327, *f.* 2.

583. 555. CICER ſativum. *C. B. P.* 347. [Cicer *arietinum.*

584. 266. CIRCÆA lutetiana. *Lob. Ic.* 266. [Circæa *lutetiana.*

585. 267. —— minima. *Col. Ecphr.* 80. [Circæa *alpina.*

586. 1664. CIRSIUM acanthoides montanum, flore flaveſcente. *T. Inſt.* [

587. 7. —— altiſſimum, albis maculis notatum, ſemine viſcoſo. *Rand.* Carduus albis maculis notatus, capitulis cirſii. *Sch. Bot.* 215. [

588. 1166. —— anglicum. *Ger.* [Carduus *helenioides.*

589. 871. —— arvenſe repens, folio vix ſinuato, in aculeum abeunte. *Rand.* [

590. 1721. —— foliis non hirſutis, floribus compactis. *C. B. P.* 377. [Carduus *monſpeſſulanus.*

591. 70. —— humile, ramoſum, foliis integris. *Rand.* [

592. 1722. —— maximum, aſphodeli radice. *C. B. P.* 377. [Carduus *heterophyllus.*

593. 1411. —— tuberoſum, lactucæ capitulis ſpicatis. *H. Elth.* [Serratula *ſpicata.*

594. 2113. CISTUS *ægyptiacus*, herbaceus erectus ſtipulatus, foliis lineari-lan-

ceolatis petiolatis, calycibus inflatis corollâ majoribus. *Linn.*

595. 1910. — arboreſcens, foliis ovato-lanceolatis acuminatis trinerviis ſeſſilibus utrinque villoſis. *Wilm.* [

596. 1513. — fœmina, folio ſalviæ, ſupina, humi ſparſa. *C. B. P.* 465. [Ciſtus *ſalvifolius.*

597. 715. — ladanifera, cretica, flore purpureo. *T. Cor.* 19. [Ciſtus *creticus.*

598. 1169. — ladanifera hiſpanica incana. *C. B. P.* [Ciſtus *ladaniferus.*

599. 1318. — ladanifera hiſpanica, ſalicis folio, flore albo, maculâ punicante inſignito. *T. Inſt.* [Ciſtus *ladaniferus. b.*

600. 1514. — ladanifera monſpelienſium. *C. B. P.* 467. Ladanifera ſive ledon monſpeſſulanum, anguſto folio, nigricans. *J. B.* 2, 10. [Ciſtus *monſpelienſis.*

601. 1168. — mas luſitanicus, folio ampliſſimo incano. *T. Inſt.* [Ciſtus *albidus?*

602. 2007. — *populifolius*, arboreſcens exſtipulatus, foliis cordatis lævibus acuminatis petiolatis. *Linn.* Ciſtus ledon, foliis populi nigræ major. *C. B. P.* 474.

603. 2315. — *ſalicifolius*, herbaceus patulus villoſus ſtipulatus, floribus racemoſis erectis, pedicellis horizontalibus. *Linn.* Ciſtus folio ſalicis. *C. B. P.* 464.

604. 2008. —— ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis ovato-lanceolatis, caulibus hirſutis decumbentibus. *Wilm.* [

605. 963. CITRULLUS ſive anguria vulgò. *Park.* [Cucurbita *Citrullus.*

606. 1461. CLAYTONIA *virginica*, foliis linearibus. *Linn.*

607. 1860. CLEMATIS foliis compoſitis & decompoſitis: foliolis ternatis ſerratis. *Gmel.* [Atragene *alpina.*

608. 1610. —— hiſpanica ſurrecta altera & humilior, flore albicante. *H. R. P.* [

609. 217. —— peregrina, foliis pyri inciſis. *C. B. P.* 300. [Clematis *cirrhoſa.*

610. 1861. —— purpurea repens, petalis florum coriaceis. *Baniſt.* [Clematis *Viorna.*

611. 9. —— ſive flammula ſurrecta alba. *J. B.* 2, 127. [Clematis *erecta.*

612. 8. CLEMATITIS cœrulea erecta. *C. B. P.* 300. [Clematis *integrifolia.*

613. 1665. —— cœrulea vel purpurea repens. *C. B. P.* 300. [Clematis *Viticella.*

614. 2114. CLEOME *pentaphylla*, floribus gynandris, foliis quinatis, caule inermi. *Linn.*

615. 1809. CLETHRA *alnifolia. Linn.* Alnifolia americana ſerrata, floribus pentapetalis, albis, in ſpicam diſpoſitis. *Pluk. Alm. p.* 18, *t.* 115, *f.* 1.

616. 1666. CLIFFORTIA *ilicifolia*, foliis ſubcordatis

datis dentatis. *Linn.* Camphorata capenſis, eryngii minoris folio. *Petiv. Hort.* 243.

617. 1515. CLINOPODIUM alpinum, roſeum, ſatureiæ folio. *Bocc. Muſ.* 119. Ziziphora. [Bartſia *alpina ?*

618. 1214. — americanum, rotundifolium, pulegii odore. *Houſt.* [

619. 809. — americanum, ſalicariæ foliis, perforatis, pulegii odore. *Rand.* [

620. 810. — menthæ folio, incanum & odoratum. *H. Elth. t.* 74. [Clinopodium *incanum.*

621. 1313. — minus, ocimi facie. *C. B. P.* [Thymus *Acinos.*

622. 1563. — montanum. *C. B. P.* Acinos auſtriaca. *Cluſ.* [Thymus *alpinus.*

623. 910. — orientale, hirſutum, foliis inferioribus ocymum, ſuperioribus hyſſopum referentibus. *T. Cor.* [Ziziphora *tenuior.*

624. 1810. — orientale, origani folio, flore minimo. *T. Cor.* [

625. 714. — virginianum, anguſtifolium, floribus amplis luteis, purpuro-maculatis, &c. *Pluk. Phyt. t.* 24, *f.* 1. [Monarda *punctata.*

626. 1263. — CLUTIA *pulchella*, foliis ovatis integerrimis, floribus lateralibus. *Linn.* Foliis petiolatis. *Hort. Cliff.*

627. 1611. CLYMENUM hiſpanicum, flore vario, ſiliquâ articulatâ. *T. Inſt.* 396. Lathyrus vicioides, vexillo rubro, petalis roſtrum ambientibus, cœruleis. *Mor. Hiſt.* 2, 50. [Lathyrus *articulatus*.

628. 2009. CLYPEOLA *maritima*, ſiliculis biloculatibus ovatis diſpermis. *Linn.* Perennis. *Sauv.* 71.

629. 1017. CNICUS atractylis lutea dictus. *Off. Hort. L.B.* [Carthamus *lanatus*.

630. 618. — cœruleus, humilis, montis Lupi. *Hort. L. B.* [Carthamus *Carduncellus*.

631. 1667. — *cernuus*, foliis cordatis, petiolis criſpis ſpinoſis amplexicaulibus, floribus cernuis, calycibus ſcarioſis. *Linn.* Carduus foliis ex cordato lanceolatis, margine ſerratis & ſpinoſis, ſquamis calycum membranaceis laceris ſpinoſis, &c. *Fl. Sibir.* 2, *p.* 47, *t.* 19.

632. 518. — creticus, atractylidis folio & facie, flore candidiſſimo. *T. Cor.* [Carthamus *creticus*.

633. 1412. — exiguus, capite cancellato, ſemine tomentoſo. *T. Inſt.* [Atractylis *cancellata*.

634. 811. — hiſpanicus, arboreus fœtidiſſimus. *T. Inſt.* 451. [Carthamus *arboreſcens*.

635. 1414. — orientalis, atractylidis folio,

flore leucophæo. *T. Cor.* [Carthamus *creticus.*

636. 1413. —— orientalis, atractylis lutea dictus altiſſimus. *T. Cor.* 33. [

637. 10. —— perennis cœruleus tingitanus. *Hort. L. B.* 162. [Carthamus *tingitanus.*

638. 1612. COCHLEARIA altiſſima, glaſti folio. *T. Inſt.* 215. Lepidium. *C. B. P.* 96. [Cochlearia *glaſtifolia.*

639. 913. —— minor rotundifolia noſtras. *Raii Syn.* [

640. 1415. COLLINSONIA americana, urticæ foliis, floribus ex albo purpureis. *Dill.* [Collinſonia *canadenſis?*

641. 1119. COLUTEA æthiopica, flore phœniceo, barbæ Jovis folio. *Breyn.* [Colutea *fruteſcens.*

642. 1723. —— foliolis ovatis integerrimis, caule fruticoſo. *Mill. Ic.* [Colutea *arboreſcens. b.*

643. 2010. —— foliolis ovatis, racemis lateralibus ſecundis, filiculis compreſſis. *Wilm.* [

644. 463. —— orientalis, flore ſanguinei coloris luteâ maculâ notato. *T. Cor.* 44. [

645. 912. —— veſicaria. *C. B. P.* [Colutea *arboreſcens.*

646. 219. COMA AUREA africana fruticans, foliis crithmi marini. *H. Amſt.* 2, 99. [Athanaſia *crithmifolia.*

647. 1120. — africana fruticans, foliis linariæ anguſtis. *H. Amſt.* [Chryſocoma *cernua.*

648. 464. — germanica. *Park. Theatr.* 688. [Chryſocoma *Linoſyris.*

649. 766. COMMELINA anguſtifolia procumbens. *Rand.* [Commelina *africana ?*

650. 311. — graminea latifolia, flore cœruleo. *Plum. N. Gen. Pl.* [Commelina *communis ?*

651. {1319. 1361.} — *tuberoſa*, corollis æqualibus, foliis ſeſſilibus ovato-lanceolatis ſubciliatis. *Linn.* Commelina radice anacampſerotis. *H. Elt. t.* 79.

652. 2508. CONIUM *maculatum*, ſeminibus ſtriatis. *Linn.* Cicuta major. *C. B. P.* 160.

653. 1724. CONVALLARIA *racemoſa*, foliis ſeſſilibus, racemo terminali compoſito. *Linn.*

654. 2414. — *verticillata*, floribus verticillatis. *Linn.* Polygonatum anguſtifolium ramoſum. *C. B. P.* 304.

655. 556. CONVOLVULUS americanus minor; polygoni ſubhirſuto folio, flore parvo cœruleo patente. *Rand.* [

656. 1362. — argenteus elegantiſſimus; foliis tenuiter inciſis. *T. Inſt.* [Convolvulus *althæoides. b.*

657. 1215. — cœruleus major, folio ſubro-

tundo. *Ger. Park.* [Convolvulus *hederaceus. g ?*

658. 1059. — cœruleus minor, hiſpanicus. *Park.* [Convolvulus *hederaceus. b ?*

659. 363. — canarienſis, longioribus foliis, mollibus & incanis. *Pluk. Phyt. t.* 325, *f.* 1. [Convolvulus *canarienſis.*

660. { 557. / 2064. } — *Cneorum*, foliis lanceolatis tomentoſis, floribus umbellatis, calycibus hirſutis, caule erecto. *Linn.* Major rectus creticus argenteus. *Mor. Hiſt.* 2, *p.* 11.

661. 1516. — linariæ folio aſſurgens. *T. Inſt.* [Convolvulus *Cantabrica.*

662. 1363. — peregrinus pulcher, folio betonicæ. *J. B.* [Convolvulus *althæoides.*

663. 558. — ramoſus incanus, foliis piloſellæ. *C. B. P.* 294. [

664. 1364. — ſiculus minor, flore parvo auriculato. *Bocc. Rar.* [Convolvulus *ſiculus.*

665. 268. CONYZA *africana*, fruteſcens, foliis ſalviæ, odore camphoræ. *T. Inſt.* 455. [Tarchonanthus *camphoratus.*

666. 11. — africana, ſenecionis flore, retuſis foliis. *Hort. L. B.* [Erigeron *fœtidum.*

667. 2258. — *hirſuta*, foliis ovalibus integerrimis ſcabris ſubtùs hirſutis. *Linn.*

668. 965. —— humilior, linariæ folio, floribus luteis umbellatis. *Amm.* 141. [Chryſocoma *Linoſyris.*

669. 1613. —— latifolia viſcoſa ſuaveolens, flore aureo, ex Gallo-Provincia. *T. Inſt.* 455. Conyza pyrenaica, foliis primulæ veris. *Par. Bat.* 127. [Inula *bifrons.*

670. 1725. —— mas Theophraſti, major Dioſcoridis. *C. B. P.* 265. Major monſpelienſis odorata. *J. B.* 2, 1059. [Erigeron *viſcoſum.*

671. 1216. —— minima. *Ger. Emac.* [Inula *pulicaria?*

672. 312. —— orientalis humilis; verbaſci folio candidiſſimo. *Rand.* An conyza tomentoſa & candidiſſima, ſubrotundo craſſo folio, flore luteo. *D. Sher. Act. Par. Ann.* 1719? [Conyza *candida?*

673. { 519. / 2115. } CORCHORO AFFINIS chamædryos folio; flore ſtamineo, ſeminibus atris quadrangulis, duplici ſerie diſpoſitis. *Sl. Cat. Jam. p.* 50. *Hiſt. tab.* 94, *f.* 1. Corchorus *ſiliquoſus*, capſulis linearibus compreſſis bivalvibus, foliis lanceolatis, æqualiter ſerratis. *Linn.*

674. 160. CORCHORUS americana, prælongis foliis, capſulâ ſtriatâ, ſubrotundâ, brevi. *Pluk. Phyt.*

t. 255, *f.* 4. [Corchorus *capſularis.*

675. 218. —— ſive melochia. *J. B.* 2, 982. [Corchorus *olitorius.*

676. 1614. COREOPSIS foliis linearibus integerrimis, caule erecto. *Fl. Virg.* 18. [Rudbeckia *anguſtifolia.*

677. 2259. —— *lanceolata*, foliis lanceolatis integerrimis ciliatis. *Linn.* Bidens ſucciſæ folio, radio amplo, laciniato. *Dill. H. Elth.* 55, *t.* 48. *f.* 56.

678. 2260. —— *leucantha*, foliis pinnatis ſerratis, radio florum diverſicolore. *Linn.*

679. 1726. CORIANDRUM majus. *C. B. P.* 158. *Off.* 145. [Coriandrum *ſativum.*

680. 1416. CORINDUM ampliore folio, fructu majore. *T. Inſt.* 431. [Cardioſpermum *Halicacabum. b.*

681. 1417. —— folio & fructu minori. *T. Inſt.* [*(Idem. c.)*

682. {1517. / 2116.} CORIS *monſpelienſis. Linn.* Coris cœrulea maritima. *C. B. P.* 280. Coris monſpeſſulana cœrulea. *J. B.* 3, 434.

683. 1615. CORISPERMUM hyſſopifolium. *D. Juſſ. Act. Par.* 1712. [Coriſpermum *hyſſopifolium.*

684. 1310. CORNUS foliis lanceolatis acutis, ſubtùs incanis, umbellis minoribus. *Wilm.* [Cornus *ſericea ?*

685. 1727. —— orientalis ſylveſtris, fructu teretiformi. *T. Cor.* [

686. 12. CORONA SOLIS altiſſima, alato caule. *T. Inſt.* 490. [

687. 1462. —— altiſſima roſacea dicta. *Vaill.* [Helianthus *ſtrumoſus.*

688. 1217. —— annua, flore pleno. *T. Inſt.* [

689. 161. —— caroliniana, parvis floribus, folio trinervi amplo, aſpero, pediculo alato. *Rand.* [

690. 1669. —— foliis aſperis, tribus vel quaternis ad genicula ſetis. *Hiſt. Ox.* 3, 24 [

691. 162. —— rapunculi radice. *T. Inſt.* 490. [Helianthus *ſtrumoſus. a.*

692. 313. —— trachelii folio, radice repente. *T. Inſt.* 490. [

693. 314. —— trachelii folio, ramoſior, radice non repente. *Rand.* [

694. 315. —— trachelii folio tenuiore, calyce floris foliato. *Rand.* [

695. 2362. CORONILLA *cretica*, herbacea, leguminibus quinis erectis teretibus articulatis, foliolis undenis. *Linn.* Coronilla cretica herbacea, flore parvo purpuraſcente. *T. Cor.* 44.

696. {2117. 2157.} —— *juncea*, fruticoſa, foliolis quinatis ternatiſque lineari-lanceolatis, ſubcarnoſis obtuſis. *Linn.* Colutea caule geniſtæ fungoſo. *J. B.* 1, 383. Polygala major maſſiliotica. *C. B. P.* 246.

697. 1311. —— leguminibus teretibus articulatis erectis. *Fl. Leyd.* 387. [Coronilla *cretica*.

698. 13. —— maritima, glauco folio. *T. Inſt.* 650. [Coronilla *glauca*.

699. 1911. —— *valentina*, fruticoſa, foliolis ſubnovenis, ſtipulis ſuborbiculatis. *Linn.*

700. {1218. 2509.} —— *varia*, herbacea, leguminibus erectis teretibus toroſis numeroſis, foliolis plurimis glabris. *Linn.* Coronilla herbacea, flore vario. *T. Inſt.* Securidaca dumetorum major, flore vario, ſiliquis articulatis. *C. B. P.* 349.

701. 1912. CORONOPUS ſylveſtris hirſutior. *C. B. P.* 190. *Off.* 147. [Plantago *coronopifolia*.

702. 316. COTINUS coriaria. *Dod.* 780. [Rhus *Cotinus*.

703. 1759. COTULA, flore luteo radiato. *T. Inſt.* 495. Buphthalmum cotulæ folio. *C. B. P.* 134. [Anthemis *valentina*.

704. 716. COTYLEDON afra, folio craſſo lato laciniato, floſculo aureo. *Boerh. Ind. Alt.* 288. [Cotyledon *laciniata*.

705. 1170. —— africana fruteſcens, flore coccineo umbellato. *Comm.* [Craſſula *coccinea*.

706. 1760. CRACCA minor. *Rivin.* Vicia ſege-

tum, cum siliquis plurimis hirsutis. *C. B. P.* 345. [Ervum *hirsutum.*

707. 2118. CRAMBE foliis lanciniatis, caule erecto ramosissimo. *Dict. Hort.* [

708. 465. —— maritima, brassicæ folio. *T. Inst.* 211. [Crambe *maritima.*

709. 1863. CRATÆGUS cerasi folio, floribus magnis. *Amm. Ruth.* 274. [Pyrus *baccata.*

710. 1962. —— foliis cordato-ovatis serratis subtùs tomentosis, floribus paniculatis. *Wilm.* [

711. 1864. —— folio laciniato. *T. Inst.* 633. Sorbus torminalis. *Dod.* 803. [Cratægus *torminalis.*

712. 1862. —— folio subrotundo serrato subtùs incano, aria multis. *T. Inst.* 633. [Cratægus *Aria.*

713. 2119. CREPIS *rubra*, foliis amplexicaulibus lyrato-runcinatis. *Linn.*

714. 1728. CRITHMUM, sive fœniculum maritimum, minus. *C. B. P.* 288. *Off.* 152. [Crithmum *maritimum.*

715. 814. CROCUS albus variegatus, fundo floris flavescente. *Rand.* [Crocus *sativus.*

716. {1670. 1729.} —— alpinus autumnalis. *C. B. P.* 65. Crocus montanus autumnalis. *J. B.* Crocus sativus. *C. B. P.* 65.

Off. 152. [Crocus *ſativus a. officinalis.*

717. { 812. / 813. } — vernus latifolius flavus. *C. B. P.* Crocus vernus latifolius; flore albo, purpuro-violaceâ baſi. *C. B. P.* 66. [Crocus *ſativus b. vernus.*

718. 914. CROTALARIA americana, fruteſcens, flore luteo, ramulis alatis, folio mucronato. *Ind. Hort. Chelſ.* [

719. 2510. — *chinenſis*, foliis ſimplicibus ovatis ſubpetiolatis, ſtipulis minutiſſimis. *Linn.*

720. 2011. — *laburnifolia*, foliis ternatis ovatis acuminatis, ſtipulis nullis, leguminibus pedicellatis. *Linn.* Crotalaria aſiatica fruteſcens, floribus luteis amplis trifoliata. *H. Lugd. B.* 196.

721. 1463. CRUCIATA alpina latifolia lævis. *T. Inſt.* [Aſperula *taurina.*

722. 872. — nova romana minima muralis. *Col. Ecphr.* 295. [Valantia *muralis.*

723. 1761. CUCUBALUS *Behen*, calycibus ſubgloboſis glabris reticulato-venoſis, capſulis trilocularibus, coroliis ſubnudis. *Linn.*

724. 1762. — calycibus ſubgloboſis, caule ramoſo patulo, foliis linearibus acutis. *Mill. Dict.* Lychnis ſylveſtris quæ been album vulgò, foliis anguſtioribus & acutiori-

bus. *C. B. P.* 205. [Cucubalus *Behen ?*

725. 2363. — *tataricus*, petalis bipartitis, floribus fecundis decumbentibus, pedunculis oppoſitis ſolitariis erectis, caule ſimpliciſſimo. *L.*

726. 14. — plinii. *Lugd.* 1429. [Cucubalus *bacciferus.*

727. 1121. CUMINOIDES. *T. Inſt.* [Lagoecia *Cuminoides.*

728. 1763. CUNONIA floribus ſeſſilibus, ſpathis maximis. *Butn. Cun. tab.* 1. [Antholiza *Cunonia.*

729. 2463. CUPRESSUS *ſempervirens*, foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. *Linn.* Cupreſſus. *C. B. P.* 488.

730. 1764. — *thyoides*, foliis imbricatis, frondibus ancipitibus. *Linn.* Cupreſſus nana mariana, fructu cœruleo parvo. *Pluk. Mant.* 61.

731. 717. — virginiana. *Tradeſc. Catal.* 106. Cupreſſus virginiana, foliis acaciæ deciduis. *H. L. B.* 107. [Cupreſſus *diſticha.*

732. 467. CYANUS anguſtiori folio & longiori, belgicus. *H. R. P.* [

733. 1122. — n[illegible], flore purpureo. *C. B. P.* [Centaurea *Cyanus. c.*

734. 466. — montanus latifolius, vel verbaſculum cyanoides. *C. B. P.* 273. [Centaurea *montana.*

735. 966. — turcicus, ſeu orientalis odoratus

major. *Park.* [Centaurea *moſchata.*

736. {1730. 1765.} CYCLAMEN hederæ folio. *C. B. P.* 308. *Off.* 162. Cyclamen vernum minus, orbiculato folio infernè rubente, flore minore ruberrimo. *Mor. Hiſt.* 3, 551. [Cyclamen *europæum.*

737. 1464. —— hyeme & verè florens, perſicum dictum. *H. R. P.* [Cyclamen *indicum?*

738. 1564. CYNANCHUM *monſpeliacum*, caule volubili herbaceo, foliis reniformi-cordatis acutis. *Linn.* Periploca monſpeliaca, folio rotundiore. *T. Inſt.* 93.

739. 1322. CYNOGLOSSUM creticum, argenteo anguſto folio. *C. B. P.* [Cynogloſſum *cheirifolium.*

740. 2364. —— *liniſolium*, foliis lineari-lanceolatis glabris. *Linn.* Cynogloſſum minus album, lini foliis glaucis, ſemine umbilicato. *Mor. Hiſt.* 3, *p.* 449, *ſ.* 11, *t.* 30, *f.* 11.

741. 873. —— virginianum, flore minimo albo Baniſteri. *Pluk. Alm.* 126. [Myoſotis *virginiana.*

742. {1963. 2120.} CYNOSURUS *ægyptius*, ſpicis digitatis quaternis obtuſis patentiſſimis mucronatis, calycibus mucronatis, caule repente, foliis oppoſitis. *Linn.*

743. 2225. —— *aureus*, paniculæ ſpiculis ſterilibus pendulis ternatis, floribus ariſtatis. *Linn.* Gramen paniculâ pendulâ aureâ. *C. B. P.* 3. *Theatr.* 33. *Scheuchz. Agr.* 149.

744. 2223. —— *criſtatus*, bracteis pinnatifidis. *Linn.* Gramen criſtatum. *B. Hiſt.* 2, 468. *Raii Syn.* 398.

745. 2224. —— *echinatus*, bracteis pinnato-paleaceis ariſtatis. *Linn.* Gramen alopecuroides, ſpicâ aſperâ. *C. B. P.* 4.

746. 1060. CYPERUS odoratus, radice longâ. *C. B. P.* [Cyperus *longus.*

747. 1061. —— rotundus, eſculentus, anguſtifolius. *C. B. P.* [Cyperus *eſculentus.*

748. 1671. CYTISO-GENISTA luſitanica, magno flore. *T. Inſt.* [

749. 1171. CYTISUS alpinus, flore luteo racemoſo pendulo. *Mill.* [Cytiſus *Laburnum.*

750. 2121. —— *auſtriacus*, floribus umbellatis terminalibus, caulibus erectis, foliolis lanceolatis. *Linn.*

751. 1465. —— canarienſis microphyllos anguſtifolius prorsùs incanus. *Pluk. Phyt.* [Geniſta *canarienſis.*

752. 1673. —— glaber nigricans. *C. B. P.* 390. Cytiſus Geſneri, cui flores fere ſpicati. *J. B.* 1, 370. [Cytiſus *nigricans.*

753. 1063. —— glabris foliis ſubrotundis, pediculis breviſſimis. *C. B. P.* [Cytiſus *ſeſſilifolius*.

754. 1062. —— incanus, ſiliquis falcatis. *C. B. P.* [Medicago *arborea*.

755. 2012. —— luſitanicus, foliis exiguis, magno flore, ſiliquis latis & tomentoſis. *T. Inſt.* 648. [

756. 1672. 2065. 2511. —— *ſupinus*, floribus umbellatis terminalibus rariùs erectis, foliolis ovatis. *Linn.* Cytiſus ſupinus, foliis infrà & ſiliquis molli lanugine pubeſcentibus. *C. B. P.* 390. Cytiſus floribus capitatis, ramis decumbentibus. *Fl. Leyd. Prodr.* 376.

D

757. 767. DALEA D. Millar inventoris. *Rand.* [Pſoralea *Dalea ?*

758. 1913. DAMASONIUM ſtellatum. *Lugd.* 1058. Plantago aquatica ſtellata. *C. B. P.* 191. [Aliſma *Damaſonium*.

759. 2464. DAPHNE *Laureola*, racemis axillaribus quinquefloris, foliis lanceolatis glabris. *Linn.* Laureola ſempervirens, flore viridi, quibuſdam laureola mas. *C. B. P.* 462.

760. 2465. —— *Mezereum*, floribus ſeſſilibus

ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Linn.* Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis laureola fœmina. *C. B. P.* 462.

761. 2013. DATURA foliis obcordatis villosis integris, floribus oblongis erectis, pericarpiis spinosis nutantibus. *Wilm.* [Datura *Metel?*

762. 15. DAUCUS fœniculi foliis tenuissimis. *C. B. P.* 150. [Athamantha *cretensis.*

763. 16. 364. — maritimus lucidus. *T. Inst.* 307. Daucus qui pastinaca œnanthes folio. *Bocc. Rar.* 75. [Daucus *Gingidium.*

764. 2014. — vulgaris. *Clus. Hist.* 198. [Daucus *Carota.*

765. 1565. DELPHINIUM *elatum*, nectariis diphyllis: labellis bifidis apice barbatis, foliis incisis, caule erecto. *Linn.* Delphinium orientale, aconiti folio, flore cœruleo. *T. Cor.* 30.

766. 1811. — *grandiflorum*, nectariis diphyllis: labellis integris, floribus subsolitariis, foliis compositis lineari-multipartitis. *Linn.* Delphinium elatius subincanum perenne, floribus amplis azureis. *Amm.* 132.

767. 2122. — nectariis diphyllis. *Wilm.* [

768. 815. — platani folio, staphisagria dictum.

tum. *T. Inſt.* 428. [Delphinium *Staphiſagria.*

769. 917. — ſive conſolida regalis, flore roſeo. *T. Inſt.* [Delphinium *Conſolida.*

770. 17. DENS LEONIS, foliis eryſimi vulgaris. *T. Cor.* 35. [

771. 1865. — latiore rotundioreque folio, flore ex purpuro rubente. *C. B. P.* 87. [Leontodon *Taraxacum. c.*

772. 768. DENTARIA bulbifera. *Lob. Ic.* 687. [Dentaria *bulbifera.*

773. 2512. DIANTHUS *Armeria*, floribus aggregatis faſciculatis, ſquamis calycinis lanceolatis villoſis tubum æquantibus. *Linn.* Caryophyllus barbatus ſylveſtris. *C. B. P.* 208.

774. 2262. — *Carthuſianorum*, floribus ſubaggregatis, ſquamis calycinis ovatis ariſtatis tubum ſubæquantibus, foliis trinerviis. *Linn.* Caryophyllus ſylveſtris vulgaris latifolius. *C.B.P.* 209.

775. 2261. — *glaucus*, floribus ſubſolitariis, ſquamis calycinis lanceolatis quaternis brevibus, corollis crenatis. *Linn.*

776. 2123. — *monſpeliacus*, floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubulatis longitudine tubi, corollis multifidis, caule erecto. *Linn.*

777. 2124. —— *ſuperbus*, floribus paniculatis, ſquamis calycinis brevibus acuminatis, corollis multifido-capillaribus, caule erecto. *Linn.*

778. 163. DICTAMNUS creticus. *C. B. P.* 222. [Origanum *Dictamnus.*

779. 967. —— montis Sipyli. *G. Wheel.* [Origanum *ſipyleum.*

780. 657. DIGITALIS acanthoides, canarienſis, fruteſcens; flore aureo. *H. Amſt.* 11, *p.* 105. [Digitalis *canarienſis.*

781. 1674. —— anguſtifolia, flore ferrugineo. *C. B. P.* 244. [Digitalis *ferruginea.*

782. 1616. —— hiſpanica purpurea minor. *T. Inſt.* 165. Digitalis verbaſci folio, purpurea minor perennis hiſpanica. *Barr. Ic.* 1183. [Digitalis *Thapſi.*

783. 1123. —— lutea, magno flore. *C. B. P.* [Digitalis *ambigua.*

784. 1365. —— lutea major, parvo flore. *Mor. Hiſt.* [Digitalis *lutea.*

785. 769. —— minima, gratiola dicta. *H. Ox. p.* 2, 479. Gratiola centauroides. *C. B. P.* 279. [Gratiola *officinalis.*

786. 1766. DIOSMA *ericoides*, foliis lineari-lanceolatis ſubtùs convexis bifariàm imbricatis. *Linn.*

787. 1566. —— *oppoſitifolia*, foliis ſubulatis acutis oppoſitis. *Linn.* Spiræa

africana, foliis cruciatim positis. *Comm. Rar. Pl.*

788. 1617. DIPSACUS folio laciniato. *C. B. P.* 385. [Dipsacus *laciniatus.*

789. 2125. —— *pilosus*, foliis petiolatis appendiculatis. *Linn.*

790. 2466. DIRCA *palustris. Linn.* Thymelæa floribus albis primo vere erumpentibus, foliis oblongis acuminatis, viminibus & cortice valdè tenacibus. *Gron. Virg.* 155.

791. 1618. DODARTIA foliis lanceolatis serratis, floribus spicatis. *Wilm.* Linaria bellidis folio. *C. B. P.* 212. *Prod.* 106. [Antirrhinum *bellidifolium.*

792. 718. DORIA ægyptia annua; foliis trilobatis serratis. *Rand.* [

793. 1812. —— americana, lato rigido folio. *Boerh. Ind. Alt.* 98. Virga aurea ex Novâ Yorck, foliis symphiti majoris hirsutis. *Sch. Bot. Par.* [Solidago *rigidâ.*

794. 318. —— foliis tenuiter serratis, ad caulem latis. *Rand.* An alisma monspelienſium, sive doria. *J. B.* 2, 1064? [Senecio *Doria ?*

795. 317. —— major repens. *Rand.* Virga aurea maxima, radice repente; sive dorea major, repens, D. Bobart. *Hist. Ox.* 3, 123. [

796. 719. — parva annua, foliis anguſtis, leviter ſerratis. *Rand.* [

797. 520. — quæ jacobæa africana, frutescens, lavendulæ folio latiori. *H. Amſt.* 2, 141. [Senecio *longifolius.*

798. 1675. — quæ jacobæa africana, hederæ terreſtris folio, repens. *H. Amſt.* 2, 145. [Cineraria *geifolia.*

799. 319. — quæ jacobæa orientalis, limonii folio. *T. Cor.* 36. [Senecio *Doria. a.*

800. 1019. DORONICUM americanum. *Park.* [Rudbeckia *laciniata.*

801. 816. — plantaginis folio. *C. B. P.* 184. [Doronicum *plantagineum.*

802. 916. — Romanum. *Off.* [Doronicum *Pardalianches. b.*

803. { 164. / 1124. } DORYCNIUM monſpelienſium. *Lob. Ic.* 2, 51. [Lotus *Dorycnium.*

804. 1064. DRABA alba ſiliquoſa. *C. B. P.* [Arabis *alpina.*

805. 2513. — *alpina*, ſcapo nudo ſimplici, foliis lanceolatis integerrimis. *Linn.* Sedum alpinum luteum hirſutum. *C. B. P.* 284.

806. 2158. — *muralis*, caule ramoſo, foliis ovatis ſeſſilibus dentatis. *Linn.* Burſa paſtoris major, loculo oblongo. *C. B. P.* 108. *Prod.* 50, *t.* 50.

807. 915. DRACOCEPHALON americanum.

Breyn. Prod. [Dracocephalum *virginianum.*

808. 1366. —— canarienſe triphyllon, cedronella. *H. Amſt.* [Dracocephalum *canarienſe.*

809. 2066. —— *nutans*, floribus verticillatis, bracteis oblongis ovatis integerrimis, corollis majuſculis nutantibus. *Linn.*

810. 1964. DYOSPIRUS foliorum paginis diſcoloribus. *Mill. Ic.* [Dioſpyros *Lotus.*

E

811. 2015. ECHINOPS floribus faſciculatis, calycibus multifloris. *H. Cliff.* 931. Chamæleon niger umbellatus, flore cœruleo hyacinthino. *C. B. P.* 380. [Carthamus *corymboſus.*

812. 730. ECHINOPUS græcus, tenuiſſimè diviſus & lanuginoſus, capite minori cœruleo. *T. Cor.* 34. [Echinops *Ritro.*

813. 1567. —— minor. *J. B.* 3, 72. [Echinops *Ritro. b.*

814. 365. —— minor, annuus, magno capite. *T. Inſt.* 463. [Echinops *ſtrigoſus.*

815. 1367. ECHIUM creticum anguſtifolium

rubrum. *C. B. P.* [Echium *creticum.*

816. 2067. — *luſitanicum*, corollis ſtamine longioribus. *Linn.* Echium ampliſſimo folio, luſitanicum. *T. Inſt.* 135.

817. 559. ELÆAGNUS orientalis anguſtifolius; fructu parvo, olivæformi, ſubdulci. *T. Cor.* 53. Ziziphus alba. *Cluſ. Hiſt.* 29. [Elæagnus *anguſtifolius.*

818. 968. ELATERIUM. *T. Inſt.* Cucumis aſininus. *Cer.* [Momordica *Elaterium.*

819. 320. ELATINE, folio acuminato, in baſi auriculato, flore luteo. *C. B. P.* 253. [Antirrhinum *Elatine.*

820. 321. — folio ſubrotundo. *C. B. P.* 253. [Antirrhinum *ſpurium.*

821. 322. — hiſpanica rotundifolia; pediculis florum breviſſimis. *Rand.* [

822. 1418. ELICHRYSUM africanum fœtidiſſimum, calyce argenteo. *T. Inſt.* [Gnaphalium *fœtidum.*

823. 469. — africanum, folio oblongo anguſto; flore rubello, poſteà aureo. *Boerh. Ind.* 42. [Gnaphalium *rutilans.*

824. 468. — africanum, folio oblongo, ſubtùs cano, ſuprà viridi, flore luteo. *Ibid.* [Gnaphalium *cymoſum.*

825. 470. — americanum annuum, foliò

oblongo, ex anguſto in orbem deſinente. *Rand.* [

826. 770. — anguſtiſſimo folio. *T. Inſt.* 452. Stæchas citrina tenuifolia altera ſive italica. *J. B.* 3, 155. [

827. 1731. — graveolens acutifolium, alato caule. *H. Elth.* [Gnaphalium *undulatum.*

828. 1021. — latifolium americanum. *T. Inſt.* [Gnaphalium *margaritaceum?*

829. 269. — montanum, longiore & folio & flore purpureo. *T. Inſt.* 453. [Gnaphalium *dioicum. fœm.*

830. 1518. — orientale. *C. B. P.* 264. Stæchas citrina, floris & magnitudine & colore ſpecioſa. *J. B.* 3, 154. [Gnaphalium *orientale.*

831. 1020. — ſeu ſtæchas citrina anguſtifolia. *C. B. P.* [Gnaphalium *Stæchas.*

832. 1174. — ſpicatum. *T. Inſt.* [

833. 165. — ſylveſtre latifolium, capitulis conglobatis. *C. B. P.* 264. [Gnaphalium *luteo-album.*

834. 1568. — ſylveſtre latifolium, flore parvo ſingulari. *T. Inſt.* Stæchadi citrinæ alteri inodoræ Lobelii affinis, capitulis brevioribus. *J. B.* 3, 157. [Conyza *ſaxatilis.*

835. 2415. ELLISIA *Nyctelea. Linn.*

836. 2514. ELYMUS *caninus*, ſpicâ nutante arctâ, ſpiculis rectis involucro deſtitutis, infimis geminis. *Linn.*

837. 2317. —— *Hyſtrix*, ſpicâ erectâ, ſpiculis involucro deſtitutis patentibus. *Linn.*

838. 2515. —— *ſibiricus*, ſpicâ pendulâ arctâ, ſpiculis binatis, calyce longioribus. *Linn.*

839. {1866. 2316.} —— *virginicus*, ſpicâ erectâ, ſpiculis trifloris, involucro ſtriato. *Linn.*

840. 1368. EMERUS americanus, ſiliquâ incurvâ, *T. Inſt.* (Falſum Synon.) [Aſtragalus *incanus ?*

841. 1172. —— minor. *T. Inſt.* Colutea ſcorpioides. *Park.* [Coronilla *Emerus. b.*

842. 1173. EPHEDRA major maritima. *T. Inſt.* [Ephedra *diſtachia ?*

843. 918. EPHEMERUM virginianum Tradeſcanti, flore purpureo. *Park. Par.* [Tradeſcantia *virginica.*

844. 1965. EPILOBIUM, foliis lanceolatis alternis, capſulis quadrangulis. *Wilm.* [

845. 1569. —— foliis lineari-lanceolatis integerrimis, floribus corymboſis terminalibus. *Wilm.* [

846. 2016. ERICA antheris bifidis incluſis, corollis cylindricis longioribus aggregatis, foliis verticillatis, dentato-aculeatis. *Linn. Sp. Pl.* 355. [Erica *abietina.*

847. 2318. —— *cinerea*, antheris criſtatis, corollis ovatis, ſtylo ſubexſerto,

foliis ternis, ſtigmate capitato. *Linn.* Erica humilis cortice cinereo, arbuti flore. *C. B. P.* 486.

848. 2467. —— Daboecii. *Linn.* Erica hibernica, foliis myrti piloſis ſubtùs incanis. *Pet. Gaz.* 42, *t.* 27, *fig.* 4. [Andromeda *Daboecia.*

849. 2516. —— *multiflora*, antheris muticis exſertis, corollis cylindricis, ſtylo exſerto, foliis quinis, floribus ſparſis. *Linn.* Erica foliis corios, multiflora. *J. B.* 1, 356. *Lob. Hiſt.* 620.

850. 2068. ERIGERON *acre*, pedunculis alternis unifloris. *Linn.*

851. {1466. 1867.} —— *bonarienſe*, foliis baſi revolutis. *Linn.* Senecio bonarienſis purpuraſcens, foliis imis coronopi. *H. Elth.* 344.

852. 2319. —— *graveolens*, foliis ſublinearibus integerrimis, ramis lateralibus multifloris. *Linn.*

853. 773. ERUCA bellidis folio. *Mor. H. Ox. p.* 2, 231. [Siſymbrium *yimineum.*

854. 1868. —— latifolia alba, ſativa Dioſcoridis. *C. B. P.* 98. *Off.* 185. [Braſſica *Eruca.*

855. 772. —— ſylveſtris. *Ger.* Eruca ſylveſtris tenuifolia perennis, flore luteo. *J. B.* 2, 861. [Siſymbrium *tenuifolium.*

856. 619. —— tanaceti folio. *H. R. P.* [Sisymbrium *tanacetifolium.*

857. 1570. ERYNGIUM americanum fœtidum, etuba brasil. *H. Lugd.* 237. [Eryngium *fœtidum.*

858. 817. —— cœruleum, albis maculis notatum. *H. Ox.* 3, 165. [

859. 874. —— maritimum. *C. B. P.* 386. [Eryngium *maritimum.*

860. 818. —— montanum amethystinum. *C. B. P.* 386. [Eryngium *amethystinum.*

861. 1419. —— montanum amethystinum, capitulo majore pallescente. *T. Inst.* 327. [

862. 1519. —— planum minus. *C. B. P.* 386. Eryngium pusillum planum. *J. B.* 3, 87. [Eryngium *pusillum.*

863. 875. —— vulgare. *C. B. P.* 386. Eryngium campestre. *Dod.* 730. [Eryngium *campestre.*

864. 1467. —— yuccæ foliis, spinis tenellis hinc indè marginibus appositis. *Wilm.* [Eryngium *aquaticum.*

865. 2365. ERYSIMUM *cheiranthoides*, foliis lanceolatis integerrimis, siliquis patulis. *Linn.* Myagrum siliquâ longâ. *C. B. P.* 109.

866. 2416. —— *officinale*, siliquis spicæ adpressis, foliis runcinatis. *Linn.* Erysimum vulgare. *C. B. P.* 100.

867. 1266. —— orientale, foliis sonchi, flore

fulphureo, filiquis longiſſimis. *Boerh.* [Siſymbrium *orientale.*

868. 1022. —— polyceratium, vel corniculatum. *C. B. P.* 101. [Siſymbrium *polyceratium.*

869. 969. EVONYMO ADFINIS æthiopica, fructu globoſo, ſalicis folio. *Pluk.* [Kiggelaria *africana.*

870. 1767. EVONYMOIDES canadenſis. *Saraz. Boerh. Ind. Alt.* 237. [Celaſtrus *ſcandens?*

871. 1869. EVONYMUS *americanus*, floribus omnibus quinquefidis. *Linn.* Evonymus virginianus pyracanthæ foliis, capſulâ verrucarum inſtar exaſperatâ. *Pluk. Alm.* 139.

872. 1165. —— latifolius. *C. B. P.* 428. [Evonymus *europæus. b. latifolius.*

873. 1468. —— Novi Belgii, corni fœminæ foliis. *H. Amſt.* 86. [Ceanothus *americanus.*

874. 1164. —— vulgaris granis rubentibus. *C. B. P.* 428. [Evonymus *europæus. a. tenuifolius.*

875. 521. EUPATORIOPHALACRON americanum, hyperici foliis, ſemine adunco. *Houſt.* [

876. 422. —— americanum procumbens, albis floribus; foliis parvis undulatis aſperis. *Rand.* [Eclipta *proſtrata?*

877. 423. —— americanum, ſcrophulariæ acu-

tiore folio, discо luteo prominente stipato, vix radiato. *Rand.* [

878. 421. — balsaminæ fœminæ folio; flore albo discoide. *D. Vaill. Act. Par.* 1710. Scabiosa conyzoides americana, capitulis & floribus albidis parvis. *P. B. P. Pluk. Phyt. t.* 109, *f.* 1. [Eclipta *erecta.*

879. 424. — indicum, scrophulariæ folio; capitulo parvo, radiis quinis ad basin ornato, hispidis & glutinosis. *Rand.* An cichoreo affinis lampsana sinica, mentastri foliis; calyce fimbriato hispido; sinicè *hi-himtsaw* dicta. *Pluk. Am.* 58. *Phyt. t.* 380, *f.* 2? [Sigesbeckia *orientalis?*

880. 1520. EUPATORIUM *altissimum*, foliis ovatis serratis petiolatis, caule glabro. *Linn.* Eupatorium urticæ foliis canadense, flore albo. *H. L.* 667. [Eupatorium *Ageratoides.*

881. 919. — americanum herbaceum, melissæ folio, villosum. *Houst.* [

882. 774. — cannabinum. *C. B. P.* 320. Eupatorium Avicennæ. *Off.* [Eupatorium *cannabinum.*

883. 775. — folio oblongo rugoso; caule purpurascente. *T. Inst.* 456. [Eupatorium *purpureum?*

884. 166. — ſenecionis facie, folio lamii. *Par. Bat. Ic.* 161. [Ageratum *Conyzoides.*

885. 270. — valerianoides, triſſaginis folio, abſque pediculis, virginianum. *Pluk. Phyt. t.* 83, *f.* 4. [Eupatorium *rotundifolium.*

886. 658. — virginianum, ſalviæ foliis longiſſimis, acuminatis, perfoliatum. *Pluk. Phyt. t.* 87, *f.* 6. [Eupatorium *perfoliatum.*

887. 2070. EUPHORBIA *coralloides*, umbellâ quinquefidâ: trifidâ: dichotomâ, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, capſulis lanatis. *Linn.*

888. 2366. — hiſpanica, umbellâ quinquefidâ dichotomâ, involucellis cordatis, foliis oblongis integerrimis, emarginatis, capſulis verrucoſis. *Hudſ.* Tithymalus latifolius hiſpanicus. *C. B. P.* 291. [

889. 2069. — inermis fruticoſa, foliis lanceolato-linearibus, floribus erectis, capſulis glabris. *Wilm.* [

890. 1219. EUPHRASIA pratenſis rubra. *C. B. P.* [Euphraſia *Odontites.*

F

891. 1023. FABAGO belgarum, ſive peplus pariſienſium. *Lugd.* [Zygophyllum *Fabago.*

892. 1619. —— triphylla & tetraphylla, flore tetrapetalo, fructu membranaceo quadrangulari. *Burm. Pl. Afr.* 7, *t.* 3. [Zygophyllum *Morgſana.*

893. 620. FAGOPYRUM americanum anguſtifolium procumbens; caulibus lappaceis. *Rand.* [

894. 776. —— erectum, ſeminibus ad angulos dentatis, ſpicatim naſcentibus, ex Ruſſiâ. *Rand.* [Fagopyrum *tataricum.*

895. 1665. —— vulgare erectum. *T. Inſt.* [Polygonum *Fagopyrum.*

896. 621. —— vulgare ſcandens. *T. Inſt.* 511. [Polygonum *Convolvulus.*

897. 323. FERRUM EQUINUM germanicum, ſiliquis in ſummitate. *C. B. P.* 349. [Hippocrepis *comoſa.*

898. 1676. —— ſiliquâ multiplici. *C. B. P.* 349. [Hippocrepis *multiſiliquoſa.*

899. 2072. FERULA durior, ſeu rigidis & breviſſimis foliis. *Bocc. Muſ. p.* 2, *t.* 76. [Bubon *rigidius.*

900. 2071. —— *ferulago*, foliis pinnatifidis: pinnis linearibus planis trifidis. *Linn.*

901. 1420. —— folio glauco, ſemine lato oblongo, quibuſdam thapſia ferulacea. *C. B. P.* [Ferula *glauca.*

902. 920. —— major, ſeu fœmina Plinii. *Mor. Umb.* [Ferula *communis.*

903. 2229. FESTUCA *bromoides*, paniculâ ſecundâ, ſpiculis erectis, calycis valvulâ alterâ integrâ, alterâ acuminatâ. *Linn.*

904. 2368. — *duriuſcula*, paniculâ ſecundâ oblongâ, ſpiculis oblongis lævibus, foliis ſetaceis. *Linn.* Gramen pratenſe, paniculâ duriore laxâ, unam partem ſpectante. *Raii Syn.* 413, *t.* 19, *f.* 1.

905. 2226. — elatior, paniculâ ſecundâ erectâ, ſpiculis linearibus muticis, floribus planis. *Hudſ. Fl. Angl.* 37. Gramen loliaceum, ſpicâ divisâ, pratenſe majus. *H. Ox.* 3, 184, *t.* 2, *fig.* 15. [Feſtuca *elatior.*

906. 2228. — *fluitans*, paniculâ ramoſâ erectâ, ſpiculis ſubſeſſilibus teretibus muticis. *Linn.* Gramen aquaticum cum longiſſimâ paniculâ. *J. B.* 2, 490. *Raii Syn.* 412.

907. 2367. — *myurus*, paniculâ ſpicatâ, calycibus minutiſſimis muticis; floribus ſcabris: ariſtis longis. *L.* Gramen murorum ſpicâ longiſſimâ. *Raii Syn.* 415.

908. 2230. — *ovina*, paniculâ ſecundâ coarctatâ ariſtatâ, culmo tetragono nudiuſculo, foliis ſetaceis. *Linn.* Gramen capillaceum, locuſtis pennatis non ariſtatis. *Pluk. Phyt. t.* 34, *f.* 2. *Raii Syn.* 410.

909. 2227. — pratenſis, paniculâ ſecundâ erec-

tâ, ſpiculis linearibus muticis; floribus planis. *Hudſ. Fl. Angl.* 37. Gramen paniculatum elatius, ſpicis longis muticis & ſquamoſis. *Raii Syn.* 411. [Feſtuca *elatior*.

910. 659. FICOIDES folio parvo, enſiformi; purpureis floribus, ad caulium extremitates ferè umbellatim naſcentibus. *Rand.* An meſembrianthemum falcatum, &c. *Hort. Elth.* 288? [Meſembrianthemum *falcatum* ?.

911. 777. FICUS orientalis, foliis in lacinias anguſtas profundè inciſis. *Rand.* [

912. 721. FILICULA quæ adiantum nigrum officinarum. *Rand.* Adiantum foliis longioribus, pulverulentis; pediculo nigro. *C. B. P.* 355. [Aſplenium *Adiantum nigrum*.

913. 1768. FILIPENDULA, foliis ternatis. *Hort. Cliff.* 191. [Spiræa *trifoliata*.

914. 1125. —— omni parte major, folio anguſtiori. *Boerh.* [

915. 1769. —— vulgaris, an molon Plinii. *C. B. P.* 163. *Off.* 197. [Spiræa *Filipendula*.

916. 1324. FILIX aculeata major, pinnulis auriculatis crebrioribus, foliis integris anguſtioribus. *Raii Syn.* 121. [Polypodium *aculeatum*.

917.

917. 1914. —— mas non ramoſa dentata. *C. B. P.* 358. [Polypodium *Filix mas.*

918. 723. —— ſaxatilis, caule tenui fragili. *Raii Syn.* 50. *Pluk. Phyt.* 180, *f.* 5. [Polypodium *fragile.*

919. 722. —— ſaxatilis, foliis tenuioribus & acutioribus. *Rand.* Adiantum nigrum, pinnulis cicutariæ diviſurâ, D. Bobart. *Raii Syn.* 50. [

920. 167. FŒNUM GRÆCUM quod melilotus corniculis reflexis major. *C. B. P.* 331. [Trigonella *corniculata.*

921. 425. —— ſativum. *C. B. P.* 348. [Trigonella *Fœnum græcum.*

922. 426. —— ſylveſtre polyceration majus creticum. *Breyn. Cent.* 79. [Trigonella *ſpinoſa.*

923. 427. —— ſylveſtre polyceration minus monſpeliacum. *Breyn. Cent.* 79. Hedyſarum minimum. *Dalec. Hiſt. Lugd.* 446. [Trigonella *monſpeliaca.*

924. 2264. FORSKOHLEA *tenaciſſima*, foliis ovatis ſerratis. *Linn.* Chamædrifolia tomentoſa muſcatenſis. *Pluk. Alm.* 97, *t.* 275, *f.* 6.

925. 2468. FRAGARIA *ſterilis*, caule decumbente, ramis floriferis laxis. *L.* Fragaria ſterilis. *C. B. P.* 323.

926. 2417. —— *veſca*, flagellis reptantibus. *L.* Fragaria vulgaris. *C. B. P.* 326.

927. 921. FRAXINELLA flore albo, ſive dictamnus albus. *Off.* [Dictamnus *albus.*

928. { 560. / 2263. } FRAXINUS *Ornus*, foliolis ſerratis, floribus corollatis. *Linn.* Fraxinus florifera botryoides. *Mor. H. R. Bl. Præl.* 265. *Hort. Angl.* 33, *tab.* 9.

929. 1176. FRITILLARIA alba præcox. *C. B. P.* [Fritillaria *Meleagris. c.*

930. 1267. —— lutea, foliis polygonati, fructu breviore. *Boerh.* 2, 139. [Uvularia *perfoliata.*

931. 1175. —— præcox, purpurea, variegata. *C. B. P.* [Fritillaria *Meleagris.*

932. 366. FRUTEX AFRICANUS, ambram ſpirans. *Pluk. Phyt. t.* 183, *f.* 1. [Anthoſpermum *æthiopicum.*

933. 522. FRUTEX VIRGINIANUS, trifolius; ulmi ſamaris, D. Baniſter. *Pluk. Alm.* 159. [Ptelea *trifoliata.*

934. 523. FUMARIA africana, veſicaria ſcandens. *Par. Bat. App.* Ciſticapnos africana ſcandens. *Boerh. Ind.* 310. [Fumaria *veſicaria.*

935. 779. —— bulboſa, radice cavâ major. *C. B. P.* 143. [Fumaria *bulboſa. b. cava.*

936. { 781. / 2517. } —— *Capnoides*, ſiliquis linearibus tetragonis, caulibus diffuſis acutangulis. *Linn. Pluk. Alm.* 262,

t. 90. *Mill. Ic.* Fumaria ſempervirens & florens, flore albo. *Boerh. Ind.* 130.

937. 2320. —— *capreolata*, pericarpiis monoſpermis racemoſis, foliis ſcandentibus ſubcirrhoſis. *Linn.* Fumaria major ſcandens, flore pallidiore. *Raii Syn.* 204.

938. 780. —— lutea. *C. B. P.* 143. [Fumaria *lutea.*

939. 168. —— minor, tenuifolia, cauliculis procumbentibus & caducis. *C. B. P.* 143. [Fumaria *ſpicata.*

940. 778. —— officinarum & Dioſcoridis. *C.B. P.* 143. [Fumaria *officinalis.*

941. 922. —— ſiliquoſa ſempervirens. *Cornuti.* [Fumaria *ſempervirens.*

G

942. 1220. GALEGA africana, floribus majoribus & ſiliquis craſſioribus. *T. Inſt.* [Galega *officinalis. c.*

943. 923. —— quinquefolia, floribus parvis rubris. *Houſt.* [

944. 1177. —— vulgaris, floribus cœruleis. *C.B. P.* [Galega *officinalis.*

945. 1571. GALENIA *africana*, erecta fruticoſa, foliis linearibus carnoſis. *Linn.* Sherardia. *Ponted.*

946. 471. GALEOPSIS fœtidiſſima, ſpicâ longiſſimâ albâ. *Mich.* [Stachys *ſylvatica?*

947. 367. —— hiſpanica, fruteſcens, teucrii folio. *T. Inſt.* 186. [

948. 1915. —— paluſtris, betonicæ folio. *T. Inſt.* Panax coloni. *Off.* 341. [Stachys *paluſtris ?*

949. 782. —— patula ſegetum, flore purpuraſcente. *T. Inſt.* 185. [Sideritis arvenſis rubra. *Park.* [Galeopſis *Ladanum.*

950. 1815. —— ſive urtica iners, flore luteo. *J. B.* [Galeopſis *Galeobdolon.*

951. 1814. GALIUM *boreale*, foliis quaternis lanceolatis trinerviis glabris, caule erecto, ſeminibus hiſpidis. *Linn.* Gallium album quadrifolium erectum. *Celſ. Upſ.* 22.

952. 2159. —— verrucoſum, foliis ſenis lanceolatis ſerrato-aculeatis, pedunculis trifloris, fructibus verrucoſis. *Hudſ.* Aparine ſemine coriandri ſaccharati. *Park. Theatr.* 567. *Rand. Ind. Hort. Chelſ.* 19. [Valantia *Aparine.*

953. 2073. —— *verum*, foliis octonis linearibus ſulcatis, ramis floriferis brevibus. *Linn.*

954. 1813. GALLIUM album linifolium. *Barr. Obſ.* 99. [Galium *glaucum ?*

955. 1469. —— arvenſe, flore cœruleo. *T. Inſt.* [Aſperula *arvenſis.*

956. 1369. —— ſaxatile minimum ſupinum & pumilum *T. Inſt.* 115. [Galium *minutum.*

957. 2469. GARDENIA *florida*, inermis, corollis obtuſis, calyce angulato, foliis ovatis acutis. *Linn.* Jaſminum foliis lanceolatis oppoſitis integerrimis, calycibus acutioribus. *Mill. Ic. t.* 180.

958. 724. GARIDELLA foliis tenuiſſimè diviſis. *T. Inſt.* 655. Nigella cretica foliis fœniculi. *C. B. P.* 146. [Garidella *Nigellaſtrum.*

959. 2470. GENISTA *anglica*, ſpinis ſimplicibus, ramis floriferis inermibus; foliis lanceolatis. *Linn.* Geniſta minor aſphalthoides. *C. B. P.* 395.

960. 2126. —— *candicans*, foliis ternatis ſubtùs villoſis, pedunculis lateralibus ſubquinquefloris foliolatis, leguminibus hirſutis. *Linn.*

961. 169. —— hiſpanica, humilis, floribus congeſtis villoſis, ſparto primo affinis. *C. B. P.* 396. [

962. 1025. —— juncea. *J. B.* Hiſpanica. *Ger.* [Spartium *junceum.*

963. 1816. —— *ſagittalis*, ramis ancipitibus membranaceis articulatis, filiolis ovato-lanceolatis. *Linn.*

964. 622. —— tinctoria. *Ger. Emac.* 1136. [Geniſta *tinctoria.*

965. 1572. —— tinctoria latiſolia lucenſis. *J. B.* [

966. 623. —— tinctoria maxima auſtriaca. *D. Boerh.* [

967. 1026. GENTIANA alpina, magno flore. *J. B.* [Gentiana *acaulis*.

968. 2127. — *amarella*, corollis quinquefidis hypocrateriformibus, fauce barbatis. *Linn.*

969. 1178. — *Off.* Gentiana major lutea. *C. B. P.* [Gentiana *lutea*.

970. 1916. — paluſtris anguſtifolia. *C. P. P.* 188. Pneumonanthe. *Ger.* 355. [Gentiana *Pneumonanthe*.

971. 133. GERANIUM acu longiſſimâ, cicutæ folio tenuiùs laciniato. *Rand.* Geranium cicutæ folio viſcoſum, acu longiſſimâ. *D. Juſſieu.* [

972. 324. — ægyptiacum; althææ folio ſubtùs glauco. *Lipp. D. Juſſieu.* [Geranium *glaucophyllum ?*

973. 134. 135. — æthiopicum, noctu olens, radice tuberosâ, foliis myrrhidis anguſtioribus. *Breyn. Cent.* Geranium triſte. *Cornuti.* 109. [Geranium *triſte*.

974. 142. — africanum, alchimillæ hirſuto folio, floribus albidis. *H. L. Bat.* 282. [Geranium *alchimilloides*.

975. 147. — africanum arboreſcens, alchimillæ hirſuto folio, floribus rubicundis. *Com. Præl.* 51. [Geranium *zonale*.

976. 660. — africanum arboreſcens, flore dilutè coccineo, malvæ folio minore. *Rand. Vid. H. Elth.*

t. 125, *f.* 152. [Geranium *hybridum.*

977. 148. — africanum arboreſcens, folio malvæ plano lucido glabro, flore kermeſino, di van leur. *Boerh. Ind.* 109. [Geranium *inquinans.*

978. { 149. / 150. } — africanum arboreſcens, hibiſci folio rotundo, carlinæ odore. *H. L. Bat.* 274. Geranium africanum arboreſcens, hibiſci folio anguloſo; floribus amplis purpureis. *Rand.* Geranium africanum fruteſcens, alchimillæ folio hirſuto, cum fimbriis purpureis. *Boerh. Ind.* 110. [Geranium *cucullatum.*

979. 146. — africanum arboreſcens, malvæ folio mucronato, petalis florum inferioribus vix conſpicuis. *R.* [Geranium *papilionaceum.*

980. 139. — africanum, betonicæ folio, procumbens, floribus parvis, eleganter variegatis. *Pluk. Alm.* 160. [

981. 136. — africanum, coriandri folio, floribus incarnatis, minus. *H. L. Bat.* 279. [Geranium *coriandrifolium.*

982. 140. — africanum, foliis inferioribus aſari, ſuperioribus ſtaphidis agriæ maculatis, ſplendentibus

& acetoſæ ſapore. *Com. Præl.* 52. [Geranium *peltatum.*

983. 143. — africanum, folio malvæ craſſo, molli odoratiſſimo, floſculo pentapetalo albo. *Boerh. Ind. Alt.* 263. [Geranium *odoratiſſimum.*

984. 137. — africanum fruteſcens, chelidonii folio, petalis florum anguſtis albidis; carnoſo caudice. *Rand.* [

985. 141. — africanum fruteſcens, folio craſſo & glauco, acetoſæ ſapore. *Com. Præl.* 54. [Geranium *acetoſum.*

986. 145. — africanum fruteſcens, malvæ folio laciniato inſtar meliſſæ, flore purpuraſcente. *Boerh. Ind.* 110. [Geranium *capitatum.*

987. 144. — africanum fruteſcens, malvæ folio laciniato odorato. *H. L. Bat.* 277. [Geranium *capitatum.*

988. 1221. — africanum, malvæ folio, petalis florum inferioribus vix conſpicuis. *Ind. Hort. Chelſ.* [

989. 138. — africanum, noctu olens, tuberoſum & nodoſum, aquilegiæ foliis. *H. L. Bat.* 284. [Geranium *gibboſum.*

990. 325. — alpinum, coriandri folio; longiùs radicatum; flore purpureo. *D. Mich. Hort. Piſ.* 68. [

991. 1620. —— anemones folio. *Par. Bat.* 178. [

992. 116. —— annuum minus batrachioides, bohemicum, purpureo-violaceum. *H. Ox. p.* 2, 511. [

993. 129. —— arvenſe album. *Tab. Ic.* 57. [Geranium *cicutarium. b.*

994. 1817. —— batrachioides americanum maculatum, floribus obſoletè purpureis. *Hort. Elth.* 158. [Geranium *maculatum.*

995. 113. —— batrachioides, gratia Dei germanorum. *C. B. P.* 318. [Geranium *pratenſe.*

996. 114. —— batrachioides montanum noſtras. *Raii Hiſt.* 1062. [Geranium *ſylvaticum.*

997. 115. —— batrachioides odoratum. *C. B. P.* 318. [Geranium *macrorhizum.*

998. 125. —— chium vernum, caryophyllatæ folio. *T. Cor.* 20. [Geranium *chium.*

999. 132. —— cicutæ folio, acu longiſſimâ. *C. B. P.* 319. [Geranium *ciconium.*

1000. 170. —— cicutæ folio, erectum romanum. *Boc. Muſ. p.* 2, 93. [

1001. 128. —— cicutæ folio, minus & ſupinum. *C. B. P.* 319. [Geranium *cicutarium.*

1002. 129. —— cicutæ folio moſchatum. *C. B. P.* 319. [Geranium *moſchatum.*

1003. 18. —— columbinum, diſſectis foliis, pe-

diculis florum longiſſimis. *Raii Syn.* 218. [Geranium *columbinum.*

1004. 171. — columbinum erectum, caroliniaum, floribus purpuraſcentibus. *Rand.* [

1005. 105. — columbinum, humile, flore cœruleo minimo. *Raii Syn.* 359. Geranium columbinum tenuiùs laciniatum. *C.B.P.* 318. *Prod.* 138. [Geranium *puſillum.*

1006. { 106. 305. } — columbinum majus, flore minore cœruleo. *R. Hiſt.* 1058. Geranium folio malvæ rotundo. *C.B.P.* 318. Geranium majus, foliis in breviores & latas lacinias diviſis. *Rand.* [Geranium *rotundifolium.*

1007. 107. — columbinum maximum, diſſectis foliis. *Plot. Hiſt. Ox.* [Geranium *diſſectum.*

1008. 19. — columbinum perenne pyrenaicum maximum. *T. Inſt.* 268. [Geranium *pyrenaicum.*

1009. 104. — columbinum petalis florum bifidis albis. *Rand.* An geranium malachoides, flore albo. *H. R. Bl.* 1? [

1010. 103. — columbinum vulgare, petalis florum bifidis purpureis. *Rand.* Geranium ſecundum. *Cam. Ep.* 600. [

1011. 126. — folio alceæ, tenuiter laciniato,

flore pentapetalo, purpuraſcente, ſemine tenui. *Boerh. Ind. Alt.* 266. [Geranium *alceoides.*

1012. 111. — hæmatodes, foliis majoribus pallidioribus & altiùs inciſis, D. Dale. *Raii Syn.* 219. [

1013. 112. 119. — hæmatodes lancaſtrenſe, flore eleganter ſtriato. *Raii Hiſt.* 1061. Geranium ſanguineum, maximo flore. *C. B. P.* 318. [Geranium *ſanguineum.*

1014. 131. 1268. — latifolium, longiſſimâ acu. *C. B. P.* 319. [Geranium *gruinum.*

1015. 101. — lucidum ſaxatile. *C. B. P.* 318. [Geranium *lucidum.*

1016. 122. — lucidum ſaxatile, foliis geranii robertiani, D. Sherard. *Raii Syn.* 218. [

1017. 118. — magnum, folio trifido. *J. B.* 3, 478. [Geranium *nodoſum.*

1018. 130. — myrrhinum, tenuifolium, amplo flore purpureo. *Bar. Obſ.* 55. [Geranium *romanum.*

1019. 108. — orientale, columbinum, flore maximo, aſphodeli radice. *T. Cor.* 20. [

1020. 117. — phæum, flore reflexo. *J. B.* 3, 477. [Geranium *phæum.*

1021. 20. — puſillum, maritimum, ſupinum, althææ aut betonicæ folio, noſtras. *Raii Syn.* 216. [Geranium *maritimum.*

1022. 120. —— robertianum primum. *C. B. P.* 319. [Geranium *robertianum.*

1023. 121. —— robertianum rubens, flore albo. *Rand.* [*(Ejuſd. var.)*

1024. 119. —— romanum verſicolor, ſive ſtriatum. *Park. Parad.* 229. [Geranium *ſtriatum.*

1025. 110. —— ſanguineum, cauliculis erectis, flore minore. *H. L. Bat.* 286. [Geranium *ſanguineum. a.*

1026. 1818. —— *ſibiricum*, pedunculis ſubunifloris, foliis quinquepartitis acutis, foliolis pinnatifidis. *Linn.*

1027. 2265. GEROPOGON *glabrum*, foliis glabris. *Linn.* Tragopogon gramineo folio, glabrum, flore dilutè incarnato. *Raii Hiſt.* 3, 149.

1028. 1126. GEUM folio ſubrotundo majori, piſtillo floris rubro. *T. Inſt.* [Saxifraga *hirſuta ?*

1029. 1127. —— folio ſubrotundo minori, piſtillo floris rubro. *T. Inſt.* [Saxifraga *umbroſa.*

1030. 924. GINGIDIUM foliis fœniculi. *C. B. P.* [Artedia *ſquamata.*

1031. 1819. GLADIOLUS foliis linearibus ſulcatis, caule bifloro, tubo longiſſimo, ſegmentis æqualibus. *Mill. Dict.* [Gladiolus *triſtis ?*

1032. 1966. —— *ramoſus*, caule ramoſo, foliis linearibus. *Linn.*

1033. 1027. GLAUCIUM flore luteo. *T. Inſt.* [Chelidonium *Glaucium.*

1034. 1066. —— flore purpureo. *T. Inſt.* [

1035. 1370. —— hirſutum, flore phœniceo. [Chelidonium *corniculatum.*

1036. 1371. —— orientale, flore magno aureo (rubro). *T. Cor.* [

1037. 2418. GLECOMA *hederacea*, foliis reniformibus crenatis. *Linn.* Hedera terreſtris vulgaris. *C. B. P.* 306.

1038. 1470. GLOBULARIA vulgaris. *T. Inſt.* 466. [Globularia *vulgaris.*

1039. 1967. GLORIOSA *ſuperba*, foliis cirrhiferis. *Linn.* Methonica glorioſa, foliis capreolatis, floribus fimbriatis reflexis. *Burm. Zeyl.* 158. Lilium zeylanicum ſuperbum. *H. Amſt.* 1, *p.* 69, *t.* 35.

1040. 271. GLYCYRRHIZA capite echinato. *C. B. P.* 352. [Glycyrrhiza *echinata.*

1041. 1820. —— ſiliquoſa vel germanica. *C. B. P.* 352. [Glycyrrhiza *glabra.*

1042. 1179. —— ſylveſtris, floribus luteo-palleſcentibus. *C. B. P.* [Aſtragalus *glycyphyllos.*

1043. 2266. GNAPHALIUM *undulatum*, herbaceum, foliis ſubdecurrentibus lanceolatis undulatis acutis ſubtùs tomentoſis, caule ramoſo. *Linn.* Elichryſum graveolens acutifolium, caule alato. *Dill. H. Elth.* 130, *t.* 108, *f.* 130.

1044. 21. GNAPHALODES lusitanica. *T. Inst.* 439. [

1045. 661. GRAMEN americanum, spicâ echinatâ; majoribus locustis. *Sch. Bot.* [Cenchrus *echinatus*.

1046. 662. —— arundinaceum halepense, tragopogonis folio, D. Bobart. *Rand.* [Holcus *halepensis?*

1047. 1028. —— dactylon esculentum. *C. B. P.* Manna vulgaris. *H. L. Bat.* [Festuca *fluitans*.

1048. 272. —— dactylon majus; paniculâ longâ, spicis plurimis nudis crassis. *Sloan. H. Tom.* 1, 112, *t.* 69, *f.* 2. [Paspalum *virgatum*.

1049. 273. —— dactylon, paniculâ longâ, è spicis plurimis gracilioribus purpureis mollibus constante. *Sloan. H. Tom.* 1, 113, *t.* 70, *f.* 2. [Panicum *sanguinale*.

1050. 663. —— miliaceum americanum latifolium; paniculâ parvâ laxâ. *Rand.* An gramen miliaceum americanum majus; paniculâ minore. *Pluk. Alm.* 176? [

1051. 667. —— paniceum jamaicense, spicâ divisâ nitidâ. *Rand.* [

1052. 665. —— paniceum, spicâ asperâ. *C. B. P.* 8. [Panicum *verticillatum*.

1053. 666. —— paniceum, spicâ divisâ. *C. B. P.* 8. [Panicum *Crus galli*.

1054. 664. —— paniceum, spicâ simplici lævi. *Raii Syn.* 249. [Panicum *viride?*

1055. 1732. —— ſpicâ ariſtatâ. *Linn. Sp. Pl.* 83. Gramen loliaceum, ſpicâ longiore, lolium Dioſcoridis. *C. B. P.* [Lolium *temulentum.*

1056. 624. GRANADILLA, flore albo, fructu reticulato. *Boerh. Ind.* 82. [Paſſiflora *fœtida?*

1057. 562. —— folio tricuſpidi, latiori; flore minimo. *Rand.* An granadilla folio tricuſpidi, flore parvo flaveſcente. *T. Inſt.* 240? [Paſſiflora *lutea?*

1058. 561. —— hiſpanis, flos paſſionis italis. *Col. in Recch.* 889. [Paſſiflora *incarnata.*

1059. 625. —— oblongo acuminato folio, flore purpureo. *Rand.* An granadilla folio oblongo ſerrato, flore purpureo. *D. Houſton?* [Paſſiflora *ſerratifolia?*

1060. 970. GUAIACANA virginiana piſhamin dicta. *Park.* [Dioſpyros *virginiana.*

1061. 2017. GUALTHERIA *procumbens. Linn.*

1062. 1222. GUIDONIA ulmi folio, flore roſeo. *Plum.* [Samyda *ſerrulata.*

1063. 1917. GUNDELIA foliis pinnatifidis, ſpinoſis, capite araneosâ lanugine obſito. *Mill. Ic.* [Gundelia *Tournefortii.*

1064. 2074. GYPSOPHILA *altiſſima*, foliis lanceo-

latis ſubtrinerviis, caulibus rectis. *Linn.*

1065. 1870. — *faſtigiata*, foliis lanceolato-linearibus obſoletè triquetris lævibus obtuſis ſecundis. *Linn.* Saponaria petalis ovatis, foliis glaucis pulpoſis. *Hall. Jen.* 117.

1066. 2160. — piloſa, foliis lanceolatis trinerviis amplexicaulibus, caule piloſo, floribus ſolitariis, pedunculis filiformibus longiſſimis. *Hudſ.* [

1067. 2161. — *proſtrata*, foliis lanceolatis lævibus, caulibus diffuſis, piſtillis corollâ campanulatâ longioribus. *Linn.*

1068. 2369. — *rigida*, foliis linearibus planis, caule dichotomo, pedunculis bifloris, petalis emarginatis. *L.*

H

1069. 2419. HALESIA *tetraptera*, foliis lanceolato-ovatis, petiolis glanduloſis. *Linn.* Haleſia fructibus membranaceis quadrangulatis. *Philoſ. Tranſ.* 51, 931.

1070. 2267. HAMELLIA *patens*, racemis patentibus. *Linn.* Periclymenum arboreſcens, ramulis inflexis, flore luteo. *Plum. Ic.* 218.

1071.

1071. 925. HARMALA. *Off.* Ruta quæ dici ſolet harmala. *J. B.* [Peganum *Harmala.*

1072. 2162. HEDERA *quinquefolia*, foliis quinatis ovatis ſerratis. *Linn.* Hedera quinquefolia canadenſis. *Corn. Canad.* 99, *t.* 100.

1073. 368. HEDYPNOIS annua. *T. Inſt.* 478. [Hyoſeris *Hedypnois.*

1074. 369. — cretica minor annua. *T. Cor.* 36. [Hyoſeris *Hedypnois. b.*

1075. 370. — hiſpanica procumbens, magno capite. *Rand.* An Hedypnois annua capite maximo. *Boerh. Ind. Alt.* 93? [

1076. 1067. HEDYSARUM annuum, ſiliquâ aſperâ undulatâ intortâ. *T. Inſt.* [

1077. 2370. — *Caput galli*, foliis pinnatis, leguminibus monoſpermis: criſtæ dentibus ſubulatis; alis breviſſimis, caule diffuſo. *Linn.* Onobrychis fructu echinato minor. *C. B. P.* 350.

1078. 927. — clypeatum, flore ſuaviter rubente. *Hort. Eyſt.* [Hedyſarum *coronarium.*

1079. 2018. — foliis ſimplicibus ovatis acuminatis, ſpicis longiſſimis nudis terminalibus. *Wilm.* [

1080. 524. — triphyllum, canadenſe. *Cornut.* 44. [Hedyſarum *canadenſe.*

1081. 472. — triphyllum, fruticoſum, flore

purpureo, siliquâ variè distortâ. *Sloan. H.* 184, *t.* 116, *f.* 2. [

1082. 725. HELENIASTRUM americanum, latifolium, serratum. *Rand.* [

1083. 371. —— folio longiore & angustiore. *D. Vaill. Act. Par.* 1720. [Helenium *autumnale.*

1084. 372. —— seriùs florens; latiore folio, ramosissimum. *Rand.* An heleniastrum folio breviore & latiore. *D. Vaill. Act. Par.* 1720? [Helenium *autumnale. a.*

1085. 1068. HELENIUM. *Off.* Enula campana. *Park.* [Inula *Helenium.*

1086. 2268. —— *autumnale*, foliis serratis. *Linn.* After floridanus, caule alato. *Pluk. t.* 372, *f.* 9.

1087. 72. HELIANTHEMUM ampliore folio, flore roseo. *D. Sherard.*

1088. 71. —— anglicum, vulgari simile, flore stellato. *Rand.* [

1089. 1323. —— foliis sampsuchi, capitulis valdè hirsutis. *J. B.* [Cistus *pilosus. c.*

1090. 73. —— halimi folio, angustiore, acuto. *Rand.* An cistus halimi folio 2. *Clus. Hist.* 71? [Cistus *halimifolius?*

1091. 1269. —— salicis folio. *T. Inst.* 249. [Cistus *salicifolius.*

1092. 1471. —— saxatile, foliis & caulibus incanis Apennini montis. *Ment.* [Cistus *apenninus.*

1093. 1223. —— vulgare, flore luteo. *J. B.* [Ciſtus *Helianthemum.*

1094. 2269. HELICTERES *baruenſis*, decandra; foliis cordatis ſerratis, fructu contorto, apiculis rectis. *Linn.* Helicteres arbor Indiæ orientalis, ſiliquâ varicoſâ & funiculi in modum contortuplicatâ. *Pluk. Alm.* 181, *t.* 245, *f.* 2.

1095. 1621. HELIOTROPIUM canarienſe arboreſcens, flore ſcorodoniæ. *H. Amſt.* 129. [Mentha *canarienſis.*

1096. 1770. —— foliis ovato-lanceolatis, ſpicis plurimis confertis, caule fruticoſo. *Mill. Ic.* [Heliotropium *peruvianum.*

1097. { 274. / 2321. } —— *indicum*, foliis cordato-ovatis ſcabriuſculis, ſpicis ſolitariis, fructibus bifidis. *Linn.* Heliotropium americanum cœruleum, foliis hormini. *Dodart. Mem.* 83. *Pluk. Phyt. t.* 205, *f.* 4.

1098. 275. —— majus Dioſcoridi. *C. B. P.* 253. [Heliotropium *europæum.*

1099. 473. —— maritimum, minus, folio glauco, flore albo. *Sloan. H.* 1, 213, *t.* 132, *f.* 2. [Heliotropium *curaſſavicum.*

1100. 1918. HELLEBORINE latifolia montana. *C. B. P.* 186. [Serapias *latifolia.*

1101. 2420. HELLEBORUS *fœtidus. b*, caule multifloro folioſo, foliis pedatis. *L.* Helleborus niger trifoliatus. *Mor.*

1102. 1372. — fumariæ foliis. *Amm. Ruth.* 74. [Iſopyrum *fumarioides.*

1103. 1069. — niger, flore roſeo. *C. B. P. Off.* [Helleborus *niger.*

1104. 1029. — niger fœtidus. *C. B. P.* 126. [Helleborus *fœtidus.*

1105. 1180. — niger folio ranunculi, flore globoſo. *T. Inſt.* [Trollius *europæus.*

1106. 668. — niger hortenſis, flore viridi. *C. B. P.* 185. [Helleborus *viridis.*

1107. 1677. HELXINE foliis lanceolatis, caule diffuſo. *H. Upſ.* 96. Fagopyrum orientale ramoſum & multiflorum, perſicariæ folio. *T. Cor.* [Polygonum *divaricatum.*

1108. 926. HERBA PARIS. *Off.* [Paris *quadrifolia.*

1109. 327. HERMANNIA alni folio parvo. *Rand.* An ketmia africana, fruticans & erecta, alni foliis latioribus & majoribus, flore ſpirali ſulphureo. *H. Amſt. p.* 2, 155? [Hermannia *alnifolia ?*

1110. 1622. — folio ibiſci hirſuto, flore primò luteo, deindè purpuro-rubello. *Wilm.* An hermannia fruteſ-

cens, folio oblongo molli cordato hirſuto. *Boerh. Ind. Alt.* [Hermannia *trifoliata?*

1111. { 172. / 1270. } — fruteſcens, foliis oblongis, ad apices tantummodò ſerratis. *Rand.* Hermannia fruteſcens, folio oblongo ſerrato. *T. Inſt.* 656. [Hermannia *hyſſopifolia.*

1112. 326. — fruteſcens, folio ibiſci hirſuto molli, caule piloſo. *Boerh. Ind.* 1, 115. [Hermannia *althæifolia.*

1113. 1030. — fruteſcens, folio lavendulæ latiori & obtuſo, flore parvo aureo. *H. R. P. Boerh. Ind.* 1, 273. [Hermannia *lavendulifolia.*

1114. 328. — minimo alni folio. *Rand.* An ketmia africana fruteſcens & erecta, alni foliis triplo minoribus. *H. Amſt. p.* 2, 155? [

1115. 783. HERNANDIA, amplo hederæ folio umbilicato. *Plum. Nov. Gen.* 6. Nux veſicaria oleoſa, foliis umbilicatis, ex inſulâ barbadenſi. *Pluk. Ph.* 208, *f.* 1. [Hernandia *ſonora.*

1116. 428. HERNIARIA glabra. *J. B.* 3, 378. [Herniaria *glabra.*

1117. 429. — hirſuta. *J. B.* 3, 379. [Herniaria *hirſuta.*

1118. 1274. HESPERIS caule ramoſiſſimo; foliis lanceolatis ſæpiùs dentatis. *H. Cliff.* [Cheiranthus *chius.*

1119. 1272. —— exigua lutea, folio dentato angusto. *Boerh.* 2, 20. [

1120. 1275. —— flore albo minimo; siliquâ longâ; folio profundè laciniato. *Boerh.* [Sisymbrium *bursifolium.*

1121. 1421. —— leucoii folio non serrato, siliquâ quadrangulâ. *T. Inst.* 223. [Cheiranthus *Erysimoides.*

1122. 1623. —— lutea, siliquis strictissimis. *T. Inst.* 222. Draba lutea quibusdam. *J. B.* 2, 870. [Sisymbrium *strictissimum.*

1123. 1273. —— maritima angustifolia incana. *T. Inst.* 223. [Cheiranthus *tristis.*

1124. 1573. —— sicula frutescens, siliquâ tricuspidi. *T. Inst.* Leucoium minus fruticans purpureum montanum crucigerum. *Boc. p.* 2, 148, *t.* 3. [Cheiranthus *tricuspidatus?*

1125. 1271. —— sylvestris inodora. *C. B. P.* 202. [Hesperis *inodora.*

1126. 2471. HEUCHERA *americana*, scapis subnudis, thyrso elongato, foliis radicalibus longè petiolatis septemlobis, bis acutè crenatis. *L.* Sanicula seu cortusa americana spicata, &c. *Pluk. Alm. t.* 58, *f.* 3.

1127. 1919. HIBISCUS foliis inferioribus trilobis, summis quinquepartitis obtusis crenatis, calycibus inflatis. *Dict. Hort.* [Hibiscus *Trionum?*

1128. 1403. HIERACIUM alpinum, ſcorzoneræ folio. *T. Inſt.* 1472. [Crepis *alpina.*

1129. 1373. —— calyce barbato. *Col. Ec.* 2, 27. [Crepis *barbata.*

1130. { 75. / 1324. } —— caſtorei odore noſtras. *Rand.* Hieracium cichorei vel potiùs ſtœbes folio, hirſutum. *Raii Cat. Cant.* Hieracium amygdalas amaras olens, ſeu odore apuli ſuaverubentis. *H. R. P.* [Crepis *fœtida.*

1131. 1678. —— caule ramoſo, foliis firmis infimis petiolatis, reliquis ex ovato lanceolatis ſemi-amplexicaulibus omnibus ſinuoſis, petiolorum inſtar dentatis. *Fl. Sibir.* 2, 26, *t.* 10. [Crepis *ſibirica.*

1132. 626. —— chondrillæ folio, hirſutum. *C. B. P.* 127. [Crepis *tectorum.*

1133. 1624. —— echioides, capitulis cardui benedicti majus arabicum, folio ſinuato. *H. Ed.* [Picris *Echioides ?*

1134. 373. —— fruticoſum anguſtifolium, incano folio. *H. L. Bat.* 316. [Hieracium *umbellatum. c.*

1135. 1771. —— fruticoſum latifolium hirſutum. *C. B. P.* 129. [Hieracium *ſabaudum.*

1136. 928. —— hortenſe, floribus atropurpureis. *C. B. P.* [Hieracium *aurantiacum.*

1137. 1574. —— incanum lanuginoſum raguſinum, piloſellæ flore. *H. Lugd. App.* [Andryala *raguſina.*

1138. 526. —— medio nigrum, bœticum latifolium, amplo flore. *Rand.* [Crepis *barbata. b ?*

1139. 525. —— medio nigrum bœticum, minus. *Park. Th.* 792. [

1140. 1031. —— montanum, tomentoſum. *Mor. H. R. Bleſ.* [Andryala *lanata.*

1141. 374. —— pulmonaria dictum, latifolium humilius, ramulis expanſis. *Rand.* [

1142. { 74. / 2128. } —— *pyrenaicum (b. blattarioides)*, foliis amplexicaulibus obovato-lanceolatis, retrorsùm dentatis, caule ſimplici, calycibus laxis. *Linn.* Hieracium pyrenaicum blattariæ folio, minus, hirſutum. *Sc. Bot.*

1143. 1625. —— pyrenaicum, longifolium amplexicaule. *T. Inſt.* 472. [Hieracium *amplexicaule.*

1144. 1422. —— villoſum, ſonchus lanatus Dalechampii dictum. *T. Inſt.* 231. [Andryala *integrifolia.*

1145. 1575. HIPPOCREPIS *uniſiliquoſa*, leguminibus ſeſſilibus ſolitariis rectis. *Linn.* Ferrum equinum ſiliquâ ſingulari. *T. Inſt.* 400.

1146. 2232. HOLCUS *bicolor*, glumis glabris nigris, ſeminibus globoſis albis ariſtatis. *Linn.* Milium arundi-

naceum ſubrotundo ſemine, ſorgho nominatum. *C. B. P.* 36. *H. Ox.* 3, 196, *t.* 5, *f.* 7.

1147. 2231. —— *ſpicatus*, glumis bifloris muticis, floribus geminis penicillo involucratis, ſpicâ ovato-oblongâ. *Linn.* Gramen paniceum ſylveſtre maximum, Indiæ orientalis. *Pluk. Phyt. t.* 32, *f.* 4.

1148. 2270. HOLOSTEUM *cordatum*, foliis ſubcordatis. *Linn.* Alſine americana, nummulariæ folio. *Herm. Parad.* 11, *t.* 11.

1149. 2271. —— *umbellatum*, floribus umbellatis. *Linn.* Lychnis graminea hirſuta umbellifera. *Mor. Hiſt.* 2, *p.* 546, *ſ.* 5, *t.* 22, *f.* 46.

1150. 2324. HORDEUM *diſtichon*, floſculis lateralibus maſculis muticis, ſeminibus angularibus imbricatis. *Linn.* Hordeum diſtichon. *C. B. P.* 22. *Hiſt. Ox.* 3, *ſ.* 8, *t.* 6, *f.* 1.

1151. 2233. —— *murinum*, floſculis lateralibus maſculis ariſtatis, involucris intermediis ciliatis. *Linn.* Gramen ſecalinum chalepenſe, radice tuberosâ. *H. Ox.* 3, 179. *t.* 6, *f.* 7.

1152. 2322. —— *vulgare*, floſculis omnibus hermaphroditis ariſtatis: ordinibus duobus erectioribus. *Linn.* Hor-

deum polyſtichon vernum. *C. B. P.* 22. *H. Ox.* 3, *ſ.* 8, *t.* 6, *f.* 3.

1153. 2323. —— *vulgare. b. cœleſte*, floſculis omnibus hermaphroditis, ſeminibus decorticatis. *Linn. H. Upſ.*

1154. 2371. —— *Zeocriton*, floſculis lateralibus maſculis muticis, ſeminibus angularibus patentibus corticatis. *Linn.* Zeocriton ſeu oryza germanica. *C. B. P.* 22.

1155. 1224. HORMINUM comâ purpuro-violaceâ. *J. B.* [Salvia *Horminum.*

1156. 1070. —— luteum, glutinoſum. *C. B. P.* [Salvia *glutinoſa.*

1157. 1424. —— napi folio. *Mor. H. R. Bl.* [

1158. 1032. —— pratenſe flore minimo. *Sch. Bot.* [Salvia *Verbenaca. a.*

1159. 22. —— ſylveſtre, latifolium, verticillatum. *C. B. P.* 238. [Salvia *verticillata.*

1160. 1033. —— ſylveſtre, lavendulæ flore. *C. B. P.* 219. [Salvia *Verbenaca.*

1161. 1679. —— verbenæ laciniis anguſtifolium. *Triumf.* [Salvia *Verbenaca.*

1162. 2325. —— virginicum, foliis cuneiformi-oblongis, caule bifolio. *Sp. Pl.* Meliſſa atrorubens, bugulæ folio. *Dill. H. Elth.* 219, *t.* 175, *f.* 216. [Salvia *lyrata. b.*

1163. 1968. HYACINTHUS corollis irregularibus ſexpartitis. *Linn. Sp. Pl.* 318. [Phormium *Hyacinthoides.*

1164. 1821. HYDRANGEA *arboreſcens. Linn. Gron. Fl. Virg.* 50.

1165. 1021. HYDROPHYLLUM Morini. *Hort. Joncq.* [Hydrophyllum *virginicum.*

1166. 819. HYOSCYAMUS albus major, vel ſecundus Dioſcoridis & quartus Plinii. *C. B. P.* 169. [Hyoſcyamus *albus.*

1167. 821. —— luteus minor fruteſcens. *Rand.* [Hyoſcyamus *aureus. b?*

1168. 820. —— major, albo ſimilis, umbilico floris atro-purpureo. *T. Cor.* 1. [Hyoſcyamus *muticus?*

1169. 1772. —— rubello flore. *C. B. P.* 169. Hyoſcyamus ſyriacus. *Cam. Ic.* 21. *J. B.* 3, 628. [Hyoſcyamus *reticulatus.*

1170. 1576. HYOSERIS foliis glabris, haſtato-pinnatis. *Fl. Leyd. Prodr.* Dens leonis minor, foliis radiatis. *C. B. P.* [Hyoſeris *radiata.*

1171. 1325. HYPECOUM latiore folio. *T. Inſt.* 230. [Hypecoum *procumbens.*

1172. 1521. —— tenuiore folio. *T. Inſt.* 230. [Hypecoum *pendulum.*

1173. 2163. HYPERICUM *Androſæmum*, floribus trigynis, fructibus baccatis, caule fruticoſo ancipiti. *Linn.* Hypericum maximum, androſæmum vulgare dictum. *Raii Syn.* 343. Androſæmum maximum fruteſcens. *C. B. P.* 208.

1174. 2169. — *balearicum*, floribus pentagynis, caule fruticoſo, foliis ramiſque cicatriſatis. *Linn.* Myrto-ciſtus Pennæi. *Cluſ. Hiſt.* 1, *p.* 68.

1175. 2168. — *elodes*, floribus trigynis, caule tereti repente, foliiſque villoſis ſubrotundis. *Linn.* Aſcyrum ſupinum villoſum paluſtre. *C. B. P.* 280.

1176. 1872. — fœtidum fruteſcens. *T. Inſt.* Tragium legitimum veterum Ponæ. *Bald.* 88. [Hypericum *hircinum.*

1177. 1871. — fœtidum fruteſcens majus. *T. Inſt.* Hypericum fruteſcens canarienſe multiflorum. *H. Amſt.* [Hypericum *canarienſe.*

1178. 2019. — floribus monogynis, foliis lineari-lanceolatis obtuſis, caule fruticoſo. *Wilm.* [

1179. 2075. — floribus tetragynis, caule erecto herbaceo ſimplici, foliis integerrimis, ſemi-amplexicaulibus. *Wilm.* [

1180. { 784. / 2164. } — *hirſutum*, floribus trigynis, calycibus ſerrato-glanduloſis, caule tereti erecto, foliis ovatis ſubpubeſcentibus. *Linn.* Androſæmum hirſutum. *C. B. P.* 280. Hypericum androſæmum dictum. *J. B.* Androſæmum alterum hirſutum. *Col. Ecp.* 75.

1181. 2166. — *humifuſum*, floribus trigynis

axillaribus ſolitariis, caulibus ancipitibus proſtratis filiformibus, foliis glabris. *Linn.* Hypericum minus ſupinum glabrum. *C. B. P.* 279.

1182. 1773. — monogynum, floribus monogynis, ſtaminibus corollâ longioribus, calycibus coloratis, caule fruticoſo. *Linn.* [Hypericum *chinenſe.*

1183. 2165. — *montanum*, floribus trigynis, calycibus ſerrato-glanduloſis, caule tereti erecto, foliis ovatis glabris. *Linn.* Hypericum elegantiſſimum non ramoſum, folio lato. *J. B.* 3, 383.

1184. 1774. — *olympicum*, floribus trigynis, calycibus acutis, ſtaminibus corollâ brevioribus, caule fruticoſo. *Linn.*

1185. 1873. — orientale, fœtido ſimile, ſed inodorum. *T. Cor.* [

1186. 1128. — orientale, roris-marini folio. *Amm.* [

1187. 23. — perfoliatum & perforatum. *T. Inſt.* 255. [

1188. 2167. — *pulchrum*, floribus trigynis, calycibus ſerrato-glanduloſis, caule tereti, foliis amplexicaulibus cordatis glabris. *Linn.*

1189. 2272. — *tomentoſum*, floribus trigynis, calycibus ſerrato-glanduloſis, foliis ſemi-amplexicaulibus

flexuoſis tomentoſis, caulibus proſtratis. *Linn.* Hypericum ſupinum tomentoſum album. *Cluſ. Hiſt.* 2, *p.* 181.

1190. 2076. HYPOCHÆRIS calycibus æqualibus hiſpidis. *H. Cliff.* 385. [Seriola *æthnenſis.*

1191. 2421. HYPOXIS *erecta*, piloſa, capſulis ovatis. *Linn.* Ornithogalum herbaceum luteum parvum virginianum, foliis gramineis hirſutis. *Pluk. Alm.* 272, *t.* 350, *f.* 12.

1192. 2472. HYSSOPUS *officinalis*, ſpicis ſecundis, foliis lanceolatis. *Linn.* Hyſſopus officinarum cærulea, ſeu ſpicata. *C. B. P.* 217.

1193. 563. —— rubro flore. *C. B. P.* 217. [Hyſſopus *officinalis. b.*

J

1194. 24. JACEA altiſſima, folio diſſecto, capite ovarii nudo. *D. Vaill.* [

1195. 1426. —— anguſtifolia minor virginiana, tuberoſâ radice. *Baniſt.* [Serratula *ſpicata ?*

1196. 1326. —— cinerea laciniata, flore purpureo. *Triumf.* [Centaurea *Cineraria. b.*

1197. 276. —— cum ſquamis pennatis, ſive capite villoſo. *J. B.* 3, 28. [Centaurea *pectinata.*

1198. 1427. —— foliis candicantibus laciniatis, calyculis non ſplendentibus. *T. Inſt.* [Centaurea *paniculata.*

1199. 1472. —— foliis cichoraceis villoſis altiſſima, floribus albis & purpureis. *T. Inſt.* 444. [Centaurea *ſalmantica.*

1200. 1523. —— laciniata, flore luteo magno, ſquamis calycum ciliaribus ſplendentibus. *Gerb. Tan.* 172. [Centaurea *raguſina.*

1201. 25. —— luſitanica ſempervirens. *H.R.P.* [Centaurea *ſempervirens.*

1202. 1969. —— marina bœtica. *Park.* 473. [

1203. 971. —— non ramoſa, tuberosâ radice, latifolia Baniſter. *Pluk.* [Serratula *ſcarioſa ?*

1204. 972. —— non ramoſa, tuberosâ radice, anguſtifolia, &c. [Serratula *ſpicata ?*

1205. 1225. —— ſpinoſa alata cinerea, caule ſpinis luteis longiſſimis. *Mill.* [

1206. 1425. —— ſpinoſa alato caule, capite lanuginoſo. *C. B. P.* [Centaurea *eriophora.*

1207. 1327. —— ſpinoſa cretica. *Zanon.* [Centaurea *romana.*

1208. 1522. —— tartarica, laciniatis foliis. *Gerb. Hort. Carolſt.* 104. [

1209. 973. JACOBÆA ætnica, chenopodii folio. *Hort. Cath.* [

1210. 527. —— afra, folio botryos. *Boerh. Ind. Alt.* 99. [

1211. 173. —— africana fruteſcens, flore amplo purpureo elegantiſſimo, ſenecionis folio. *Volk. Fl. Norimb.* [Senecio *elegans. b.*

1212. 1473. —— africana fruteſcens, foliis inciſis & ſubtùs cineraceis. *Com. Rar.* [Senecio *illicifolius.*

1213. 877. —— foliis ferulaceis. *Rand.* [

1214. 329. —— hiſpanica, minus laciniata, petalis breviſſimis. *T. Inſt.* 486. [Senecio *trilobus.*

1215. 929. —— maritima. *C. B. P.* [Cineraria *maritima.*

1216. 528. —— pannonica prima. *Cluſ. Hiſt.* 21. Senecio incanus pinguis. *C. B. P.* 131. [Senecio *viſcoſus.*

1217. 26. —— perennis aſplenii folio. *D. Vaill.* [

1218. 174. —— ſicula, chryſanthemi facie. *Boc. Rar. p.* 66. [

1219. 1626. JASMINOIDES aculeatum humile, halimi minoris folio, flore majore violaceo, fructu craſſiore per maturitatem flaveſcente. *Mich. Nov. Gen.* 224. [Lycium *barbarum.*

1220. 1374. JASMINUM africanum, ilicis folio, flore albo. *Com. Rar.* [Lantana *africana.*

1221. 330. —— arabicum; caſtaneæ folio, flore albo odoratiſſimo; cujus fructus coffy in officinis. *Boerh. Ind. Alt.* 217. Arbor yemenſis fructum

tum cofè ferens. *D. Douglas.* [Coffea *arabica.*

1222. 564. —— azoricum trifolium ; flore albo odoratiſſimo. *H. Amſt.* 1, *p.* 159. [Jaſminum *azoricum.*

1223. 1874. —— foliis lanceolatis oppoſitis integerrimis, calycibus acutioribus. *Mill. Ic.* [Gardenia *florida.*

1224. 822. —— humilius, magno flore. *C. P. P.* 398. [Jaſminum *grandiflorum.*

1225. 1072. —— luteum indicum odoratiſſimum. *Ferrar.* [Jaſminum *odoratiſſimum.*

1226. 2473. —— *officinale*, foliis oppoſitis, foliolis diſtinctis. *Linn.* Jaſminum vulgatius, flore albo. *C. B. P.* 397.

1227. 1181. —— ſive ſambach arabum, Alpini. *J. B.* [Nyctanthes *Sambac.*

1228. 1034. ILEX oblongo ſerrato folio. *C. B. P.* 234. [Quercus *Ilex.*

1229. 1970. IMPATIENS pedunculis unifloris, foliis ovato-lanceolatis, geniculis caulinis tumentibus. *Wilm.* [Impatiens *Balſamina ?*

1230. {1129. 2129.} IMPERATORIA. *H. Cliff.* 103. Imperatoria major. *C. B. P.* [Imperatoria *Oſtruthium.*

1231. 2518. INULA *ſquarroſa*, foliis ſeſſilibus ovalibus lævibus reticulato-venoſis ſubcrenatis, calyce ſquarroſo. *Linn.* After luteus latifolius glaber, foliis rigidis & minutiſ-

simè crenatis. *Pluk. Alm.* 37, *t.* 16, *f.* 1.

1232. 2020. IPOMŒA *triloba*, foliis trilobis cordatis, pedunculis trifloris. *Linn.*

1233. 1775. IRIS corollis barbatis, germinibus trigonis, foliis ensiformibus longissimis, caule foliis longiore trilobo. *Mill. Ic.* [

1234. 1474. —— paluſtris lutea, seu acorus adulterinus. *J. B.* 2, 732. *Off.* 249. [Iris *Pseudacorus.*

1235. { 823. / 2372. } —— *tuberosa*, imberbis, foliis tetragonis. *Linn.* Iris tuberosa, folio anguloso. *C. B. P.* 40.

1236. { 2077. / 2130. } ISATIS *ægyptia*, foliis omnibus dentatis. *Linn.*

1237. 1776. —— sativa, sive latifolia. *C. B. P.* 113. Glastum sativum. *J. B.* 2, 909. [Isatis *tinctoria. b.*

1238. 1971. ITEA *virginica. Linn.*

1239. 1777. JUNIPERUS vulgaris fruticosa. *C. B. P.* 488. *Off.* 252. [Juniperus *communis.*

1240. 2326. JUSTICIA *hyssopifolia*, fruticosa, foliis lanceolatis integerrimis, pedunculis trifloris ancipitibus, bracteis calyce brevioribus. *L.*

1241. 1779. IXIA, foliis gladiolatis glabris, floribus corymbosis terminalibus. *Mill. Ic.* [Ixia *corymbosa.*

1242. 1778. —— foliis gladiolatis linearibus, caule bulbifero. *Mill. Ic.* [Ixia *bulbifera.*

1243. 1972. —— foliis lanceolatis nervoſis, pubeſcentibus, ſcapo trifloro. *Wilm.* [

1244. 1973. —— foliis lineari-gladiolatis, floribus alaribus & terminalibus. *Mill. Ic. t.* 155, *f.* 2. [Ixia *polyſtachia.*

1245. 1875. —— planifolia, caule multifloro, ſpathâ breviſſimâ. *Mill.* [Ixia *crocata.*

K

1246. 1577. KÆMPFERIA *Galanga. Linn.* Aro-orchis tuberoſa platyphyllos. *Breyn.*

1247. { 220. / 221. } KALI ſpinoſum, foliis longioribus & anguſtioribus. *T. Inſt.* 247. Kali ſpinoſum, foliis craſſioribus & brevioribus. *T. Inſt.* 247. [Salſola *Tragus.*

1248. 1920. KALMIA *anguſtifolia*, foliis lanceolatis, corymbis lateralibus. *L.*

1249. 1627. KETMIA ægyptiaca, vitis folio, parvo flore. *T. Inſt.* [

1250. 529. —— afra veſicaria; foliis profundiùs inciſis, vix crenatis. *Boerh. Ind.* 272. [

1251. 1035. —— ſyrorum, flore albo. *Boerh.* [Hibiſcus *ſyriacus. d.*

1252. 1277. —— ſyrorum quibuſdam. *C. B. P.* 316. [Hibiſcus *ſyriacus.*

1253. 530. — veſicaria africana. *T. Inſt.* 101. [Hibiſcus *Trionum. b.*

1254. 531. — veſicaria vulgaris. *T. Inſt.* 101. [Hibiſcus *Trionum.*

1255. 2474. KNAUTIA *orientalis*, foliis inciſis, corollulis quinis calyce longioribus. *Linn.* Scabioſa orientalis, caryophylli flore. *Vaill. Act. Par.* 1722, *p.* 241.

L

1256. 565. LACHRYMA JOB. *Cluſ. Hiſt.* 216. [Coix *Lachryma.*

1257. 222. LACTUCA canadenſis, altiſſima, latifolia, flore leucophæo. *T. Inſt.* 474. [

1258. 335. — perennis humilior, flore cœruleo. *T. Inſt.* 473. [Lactuca *perennis.*

1259. 2327. — *Scariola*, foliis verticalibus carinâ aculeatis. *Linn.* Lactuca ſylveſtris, coſtâ ſpinosâ. *C. B. P.* 123.

1260. 1970. — ſylveſtris minima. *Raii Syn.* 3, 162. Chondrilla viſcoſa humilis. *C. B. P.* 130. [Lactuca *ſaligna.*

1261. 2422. LAMIUM *album*, foliis cordatis acuminatis ſerratis petiolatis, verticillis viginti-floris. *Linn.* Lamium album non fœtens, folio oblongo. *C. B. P.* 231.

1262. 1822. —— foliis caulem ambientibus. *C. B. P.* 231. [Lamium *amplexicaule.*

1263. 375. —— gargauicum ſubincanum, flore purpuraſcente, cum labio ſuperiori crenato. *Mich. Hort. Piſ.* 93, *tab.* 32. [Lamium *garganicum.*

1264. 376. —— orientale, argentatum, annuum, flore albo. *Rand.* Lamium moſchatum, foliorum marginibus argentatis. *Wheel. Itin.*

1265. 2423. —— *purpureum*, foliis cordatis obtuſis petiolatis. *Linn.* Lamium purpureum fœtidum, folio ſubrotundo. *C. B. P.* 230.

1266. 377. —— purpureum perenne; foliis acutis profundè inciſis. *Rand.* Lamium, folio oblongo, flore rubro. *Park. Theatr.* 606. [Lamium *album. a.*

1267. 1182. —— rubrum minus, foliis profundè inciſis. *Raii Syn.* [Lamium *purpureum. d.*

1268. 2522. LANTANA *involucrata*, foliis oppoſitis terniſque cuneato-obovatis obtuſis lineatis tomentoſis, capitulis ſquarroſis. *Linn.* Camara arboreſcens, ſalviæ folio. *Plum. Gen.* 32. *Ic.* 71, *f.* 2.

1269. {1975. 2078.} —— *ſalvifolia*, foliis oppoſitis ſubſeſſilibus, floribus racemoſis. *L.*

1270. 626. LAPATHUM ægyptiacum annuum, parietariæ folio, capſulâ ſeminis longiùs barbatâ. *H. Piſ.* [Rumex *ægyptiacus.*

1271. 627. —— aquaticum, folio cubitali. *C. B. P.* 116. [Rumex *aquaticus.*

1272. 628. —— hortenſe rotundifolium, ſive montanum. *C. B. P.* 115. [Rumex *alpinus.*

1273. 629. —— rotundifolium maximum, quod rhaponticum. *Offic.* [Rheum *Rhaponticum.*

1274. 630. —— ſativum. *Dod.* Quod patientia. *Offic.* [Rumex *Patientia.*

1275. 878. LAPPA major, ex omni parte minor; capitulis parvis eleganter reticulatis. *Pluk. Alm.* [

1276. 877. —— ſive bardana major, flore albo. *H. Ox.* 3, 147. [Arctium *Lappa.*

1277. 1780. LARIX. *C. B. P.* 493. *Off.* 264. [Pinus *Larix.*

1278. 1823. —— orientalis, fructu rotundiore obtuſo. *T. Inſt.* 586. Cedrus magna ſive Libani, conifera. *J. B.* 1, 277. [Pinus *Cedrus.*

1279. 824. LASERPITIUM anguſtifolium majus, ſegmentis longioribus & indiviſis. *H. Ox.* 3, 321. [Laſerpitium *anguſtifolium.*

1280. 1781. —— foliis amplioribus, ſemine criſpo. *T. Inſt.* 324. [Laſerpitium *latifolium. c.*

1281. 825. — foliis latioribus ; ſemine criſpo & verrucoſo. *H. Ox.* 3, 320. [*(Idem.)*

1282. 826. — humilius, paludapii folio, flore albo. *T. Inſt.* 325. [*(Idem. d.)*

1283. 827. — lobis anguſtioribus & dilutè virentibus, conjugatim poſitis. *H. Ox.* 3, 321. [Laſerpitium *gallicum.*

1284. 828. — lobis anguſtioribus, longioribus & dilutè virentibus, plurifariàm diviſis. *Pluk. Phyt. tab.* 198, *f.* 6. [

1285. 829. — lobis minimis trifidis, ſeminum alis ferè planis. *Rand.* An laſerpitium anguſtiore folio, umbellâ concavâ & contractâ. *Pluk. Phyt. t.* 199 ? [

1286. 2328. LATHYRUS *Aphaca*, pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, ſtipulis ſagittato-cordatis. *L.* Aphaca. *Lob. Ic.* 2, *p.* 70.

1287. 930. — perennis latifolius. *C. B. P.* [Lathyrus *latifolius.*

1288. 932. — ſiculus, flore odorato magno. *Boerh. Ind.* 159. [Lathyrus *odoratus.*

1289. 931. — ſylveſtris Dodonæi. *Park.* [Lathyrus *ſylveſtris.*

1290. 223. — ſylveſtris major, flore minore ; foliis longiùs mucronatis. *Rand.* [

1291. 1628. — tingitanus, ſiliquis orobi, flore

amplo ruberrimo. *Mor. Hiſt.* 2, 55. [Lathyrus *tingitanus.*

1292. 1328. —— tuberoſus arvenſis repens. *C. B. P.* [Lathyrus *tuberoſus.*

1293. 830. LAVANDULA anguſtifolia. *C. B. P.* 216. Lavendula. *Offic.* [Lavandula *Spica. a.*

1294. 1475. —— canarienſis, ſpicâ multiplici cœruleâ. *Pluk. Phyt.* [Lavandula *multifida. c.*

1295. 224. —— folio diſſecto. *C. B. P.* 216. [Lavandula *multifida.*

1296. 831. —— latifolia. *C. B. P.* 216. Spica nardus germanica. *Trag.* [Lavandula *Spica. b.*

1297. 1227. LAVATERA flore albo. *Mill.* [

1298. 1226. —— folio & facie althææ. *Act. Reg. Sc.* [

1299. 2424. LAURUS *nobilis*, foliis lanceolatis venoſis perennantibus, floribus quadrifidis. *Linn.* Laurus vulgaris. *C. B. P.* 460.

1300. 1073. —— alexandrina. *Offic.* [Ruſcus *Hypophyllum.*

1301. 1036. LENTISCUS vulgaris. *C. B. P.* 399. [Piſtacia *Lentiſcus.*

1302. 974. LEONURUS *africanus*, ſideritis folio, floribus phœniceis. *Boerh.* [

1303. 1578. —— canadenſis, origani folio. *T. Inſt.* 187. Origanum fiſtuloſum canadenſe. *Cornut.* [Monarda *fiſtuloſa.*

1304. 2021. — foliis tripartitis multifidis linearibus obtuſiuſculis. *H. Upſ.* 170. Ballote inodora, foliis coronopi. *Amm. Ruth.* 48. [Leonurus *ſibiricus*.

1305. 2373. — *Marrubiaſtrum*, foliis ovatis lanceolatiſque ſerratis, calycibus ſeſſilibus ſpinoſis. *Linn.* Marrubiaſtrum foliis cardiacæ. *Bocc. Muſ.* 2, *p.* 120, *t.* 98.

1306. 832. — minor, Capitis bonæ ſpei vulgò. *Boerh.* 180. [Phlomis *Leonitis*.

1307. 2170. LEPIDIUM *bonarienſe*, floribus diandris tetrapetalis, foliis omnibus pinnato-multifidis. *L.* Thlaſpi bonarienſe multiſciſſum, flore inviſibili. *H. Elth.* 281, *t.* 286, *f.* 370.

1308. 532. — humile incanum arvenſe. *T. Inſt.* 816. Arabis ſive draba & naſturtium babylonicum. *Lob. Ic.* 224. [Cochlearia *Draba*.

1309. 2374. — *Iberis*, floribus diandris tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis ſerratis; ſuperioribus linearibus integerrimis. *Linn.* Iberis latiore folio. *C. B. P.* 97.

1310. 1183. — latifolium. *Offic.* & *C. B. P.* [Lepidium *latifolium*.

1311. 1524. LEUCANTHEMUM alpinum, abſynthii folio. *Boerh. Ind. Alt.* 107. [Chryſanthemum *milleſoliatum*.

1312. 1733. —— tanaceti folio, flore majore. *Boerh.* 107. Matricaria, tanaceti folio, flore majore, ſemine umbilicato. *T. Inſt.* 493. [Chryſanthemum *inodorum.*

1313. 1278. LEUCOIUM heſperidis folio. *T. Inſt.* 221. [Arabis *turrita.*

1314. 1525. —— vernum, perenne, album majus. *T. Inſt.* 221. Heſperis alpina, ſive muralis minor, repens. *J. B.* 2, 880. [Arabis *alpina. b.*

1315. 2475. LIGUSTICUM *Leviſticum*, foliis multiplicibus: foliolis ſupernè inciſis. *Linn.* Liguſticum vulgare. *C. B. P.* 157.

1316. 2022. —— pyrenaicum, fœniculi folio lucidum. *T. Inſt.* 324. [

1317. 1923. —— quod ſeſeli officinarum. *C. B. P.* 162. Siler montanum majus. *Mor. Umb.* 7, 8. [Laſerpitium *Siler.*

1318. 2425. —— *ſcoticum*, foliis biternatis. *Linn.* Liguſticum humilius ſcoticum. *Pluk. Alm.* 217, *t.* 96, *f.* 2.

1319. 879. LILAC liguſtri folio. *T. Inſt.* 602. [Syringa *perſica.*

1320. 1329. LILIUM CONVALLIUM, flore pleno variegato, Didac. *T. Inſt.* 77. [Convallaria *majalis.*

1321. 1476. LIMONIUM ægyptiacum lignoſum, halimi folio. *Juſſ.* [

1322. 976. —— lignoſum bellidis folio. *C. B. P.* [

1323. 533. —— lignoſum, gallis viduum. *Bocc. Rar.* 35. [Statice *monopetala.*

1324. 975. —— maritimum majus. *C. B. P.* [Statice *Limonium.*

1325. 833. —— minimum, flagellis tortuoſis, noſtras. *Rand.* [

1326. 1680. —— peregrinum, foliis aſplenii. *C. B. P.* 192. [Statice *ſinuata.*

1327. 834. LINARIA annua, anguſtifolia; floſculis albis, longiùs caudatis. *Triumf.* [Antirrhinum *chalepenſe.*

1328. 279. —— cœrulea, foliis brevioribus & anguſtioribus. *Raii Syn. Ed.* 3, 282. [

1329. 278. —— capillaceo folio. *C. B. P.* 213. [Antirrhinum *monſpeſſulanum.*

1330. 727. —— hederaceo folio, glabro; ſeu cymbalaria vulgaris. *T. Inſt.* 169. [Antirrhinum *Cymbalaria.*

1331. 333. —— hiſpanica procumbens; foliis uncialibus glaucis, flore flaveſcente, pulchrè ſtriato, labiis nigro-purpureis. *Rand.* [Antirrhinum *triſte?*

1332. 1074. —— latifolia dalmatica, magno flore. *C. B. P.* [Antirrhinum *dalmaticum.*

1333. 332. —— lutea elatior & ramoſior; flore minori. *Rand.* [

1334. 334. —— multicaulis, erecta, annua, anguſto molluginis folio; floribus luteis rarè diſpoſitis. *Rand.* [

1335. 1375. —— pumila, foliis carnoſis, floſculis minimis flavis. *C. B. P.* 213. [Antirrhinum *arvenſe. b.*

1336. 1477. —— purpurea major odorata. *C. B. P.* 213. [Antirrhinum *purpureum.*

1337. 1330. —— triphylla minor lutea; floris vexillo & calcari purpureo. *Boerh.* [Antirrhinum *triphyllum.*

1338. 331. —— vulgaris lutea; flore majore. *C. B. P.* 212. [Antirrhinum *Linaria.*

1339. 729. LINGUA CERVINA maxima, undulato folio, auriculato per baſim. *H. R. P.* [

1340. 728. —— minima; folio obtuſo undulato & ſerrato. *Rand.* An lingua cervina anguſtifolia, lucida, folio ſerrato. *H. R. P.?* [

1341. 730. —— minor criſpa uno pediculo trifolia. *H. R. P. Pluk. Phyt.* 248, *f.* 2. [

1342. 1037. —— multifida. *C. B. P.* 354. [Aſplenium *Scolopendrium. c.*

1343. 731. —— officinarum. *C. B. P.* 353. [Aſplenium *Scolopendrium.*

1344. 2023. LINNIA caule erecto hirſuto, foliis ovato-lanceolatis ſeſſilibus, floribus terminalibus. *Wilm.* [

1345. {1782. / 1976.} LINUM calycibus capſuliſque obtuſis: *Sibirian flax. Mill. Ic.* Linum

perenne majus cœruleum, capitulo majore. *Hiſt. Ox.* 2, 573. [Linum *perenne*.

1346. 1783. LIRIODENDRUM *Tulipifera*. *Linn.* Tulipifera arbor virginiana. *H. L. B.* 612.

1347. 1977. LOBELIA *Erinoides*, caulibus proſtratis filiformibus, foliis petiolatis oblongis dentatis. *Linn.*

1348. 2273. —— *Erinus*, caule patulo, foliis lanceolatis ſubdentatis, pedunculis longiſſimis. *Linn.* Campanula minor africana erini facie, flore violaceo, caulibus erectis. *Herm. L. B.* 110, *t.* 111.

1349. 2375. —— *inflata*, caule erecto, foliis ovatis ſubſerratis pedunculo longioribus, capſulis inflatis. *Linn.*

1350. 2519. —— *triquetra*, caule erecto, foliis lanceolatis dentatis, racemo terminali aphyllo. *Linn.*

1351. 2274. LŒFLINGIA *hiſpanica*. *Linn.*

1352. 2236. LOLIUM *perenne*, ſpicâ muticâ, ſpiculis compreſſis multifloris. *L.* Gramen loliaceum anguſtiore folio & ſpicâ. *C. B. P.* 9. *Theatr.* 121.

1353. 2235. —— *temulentum*, ſpicâ ariſtatâ, ſpiculis compreſſis multifloris. *L.* Gramen loliaceum, ſpicâ longiore. *C. B. P.* 9. *Theatr.* 121.

1354. 1228. LOTUS anguſtifolia, flore luteo pur-

pureo, ex insulâ Sancti Jacobi. *Hort. Amst.* [Lotus *jacobæus.*

1355. 1629. — *conjugatus*, leguminibus conjugatis membranaceo-quadrangulis, bracteis oblongo-ovatis. *Linn.* Lotus luteus siliquâ angulosâ. *Boerh. Ind. Alt.* 2, *p.* 27.

1356. 2171. — *edulis*, leguminibus subsolitariis gibbis incurvis. *Linn.* Lotus pentaphyllos siliquâ cornutâ. *C. B. P.* 332. Lotus edulis cretica. *Raii Hist.* 967.

1357. 566. — hæmorrhoidalis, humilior & candidior. *T. Inst.* 403. [

1358. 1038. — hæmorrhoidalis, major. *Park.* [Lotus *hirsutus?*

1359. 2172. — *hirsutus*, capitulis subrotundis, caule erecto hirto, leguminibus ovatis. *Linn.* Lotus pentaphyllos siliquosus villosus. *C. B. P.* 372.

1360. 534. — lybica. *Dalech. Lugdun.* 509. [Lotus *rectus.*

1361. 1824. — maritima lutea siliquosa, folio pingui glabro. *Bot. Monsp.* [Lotus *maritimus.*

1362. 535. — minor glabra, foliis longioribus & angustioribus. *Hort. Edin.* [Lotus *corniculatus. c. tenuifolius.*

1363. {1130. 2376.} — *Ornithopodioides*, leguminibus subternatis arcuatis compressis, caulibus diffusis. *Linn.* Lotus

siliquis ornithopodii. *C. B. P.* 332. *J. B.*

1364. 27. — pentaphyllos minor hirsutus, siliquâ angustissimâ. *C. B. P.* 332. [Lotus *angustissimus.*

1365. 536. — pratensis major glabra. *D. Vaill. Bot. Par.* [

1366. 1184. — rubra, siliquâ anguloſâ. *C. B. P.* [Lotus *tetragonolobus.*

1367. 1876. LUNARIA major, siliquâ rotundiore. *J. B.* 2, 881. [Lunaria *annua.*

1368. 28. — vasculo sublongo intorto. *Raii Syn.* 164. [Draba *muralis.*

1369. 977. LUPINASTER, floribus purpureis, siliquis minoribus. *Amm. p.* 147. [Trifolium *Lupinaster.*

1370. {1075. 2520.} LUPINUS *angustifolius*, calycibus alternis appendiculatis : labio superiore bipartito : inferiore integro. *Linn.* Lupinus angustifolius sylvestris cœruleus elatior. *H. Eyst.* Lupinus angustifolius cœruleus elatior. *Raii Hist.* 908.

1371. 1681. — floribus cœruleis inodoris, in spicas longas digestis, radice reptatrice. *Gron. Fl. Virg.* [Lupinus *perennis.*

1372. {1040. 2521.} — *luteus*, calycibus verticillatis appendiculatis : labio superiore bipartito : inferiore tridentato. *Linn.* Lupinus sylvestris flore luteo. *C. B. P.* 348.

1373. 1041. — peregrinus major, vel villosus

cœruleus major. *C. B. P.* [Lupinus *hirſutus.*

1374. 1039. — ſativus, flore albo. *C. B. P.* [Lupinus *albus.*

1375. 567. LYCHNIDEA caroliniana, floribus quaſi umbellatim diſpoſitis; foliis lucidis craſſis acutis. *Martyn. Hiſt. p.* 10. [Phlox *carolina.*

1376. 1428. — mariana elatior, alſines aquaticæ foliis, floribus in longam ſpicam densè ſtipatis. *Pluk.* [

1377. 175. — virginiana, holoſtei ampliore folio, floribus umbellatis purpureis. *Rand.* [

1378. 1978. LYCHNIS caule erecto, calycibus ſtriatis acutis, petalis diſſectis. *Mill. Ic.* [

1379. 1042. — chalcedonica, flore miniato. *Park.* [Lychnis *chalcedonica.*

1380. 1076. — coronaria vulgaris. *J. B.* [Agroſtemma *coronaria.*

1381. 1276. — cretica, parvo flore, calyce ſtriato purpuraſcente. *T. Cor.* 24. [Silene *Behen.*

1382. 231. — fruteſcens, myrtifolia; Been albo ſimilis. *C. B. P.* 205.

1383. 1131. — hirſuta, flore eleganter variegato. *Raii Hiſt.* [Silene *quinquevulnera.*

1384. 378. — hiſpanica, folio kali multiflora. *T. Inſt.* 338. [Gypſophila *Struthium.*

1385.

1385. 225. — hiſpanica major latifolia, flore albo. *Rand.* [

1386. 29. — linifolia, toroſis & laxioribus capitulis. *Barr. Obſ.* 64. [

1387. 227. — maritima anglica, amplioribus foliis. *Rand.* [

1388. 226. — maritima repens. *C. B. P.* 205. [Silene *amœna.*

1389. 933. — multiplex, flore purpureo. *C. B. P.* [

1390. 1429. — orientalis annua ſupina, antirrhini folio, flore minore purpureo. *T. Cor.* 25. [Saponaria *orientalis.*

1391. 228. — orientalis, buplevri folio. *T. Cor.* 24. [Silene *Buplevroides.*

1392. 229. — orientalis, calyce pyramidato, ſtriato longiſſimo. *T. Cor.* 24. [

1393. 230. — orientalis, foliis carnoſis, caule ramoſiſſimo floſculis minutis onuſto. Lychnis orientalis, ſaponariæ folio & facie, flore parvo & multiplici. *Rand.* [

1394. 76. — orientalis, longifolia nervoſa, flore purpuraſcente. *T. Cor.* 24. [

1395. 1825. — ſaponaria dicta, folio convoluto, gentiana concava. *Ger.* 253. [Saponaria *officinalis. b. hybrida.*

1396. { 232. / 1526. } — ſegetum meridionalium, annua hirſuta, floribus rubris uno verſu

disposítis. *Boerh. Ind. Alt.* 214. sylvestris alba, spicâ reflexâ. *Bot. Monsp.* 171. *Ic.* [Cucubalus *reflexus.*

1397. 1630. — segetum rubra, foliis perfoliatæ. *C. B. P.* 204. Vaccaria. *Dod. p.* 104. [Saponaria *Vaccaria.*

1398. 1277. — supina sicula, calyce amplissimo striato. *T. Inst.* 337. [Silene *pendula. b ?*

1399. 1229. — sylvestris, flore albo minimo. *Raii Hist.* [

1400. 1230. — sylvestris, quæ saponaria. *T. Inst.* [Saponaria *officinalis.*

1401. 234. — sylvestris viscosa rubra altera. *C. B. P.* 205. [Silene *Muscipula.*

1402. 233. — sylvestris viscosa rubra angustifolia. *C. B. P.* 205. [Lychnis *Viscaria.*

1403. 1430. — viscosa, flore muscoso, ocimastri facie. *C. B. P.* [

1404. 1527. — viscosa, foliis inferioribus bellidi minori similibus, flore minimo carneo aut rubro. *Hort. R. Monsp.* [Silene *cretica.*

1405. 1077. — viscosa rubra angustifolia. *C. B. P.* [

1406. 235. — umbellifera montana helvetica. *Zanon.* 128. [Agrostemma *Flos Jovis.*

1407. 1921. LYCIUM foliis cordato-ovatis, sessilibus oppositis perennantibus,

ſpinis craſſis bigeminis, floribus confertis. *Dict. Hort.* [Arduina *biſpinoſa.*

1408. 785. LYCOPERSICON galeni. *Ang.* [Solanum *Lycoperſicum.*

1409. 1922. LYCOPODIUM ſabinæ facie. *Fl. Jen.* 328. Muſcus clavatus, foliis cupreſſi. *C. B. P.* 360. [Lycopodium *alpinum.*

1410. 1877. LYCOPUS *virginicus*, foliis æqualiter ſerratis. *Linn.* Lycopus foliis lanceolatis tenuiſſimè ſerratis. *Fl. Virgin.* 8.

1411. 880. LYSIMACHIA annua, minima; polygoni folio. *T. Inſt.* 142. [

1412. 236. —— bifolia, flore globoſo. *C. B. P.* 245. [Lyſimachia *thyrſiflora.*

1413. 537. —— canadenſis lutea, folio jalappæ. *D. Sarr.* [Lyſimachia *quadrifolia. b. ciliata.*

1414. 1185. —— lutea major, quæ Dioſcoridis. *Off. & C. B. P.* [Lyſimachia *vulgaris.*

1415. 1924. —— ſpecioſa, quibuſdam onagra dicta ſiliquoſa. *J. B.* 2, 906. Chamænerion flore delphinii. *Park. Par.* 270. [Epilobium *anguſtifolium.*

1416. 430. —— ſpicata, flore albo; ſalicis folio. *T. Inſt.* 141. [Lyſimachia *Ephemerum.*

1417. 2329. LYTHRUM *Hyſſopifolia*, foliis alternis linearibus, floribus hexandris. *Linn.* Hyſſopifolia. *C. B. P.* 218.

M

1418. 1926. MAGNOLIA foliis ovato-lanceolatis, ſubtùs glaucis annuis. *Dict. Hort.* [Magnolia *glauca.*

1419. 30. MAJORANA cretica, origani foliis, villoſa, ſatureiæ odore, corymbis majoribus albis. *T. Cor.* 13. Origanum ſmyrnæum. *Wheel.* [Origanum *ſmyrnæum.*

1420. 1878. — rotundifolia ſcutellata exotica. *H. R. P.* [Origanum *ægyptiacum.*

1421. 1379. MALOPE *Malacoides*, foliis ovatis crenatis ſuprà glabris. *Linn.* Malacoides betonicæ folio. *T. Inſt.* 98.

1422. 2131. MALPIGHIA *glabra*, foliis ovatis integerrimis glabris, pedunculis umbellatis. *Linn.*

1423. 1478. — latiore folio ſubrotundo, fructu majore. *Plum.* [

1424. 1331. MALVA alexandrina, alchimillæ folio. *Sher.* [

1425. 81. — erectior, flore magno ſuavè rubente. *T. Cor.* 2. [

1426. {1925. 2276.} — *limenſis*, caule erecto herbaceo, foliis lobatis, ſpicis ſecundis axillaribus, ſeminibus lævibus. *Linn.*

1427. 78. — luſitanica, annua, flore parvo ſtriato. *Rand.* [

1428. 80. — orientalis erecta major, flore vix conſpicuo. *D. Sher.* [

1429. 2275. — *ſcabroſa*, caule fruticoſo, pilis ſimplicibus, foliis lobatis, floribus erectiuſculis, petalis incumbentibus. *Linn. Am. Acad.* Malva africana fruteſcens, flore rubro. *Comm. Hort.* 2, *p.* 171, *t.* 86. [Malva *capenſis. c.*

1430. 77. — ſinenſis annua erecta, flore minimo; ki-tſaitſe dicta. *Rand.* [Malva *verticillata?*

1431. 79. — ſylveſtris, foliis ſinuatis minoribus, floſculis minimis, anglica. *Boerh. Ind.* 2, 268. [

1432. 1132. — ſylveſtris minor, folio rotundo, *C. B. P.* [Malva *rotundifolia.*

1433. 82. — ſyriaca, ela haur taunal dicta. *Rand.* Malva cretica, annua, altiſſima, flore parvo, ad alas umbellato. *T. Cor.* 2. [Lavatera *cretica.*

1434. 1332. MALVAVISCUS arboreſcens, floro miniato clauſo. *H. Elth.* [Hibiſcus *Malvaviſcus.*

1435. 242. MALVINDA abutili folio, flore luteo ſpicato. *Rand.* Althæa indica, abutili ſubrotundo folio, flore luteo ſpicato. *Pluk. Phyt. t.* 74, *f.* 6. [Malva *gangetica.*

1436. 243. —— abutili folio, flore luteo ſpicato, minor. *Rand.* [

1437. 475. —— ficûs folio, floribus luteis in umbellâ follaceâ naſcentibus. *Rand.* [

1438. 240. —— pimpinellæ majoris folio anguſtiori, ſemine bidente. *Rand.* [

1439. 239. —— pimpinellæ majoris folio, ſemine bidente. *Rand.* [

1440. 241. —— profundiùs ſerrato folio, ſemine tridente. *Rand.* [

1441. 238. —— ulmifolia, ſemine bidente. *R.* Malva ulmifolia, ſemine cum gemino roſtro. *T. Inſt.* 96. [Sida *ſpinoſa.*

1442. 237. —— ulmifolia, ſemine roſtrato. *R.* Malva annua fruticoſa fernambucana, flore luteo. *Zan.* 132. [Sida *rhombifolia. a.*

1443. 474. —— xanthii ferè folio, fructu lappaceo, pentacocco. *Rand.* Trifolio affinis, Indiæ orientalis, xanthii facie. *Breyn. Cent. t.* 135. [Urena *lobata.*

1444. 1826. MANDRAGORA fructu rotundo. *C. B. P.* 169. *Off.* 300. [Atropa *Mandragora.*

1445. 1333. MARRUBIASTRUM ſidcritidis folio,

calyculis aculeatis, flore flavo cum limbo atropurpureo, comâ flaveſcente. *T. Cor.* 12. [Sideritis *montana.*

1446. 1580. —— vulgare. *T. Inſt.* Sideritis, alſines triſſaginis folio. *C. B. P.* 233. [Stachys *arvenſis.*

1447. 569. MARRUBIUM album, anguſtifolium peregrinum. *C. B. P.* 230. [Marrubium *peregrinum. b.*

1448. 1431. —— album, candidiſſimum & villoſum. *T. Cor.* [Marrubium *candidiſſimum.*

1449. 176. —— album, foliis amplis ferè circinatis. *Rand.* [

1450. { 31. / 570. } —— album latifolium peregrinum. *C. B. P.* 230. Marrubium hiſpanicum ſupinum, foliis fericeis argenteis. *T. Inſt.* 192. [Marrubium *peregrinum.*

1451. 568. —— album vulgare. *C. B. P.* 230. [Marrubium *vulgare.*

1452. 2132. —— calycum limbis tubo longioribus membranaceis, angulis majoribus & rotundatis. *L.* [Marrubium *acetabuloſum.*

1453. 1631. —— hiſpanicum, calyce ſtellato & aculeato. *T. Inſt.* 182. Alyſſon Galeni. *Cluſ. Hiſt.* 35. [Marrubium *Alyſſum.*

1454. { 476. / 2024. } MARTYNIA annua villoſa & viſcoſa, folio ſubrotundo, flore magno rubro. *D. Houſt.* Martynia caule

ramoſo, foliis cordato-ovatis piloſis. *Mill, Ic.* 286. [Martynia *annua.*

1455. 1432. — *perennis*, caule ſimplici, foliis ſerratis. *Linn.*

1456. 978. MARUM vulgare. *Park.* Vulgò maſtichen redolens. *C. B. P.* [Teucrium *Marum.*

1457. 1078. MATRICARIA foliis florum fiſtuloſis. *H. R. P.* [

1458. 2133. — foliis ſimplicibus lineari-lanceolatis, ſeſſilibus, pedunculis uniformibus. *Wilm.* [Matricaria *Aſteroides.*

1459. 835. — vulgaris, ſeu ſativa, caulibus rubentibus. *H.L.B.* [Matricaria *Parthenium.*

1460. 1734. MEADIA. *Catesb. H. Car.* 3, *p.* 1. [Dodecatheon *Meadia.*

1461. 439. MEDICA echinata minima. *J. B.* 2, 386. [Medicago *polymorpha. l. minima.*

1462. 436. — fructu ovali ſpinoſo. *Rand.* Medica dicarpos, fructu ovali; ſpinulis brevioribus & rigidioribus. *Raii Hiſt.* 963. [Medicago *muricata.*

1463. 432. — hirſuta, echinis rigidioribus. *J. B.* 2, 385. [Medicago *polymorpha. k. rigidula.*

1464. 438. — hiſpanica; fructu echinato, ſubhirſuto, ſphæroide. *Rand.* [

1465. 433. —— magna, turbinata. *J. B.* 2, 385. [Medicago *polymorpha. d. turbinata.*

1466. 1735. —— magno fructu, aculeis ſurſùm & deorsùm tendentibus. *T. Inſt.* 411. [Medicago *polymorpha. e. intertexta?*

1467. 1632. —— major erectior, floribus purpuraſcentibus. *T. Inſt.* 410. [Medicago *ſativa.*

1468. 440. —— marina. *Lob. Ic.* 38. Trifolium cochleatum, maritimum tomentoſum. *C. B. P.* 329. [Medicago *marina.*

1469. 1433. —— marina major ſpinoſa. *Park. Theatr.* [

1470. 435. —— maritima noſtras; modiolis ſpinoſis. *Rand.* Trifolium cochleatum, modiolis ſpinoſis. *Raii Syn. Ed.* 2, 197. [

1471. 1186. —— orbiculata. *J. B.* [Medicago *polymorpha. a. orbicularis.*

1472. 437. —— orientalis; fructu rotundiore ſubhirſuto, tuberculis raris obſito. *Rand.* [

1473. 431. —— ſcutellata. *J. B.* 2, 384. [Medicago *polymorpha, b, ſcutellata.*

1474. 434. —— tornata, minor, lenis. *Park. Theatr.* 1116. [Medicago *polymorpha. c. tornata.*

1475. 631. MEDICAGO annua, trifolii facie. *T. Inſt.* 412. [Medicago *radiata,*

1476. 2476. —— *lupulina*, ſpicis ovalibus, leguminibus reniformibus monoſpermis, caulibus procumbentibus. *Linn.* Trifolium pratenſe luteum, capitulo breviore. *C. B. P.* 228.

1477. 632. —— maritima trifolia, annua, polycarpus, fructu toroſo non ſpinoſo. *D. Mich. H. Piſ.* 110. [

1478. 1434. —— vulnerariæ facie hiſpanica. *T. Inſt.* 412. [Medicago *circinnata.*

1479. 2377. MELIA *Azedarach*, foliis bipinnatis. *Linn.* Arbor fraxini folio, flore cœruleo. *C. B. P.* 415.

1480. 2237. MELICA *ciliata*, floſculi inferioris petalo exteriore ciliato. *Linn.* Gramen avenaceum montanum lanuginoſum. *C. B. P.* 10. *Pr.* 20.

1481. 2238. —— *nutans*, petalis imberbibus, paniculâ nutante ſimplici. *Linn.* Gramen avenaceum, locuſtis rarioribus. *C. B. P.* 10.

1482. 1376. MELILOTUS italica, folliculis rotundis. *C. B. P.* 331. [Trifolium *Melilotus italica.*

1483. 1043. —— major candida. *Trag.* [Trifolium *Melilotus officinalis. b.*

1484. 441. —— meſſanenſis procumbens; folliculis rugoſis ſublongis; ſpicis florum brevioribus. *Raii Hiſt.* 952. [Trifolium *Melilotus meſſanenſis.*

1485. 1044. —— odorata violacea. *Hiſt. Ox.* Lotus urbana. *Off.* [Trifolium *Melilotus cœrulea.*

1486. 1187. —— *Offic.* & *C. B. P.* [Trifolium *Melilotus officinalis.*

1487. 538. MELISSA americana graveolens, à D. Houſton. *Rand.* [Dracocephalum *canarienſe ?*

1488. 1079. —— moldavia, flore albo. *Park.* [Dracocephalum *Moldavica ?*

1489. 1377. —— romana, molliter hirſuta & graveolens. *H. R. P.* [Meliſſa *officinalis. a ?*

1490. 1479. MENIANTHES paluſtre & triphyllum. *T. Inſt.* 117. *Off.* 493. [Menyanthes *trifoliata.*

1491. 836. MENISPERMUM canadenſe, ſcandens, umbilicato folio. *Ac. R. Sc.* 1705. [Meniſpermum *canadenſe.*

1492. 837. —— umbilicato folio mucronato, ad baſin non ſinuato. *Rand.* [

1493. 838. —— hederaceo folio. *Rand.* [Meniſpermum *virginicum.*

1494. 882. MENTHA anguſtifolia, altera, rugoſior, ſpica hirſuta. *Rand.* [

1495. 881. —— anguſtifolia ſpicata. *C. B. P.* 227. [Mentha *viridis.*

1496. 571. —— hortenſis prior. *Fuchſ. Hiſt.* 288. [

1497. 573. —— hortenſis verticillata, ocimi odore. *C. B. P.* 227. Mentha

quarta. *Dod. p.* 95. [Mentha *gentilis.*

1498. 577. —— piperitis. *Off. Lond.* Mentha ſpicis brevioribus & habitioribus, foliis menthæ fuſcæ, ſapore fervido piperis. *Raii Syn. Ed.* 3, *p.* 234. [Mentha *piperita.*

1499. 572. —— prima. *Dod. Pempt.* 95. [Mentha *ſativa.*

1500. 934. —— rotundifolia, odore menthæ romanæ, verticillis minimis. *Rand.* [

1501. 386. —— ſiſymbrium dicta, hirſuta rotundifolia, odore aurantii. *D. Manningham.* Mentha ſiſymbrium dicta hirſuta; glomerulis & foliis minoribus ac rotundioribus. *Raii Syn. Ed.* 3, 233. [Mentha *hirſuta. b.*

1502. 574. 575. —— ſylveſtris, rotundiore folio. *C. B. P.* 227. Mentha ſylveſtris, rotundiore folio, purpureo flore. *Bot. Monſp.* [Mentha *rotundifolia.*

1503. 576. —— ſylveſtris ſpicata, latifolia, hirſuta. *Rand.* [

1504. 883. —— verticillata, longiori acuminato folio, odore aromatico. *Rand.* [

1505. 979. —— verticillata, ocimi odore, venis luteis. *Ind. Hort. Chelſ.* [

1506. 935. MENTHASTRUM. *Off.* Menthaſtrum

ſpicatum, folio longiore candicante. *J. B.* [Mentha *ſylveſtris*.

1507. 2477. MERCURIALIS *annua*, caule brachiato, foliis glabris, floribus ſpicatis. *Linn.* Mercurialis teſticulata ſive mas, & mercurialis ſpicata ſive fœmina. *C. B. P.* 121.

1508. 2478. — *perennis*, caule ſimpliciſſimo, foliis ſcabris. *Linn.* Mercurialis montana teſticulata & ſpicata. *C. B. P.* 122.

1509. 1581. — *tomentoſa*, caule ſuffruticoſo, foliis tomentoſis. *Linn.*

1510. 2079. MESEMBRYANTHEMUM *glaucum*, foliis triquetris acutis punctatis diſtinctis, calycinis foliolis ovato-cordatis. *Linn.*

1511. 1231. MESPILUS aculeata, pyri denticulato folio, ſplendens, virginiana. *Pluk.* [

1512. 1279. — canadenſis, ſorbi torminalis facie. *T. Inſt.* 642. [

1513. 1927. — cretica, folio circinato & quaſi cordiformi. *T. Cor.* 43. Chamæceraſus idæa. *Alp. Ex.* 5. [

1514. 1829. — foliis cordato-ovatis acuminatis, marginibus acutè ſerratis, ramis ſpinoſis. *Mill. Ic.* [Cratægus *coccinea*.

1515. 1828. — foliis lanceolatis ſerratis, ſpinis

robuſtioribus, floribus corymboſis. *Mill. Ic.* [Cratægus *Crus galli.*

1516. 1634. — foliis ovatis obtuſis crenatis, ſpinis longis tenuibus, fructu ſingulari, rotundo, umbilico foliaceo. *Wilm.* An meſpilus virginiana, uvæ criſpæ foliis. *Pluk. Mant?* [

1517. 1633. — foliis ovatis ſerratis, pomis ovatis ex luteo virentibus, nobis. *Wilm.* [

1518. 1928. — folio ſubrotundo, fructu rubro. *T. Inſt.* 642. [Meſpilus *Cotoneaſter.*

1519. 2025. — inermis, foliis ovato-oblongis glabris ſerratis, caule inermi. *Linn.* [Meſpilus *canadenſis.*

1520. 1828. — ſpinoſa, pyri folio. *H. Leyd.* Pyracantha quibuſdam. *J. B.* 151. [Meſpilus *Pyracantha.*

1521. 1334. — virginiana, apii folio vulgari ſimilis, major. *Wilm.* [

1522. 980. MEUM foliis anethi. *C. B. P.* Meum vulgatius. *Park.* [Æthuſa *Meum.*

1523. 1682. MILIUM arundinaceum, ſubrotundo ſemine, ſorgo nominatum. *C. B. P.* 26. Melica ſive ſorghum. *Dod. p.* 508. [Holcus *bicolor.*

1524. 2330. — *paradoxum*, floribus paniculatis ariſtatis. *Linn.* Gramen avenaceum, paniculatum, Gallo-pro-

vinciale, aquilegiæ ſemine. *H. Ox.* 3, 214. *Pluk. Phyt. t.* 32, *f.* 2.

1525. 1929. —— ſemine luteo vel albo. *C. B. P.* 26. *Off.* 317. [Panicum *miliaceum.*

1526. 380. MILLEFOLIUM album, incanum; ſegmentis foliorum latioribus. *Rand.* [

1527. 385. —— foliis ſophiæ ferè diviſurâ; floribus parvis ex albo flaveſcentibus. *Rand.* [

1528. 383. —— minus tenuifolium; tanaceti odore. *Barr. Obſ. N°.* 1117. [

1529. 381. —— nobile. *Trag.* 476. [Achillea *nobilis.*

1530. 382. —— odoratum monſpelienſe. *Pillet.* 271. [Achillea *odorata.*

1531. 1528. —— orientale, foliis tanaceti incanis, radiis pallidè luteis. *Boerh. Ind. Alt.* 112. Achillea foliis pinnatis, foliolis lanceolatis inciſis ſerratis ſubtùs, lanigeris. *Linn.* [Achillea *pubeſcens.*

1532. 936. —— purpureum vulgare. *Raii Syn.* [Achillea *Millefolium. b.*

1533. 384. —— tomentoſum, luteum. *C. B. P.* 140. [Achillea *tomentoſa.*

1534. 379. —— vulgare album. *C. B. P.* 140. [Achillea *Millefolium.*

1535. 669. MILLERIA amplis ſcrophulariæ foliis,

maculatis. *Rand.* [Milleria *quinqueflora. b.*

1536. 1378. — annua erecta ; foliis conjugatis, floribus luteis ſpicatis. *Houſt.* [Milleria *quinqueflora.*

1537. 539. — parietariæ folio, capitulis congeſtis planis. *D. Houſt.* [Milleria *biflora.*

1538. 540. — ſcrophulariæ amplo folio, floribus laxè ſpicatis. *D. Houſt.* [

1539. 921. MIMOSA folio lato ſennæ, ſpinoſa. *Boerh.* [Mimoſa *caſta.*

1540. 1435. — humilis fruteſcens & ſpinoſa, ſiliquis conglobatis. *Plum.* [Mimoſa *pudica.*

1541. 83. — jamaicenſis. *Zan. Hiſt.* 149. [

1542. 2277. MIMULUS *ringens*, erectus, foliis oblongis linearibus ſeſſilibus. *Linn.* Digitalis perfoliata glabra, flore violaceo minore. *Hiſt. Ox.* 2, *p.* 475, *ſ.* 5, *t.* 8, *f.* 6.

1543. 2523. MIRABILIS *longiflora*, floribus congeſtis longiſſimis ſubnutantibus terminalibus, foliis ſubvilloſis. *Linn.* Mirabilis mexicana. *Hern. Mex.* 170, *f.* 2.

1544. 1188. — peruana, flore variegato. *Park. Par.* [Mirabilis *Jalapa.*

1545. 1830. MITELLA *nuda*, ſcapo nudo. *Linn.*

1546.

1546. 1045. MOLDAVICA americana trifolia, odore gravi. *T. Inſt.* [Dracocephalum *canarienſe.*

1547. { 244. / 1436. } — betonicæ folio, flore cœruleo. *T. Inſt.* 184. Moldavica betonicæ folio, floribus majoribus cœruleis pendulis. *Amm.* [Dracocephalum *nutans.*

1548. 1529. — betonicæ folio, floribus minimis pallidè cœruleis. *Amm. Ruth.* 46. Dracocephalum floribus verticillatis, bracteis oblongis integerrimis, corollis vix calyce majoribus. *Linn.* [Dracocephalum *thymiflorum.*

1549. 245. — orientalis, betonicæ folio, flore magno violaceo. *T. Cor.* 11. [Dracocephalum *caneſcens.*

1550. 1133. — orientalis, ſalicis folio, flore parvo cœruleo. *T. Cor.* [Dracocephalum *peltatum.*

1551. 578. MOLUCCA lævis. *Dod. Pempt.* 92. [Moluccella *lævis.*

1552. 1335. MOLLUGO *verticillata*, foliis verticillatis cuneiformibus acutis, caule ſubdiviſo decumbente, pedunculis unifloris. *Linn.*

1553. 579. MOMORDICA vulgaris. *T. Inſt. p.* 103. [Momordica *Balſamina.*

1554. 580. — zeylanica, pampineâ fronde, fructu longiori. *T. Inſt. p.* 103. [

1555. 1379. MONARDA *fistulosa*, capitulis terminalibus, caule obtusangulo. *Linn.*

1556. 2524. — *punctata*, floribus verticillatis; corollis punctatis, bracteis coloratis. *Linn.* Clinopodium virginianum angustifolium, quovis verticillo 12 foliolis rubentibus cincto. *Pluk. Alm.* 3, *t.* 24, *f.* 1.

1557. {1930.} {2278.} MORUS *papyrifera*, foliis palmatis, fructibus hispidis. *Linn.* Morus sativa, foliis urticæ mortuæ, cortice papyrifera. *Kæmpf. Amœn.* 471. Morus papyrifera sativa japonica. *Seb. Th.* 1, *p.* 44, *t.* 28, *f.* 3.

1558. 1736. MOSCHATELLINA foliis fumariæ bulbosæ, de quâ Cordus. *J. B.* 2, 206. Radix cava minima, viridi flore. *Ger.* 933. [Adoxa *Moschatellina.*

1559. 1232. MYAGRUM siliculâ longâ. *C. B. P.* [Eryssimum *cheiranthoides.*

1560. 1336. — siliculis obversè ovatis, lateribus depressis. *Fl. Lugd.* [Myagrum *sativum?*

1561. 1380. — siliculis sulcatis pilosis rugosis, foliis oblongis obtusis dentatis. *Linn.* [Myagrum *rugosum.*

1562. 670. MYOSOTIS hirsuta minor. *T. Inst.* 245. [Cerastium *semidecandrum.*

1563. 177. — hiſpanica ſegetum. *T. Inſt.* 245. [Ceraſtium *dichotomum.*

1564. 1530. — incana repens anguſtifolia. *N. D.* [Ceraſtium *repens.*

1565. 178. — orientalis perfoliata, lychnidis folio. *T. Cor.* 18. [Ceraſtium *perfoliatum.*

1566. 247. MYRRHIS folio podagrariæ. *Rivin.* [Chærophyllum *aromaticum.*

1567. 1337. — lutea daucoides. *Mor. H. R. Bl.* [Chærophyllum *coloratum.*

1568. 1280. — major, vel cicutaria odorata. *C. B. P.* 160. *Off.* 321. [Scandix *odorata.*

1569. 387. — trifolia canadenſis, angelicæ facie. *T. Inſt.* 315. [Siſon *canadenſe.*

1570. 246. — tuberoſa, nodoſa, coniophyllum. *Mor. Umb.* 67. [Chærophyllum *bulboſum.*

1571. 2426. MYRSINE africana. *Linn.* Buxus africana rotundifolia ſerrata. *Pluk. Alm.* 74, *t.* 80, *f.* 5.

1572. 1080. MYRTO-CISTUS Pennei. *Cluſ.* [Hypericum *balearicum. Linn.*

1573. 1234. MYRTUS buxi folio. *Schyl. Hort.* [Myrtus *communis.*

1574. 984. — flore pleno. *Cornut.* [

1575. 982. — foliis odore nucis moſchatæ. *Schyl. Cat.* [Myrtus *Pimenta?*

1576. 983. — latifolia bœtica, foliis conſertim naſcentibus. *C. B. P.* [Myrtus *communis. b. bœtica.*

1577. 1233. —— latifolia romana. *C. B. P.* [Myrtus *communis. a. romana.*

N

1578. 1480. NAPÆA *lævis*, pedunculis nudis lævibus, foliis lobatis glabris. *Linn.*

1579. 1081. NAPUS dulcis sativus. *Off.* [Brassica *Napus. b.*

1580. 1737. NARCISSUS illyricus liliaceus. *C. B. P.* 55. Pancratii monspeliaci hemerocallidis valentinæ facie. Lilionarcissus vel narcissus tertius Matthioli. *J. B.* 2, 613. [Pancratium *illyricum.*

1581. 2427. —— *minor*, spathâ uniflorâ, nectario obconico erecto crispo sexfido, æquante petala lanceolata. *L.* Narcissus parvus totus luteus. *C. B. P.* 53.

1582. 2428. —— *Pseudonarcissus*, spathâ uniflorâ, nectario campanulato erecto crispo, æquante petala ovata. *Linn.* Narcissus sylvestris pallidus, calyce luteo. *C. B. P.* 52.

1583. 1932. —— spathâ uniflorâ, nectarii limbo campanulato erecto patulo æquali. *Linn. Sp. Pl.* 289. [Narcissus *Pseudonarcissus.*

1584. 1931. —— spathâ uniflorâ, nectario maximo, limbo fimbriato, petalo

longiore. *Wilm.* [Narciſſus *Bulbocodium?*

1585. 1381. NARDUS americana procerior, foliis cæſiis. *Pluk. Alm.* [Cacalia *atriplicifolia.*

1586. 1481. NASTURTIUM orientale, foliis inferioribus millefolium, ſuperioribus perfoliatam referentibus. *T.* 214. [Lepidium *perfoliatum. b.*

1587. 1933. —— ſupinum, capſulis verrucoſis. *Raii Meth. Em.* 98. Coronopus Ruellii. *Ger.* 346. *Off.* 343. [Cochlearia *Coronopus?*

1588. 1525. NEPETA *Cataria*, floribus ſpicatis: verticillis ſubpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ſerratis. *Linn.* Mentha cataria vulgaris & major. *C. B. P.* 228.

1589. 1531. —— floribus obliquis. *Linn.* Lophanthus. *Amm.* [Hyſſopus *Lophantus?*

1590. 732. NERION, floribus rubeſcentibus. *C. B. P.* 464. [Nerium *Oleander.*

1591. 1582. NERIUM indicum anguſtifolium, floribus odoratis ſimplicibus. *H. Leyd.* [Nerium *Oleander. b.*

1592. 1684. NICOTIANA *glutinoſa*, foliis petiolatis cordatis integerrimis, floribus racemoſis ſecundis ſubringentibus. *Linn.*

1593. 673. —— latifolia major, albo flore: ex insulâ Tobago. *Rand.* [Nicotiana *Tabacum.*

1594. 671. 672. —— major angustifolia. *C.B.P.* 170. Nicotiana major, angusto longoque folio, caulem ferè amplectente. *Rand.* [Nicotiana *fruticosa.*

1595. 1683. —— *paniculata*, foliis petiolatis cordatis integerrimis, floribus paniculatis obtusis clavatis. *Linn.* Nicotiana folio cordiformi, tubo floris prælongo. *Feuill. Per. p.* 714, *t.* 10.

1596. 543. NIGELLA angustifolia, flore majore, simplici, cœruleo. *C. B. P.* [Nigella *damascena.*

1597. 937. 2080. —— *arvensis*, pistillis quinis, petalis integris, capsulis turbinatis. *L.* Nigella arvensis cœrulea. *C. B. P.*

1598. 985. —— cretica, semine aromatico. *C. B. P.* [

1599. 2081. —— *hispanica*, pistillis denis corollam æquantibus. *Linn.*

1600. 541. —— orientalis, flore flavescente, semine alato plano. *T. Cor.* 19. [Nigella *orientalis.*

1601. 542. 2082. —— *sativa*, pistillis quinis, capsulis muricatis subrotundis, foliis subpilosis. *Linn.* Nigella, flore minore, simplici, candido. *C. B. P.* 145.

1602. 248. NIRURI barbadenſe, folio ovali ſubtùs glauco, pediculis florum breviſſimis. *Rand.* [Phyllanthus *Niruri.*

1603. 1134. NISSOLIA. *T. Inſt.* [Lathyrus *Niſſolia.*

1604. 674. NUMMULARIA major, lutea. *C. B. P.* 309. [Lyſimachia *Nummularia.*

O

1605. 1383. OBELISCOTHECA hydrophylli foliis, lobis anguſtioribus. *Vaill. A. P.* [Rudbeckia *laciniata. a.*

1606. 1382. —— hydrophylli foliis, lobis latioribus. *Vaill.* [Rudbeckia *laciniata.*

1607. 1135. —— integrifolia, radio aureo, umbone atrorubente. *H. Elth.* [Rudbeckia *hirta.*

1608. 1235. —— minor, integro folio. *Dill.* [

1609. 1047. OCHRUS, folio integro capreolos emittente. *C. B. P.* 243. [Piſum *Ochrus.*

1610. 2026. OCYMUM caryophyllatum maximum. *C. B. P.* 225. [Ocymum *Baſilicum. b.*

1611. 2134. —— *Scutellarioides*, corollis falcatis, pedicellis ramoſis. *Linn.*

1612. 1482. —— zeylanicum perenne fruteſcens,

foliis calaminthæ. *Boerh.* [Mentha *perilloides*.

1613. 1189. 1190. 1784. ŒNANTHE apii folio. *C. B. P.* 162. Staphilini folio aliquatenùs accedens. *J. B.* [Œnanthe *pimpinelloides*.

1614. 2083. — *prolifera*, umbellarum pedunculis marginalibus longioribus ramosis masculis. *Linn.*

1615. 1084. — stellata cretica, P. Alpini. *Park.* [

1616. 2527. ŒNOTHERA *fruticosa*, foliis lanceolatis subdentatis, capsulis pedicellatis acutangulis, racemo pedunculato. *Linn.*

1617. 1831. 2526. — *pumila*, foliis lanceolatis obtusis glabris subpetiolatis, caulibus prostratis, capsulis acutangulis. *Linn.* Œnothera foliis radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis obtusis, capsulis ovatis sulcatis. *Mill. Ic.* Lysimachia siliquosa glabra minor mariana, angustioribus foliis. *Pluk. Mant.* 123. *Mill. Ic.* 188.

1618. 2173. OLDENLANDIA *biflora*, pedunculis bifloris petiolo longioribus, foliis lanceolatis. *Linn.*

1619. 884. — humilis, hyssopifolia. *Plum. N. G.* 42. [Oldenlandia *corymbosa*.

1620. 986. 2378. OLEA *europæa*, foliis lanceolatis. *Linn.* Olea vulgaris sativa. *C. B. P.* 472.

1621. 987. —— maxima hiſpanica. *C. B. P.* [

1622. 988. —— minor lucenſis, fructu odorato. *T. Inſt.* [

1623. 1281. OMPHALODES luſitanica, lini folio. *T. Inſt.* 140. [Cynogloſſum *linifolium.*

1624. 581. —— pumila verna; ſymphyti folio. *T. Inſt.* 140. [Cynogloſſum *Omphalodes.*

1625. 582. ONAGRA bonarienſis villoſa, flore mutabili. *H. Elth.* 297, *t.* 219. [Œnothera *molliſſima.*

1626. 987. —— fruteſcens argentea anguſtifolia. *Ind. Hort. Chelſ.* [

1627. 1082. —— latifolia. *T. Inſt.* [Œnothera *biennis.*

1628. 1832. ONOBRYCHIS major, ſiliculis echinatis criſtatis, in ſpicam digeſtis. *Mor. H.* 2, 131. Onobrychis foliis viciæ, fructu echinato major. *C. B. P.* 350. [Hedyſarum *Onobrychis.*

1629. 2429. ONONIS *criſpa*, fruticoſa, foliis ternatis undulatis ſubrotundis dentatis viſcoſo-pubeſcentibus, pedunculis unifloris muticis. *L.*

1630. 2379. —— *ornithopodioides*, pedunculis bifloris ariſtatis, leguminibus linearibus cernuis. *L.* Fœnum græcum ſiculum, ſiliquis ornithopodii. *T. Inſt.* 409.

1631. 2528. —— *rotundifolia*, fruticoſa, foliis ter-

natis ovatis dentatis, calycibus triphyllo-bracteatis, pedunculis ſubtrifloris. *L.* Cicer ſylveſtre latifolium triphyllum. *C. B. P.* 347.

1632. 1236. OPHIOGLOSSUM lingua ſerpentina. *Park.* [Ophiogloſſum *vulgatum.*

1633. 1237. OPHRIS bifolia. *C. B. P.* [Ophrys *ovata.*

1634. 733. ORCHIS galeâ & alis ferè cinereis. *J. B.* 2, 735. [Orchis *militaris.*

1635. 1083. ORIGANUM heracleoticum, cuniła gallinacea Plinii. *C. B. P.* [Origanum *heracleoticum.*

1636. 2380. —— *Majorana*, foliis ovatis obtuſis, ſpicis ſubrotundis compactis pubeſcentibus. *Linn.* Majorana vulgaris. *C. B. P.* 224.

1637. 1046. —— officinarum. Origanum anglicum. *Ger.* [Origanum *vulgare.*

1638. 1635. ORNITHOGALUM humile, foliis ovatis ſeſſilibus, floribus corymboſis, nobis. *Wilm.* [

1639. 1338. ORNITHOPODIUM portulacæ folio. *T. Inſt.* 400. [Ornithopus *Scorpioides.*

1640. 1934. —— radice nodosâ. *Park.* 1093. [Ornithopus *perpuſillus. c.*

1641. 442. —— ſcorpioides: ſiliquâ compreſsâ. *T. Inſt.* 400. [Ornithopus *compreſſus.*

1642. 1833. OROBUS *Lathyroides*, foliis conjugatis ſubſeſſilibus ſtipulatis dentatis. *Linn.* Lathyroides erecta, folio ovato acuminato, cœruleis viciæ floribus & ſiliquis, ſibirica. *Amm. Ruth.* 151, *t.* 7, *f.* 2.

1643. 1238. —— ſylvaticus, viciæ foliis. *C. B. P.* [Orobus *niger.*

1644. {1532. 2529.} —— *vernus*, foliis pinnatis ovatis, ſtipulis ſemiſagittatis integerrimis, caule ſimplici. *L.* Orobus ſylvaticus purpureus vernus. *C. B. P.* 351.

1645. 1048. —— vulgaris herbariorum. *Ger. Park.* [Ervum *Ervilia.*

1646. 1879. ORTEGIA *hiſpanica*, floribus ſubverticillatis, caule ſimplici. *L.*

1647. 1437. ORYZA. *Lob. Ic.* 31. *Offic.* 336. [Oryza *ſativa.*

1648. 2331. OSMUNDA *criſpa*, frondibus ſupradecompoſitis, pinnis alternis ſubrotundis inciſis. *L.* Adiantum criſpum alterum. *Raii Syn.* 126.

1649. 1738. —— vulgaris & paluſtris. *T. Inſt.* 547. Filix ramoſa non dentata, florida. *C. B P.* 357. [Oſmunda *regalis.*

1650. 1636. OSTEOSPERMUM foliis oblongis acutè dentatis, caule fruticoſo diffuſo, nobis. *Wilm.* [

1651. 1880. —— foliis oppoſitis palmatis, *Linn.* Chryſanthemum perenne virgi-

nianum majus, platani folio, orientale. *Mor. Hiſt.* [Polymnia *Uvedalia.*

1652. 1483. — *ſpinoſum*, ſpinis ramoſis. *Linn.*

1653. 938. OSTRYS americana, fructu lupuli. *Ind. Hort. Chelſ.* [Carpinus *Oſtrya?*

1654. 1583. OTHONNA *coronopifolia*, foliis infimis lanceolatis integerrimis, ſuperioribus ſinuato-dentatis. *Linn.* Jacobæa africana fruteſcens, coronopi folio. *Comm. Hort. Amſt. p.* 2, 139.

1655. 1637. — *pectinata*, foliis pinnatifidis, laciniis linearibus parallelis. *L.* Jacobæa africana fruteſcens, foliis abſynthii umbelliferi incanis. *H. Amſt.* 2, *p.* 137.

1656. 1881. OXALIS *caprina*, ſcapis umbelliferis, foliis ternatis glabris, floribus erectis. *Linn.* Oxalis bulboſa pentaphylla & hexaphylla, floribus magnis luteis & copioſis. *Burm. Pl. Afr.* 80.

1657. 2174. — *ſtricta*, caule erecto herbaceo, pedunculis umbelliferis. *Linn.* Trifolium acetoſum corniculatum luteum majus rectum indicum. *H. Ox.* 2, *p.* 184, *ſ.* 2, *t.* 17, *f.* 3.

1658. 1685. OXYS bulboſa æthiopica minor, folio cordato, flore ex albido

purpuraſcente. *H. Amſt.* 1, 48. [Oxalis *incarnata.*

1659. 1484. — bulboſa africana rotundifolia, floribus purpureis amplis. *H. Amſt. f.* 21. [Oxalis *purpurea.*

1660. 1979. — flore albo. *T. Inſt.* 88. Lujula. *Offic.* 291. [Oxalis *Acetoſella.*

1661. 1384. — lutea. *J. B.* 388. [Oxalis *corniculata.*

1662. 885. — lutea americana, procumbens. *Rand.* [Oxalis *corniculata. b?*

P

1663. 1834. PADUS foliis oblongo-ovatis ſempervirentibus eglanduloſis. *Mill. Ic.* Lauro-ceraſus luſitanica minor, azarero luſitanorum. *T. Inſt.* 628. [Prunus *luſitanica.*

1664. 1282. — Theophraſti. *Dalech. Lugdun.* 312. [Prunus *Padus?*

1665. 2027. PÆONIA foliis quinquelobatis lanceolatis, ex Tartariâ. *Wilm.* [Pæonia *anomala.*

1666. 1239. — mas. *Offic.* & *C. B. P.* [Pæonia *officinalis. b. maſcula.*

1667. 2480. — *officinalis. a. feminea*, foliolis oblongis. *Linn.* Pæonia communis vel fœmina. *C. B. P.* 323.

1668. 1980. PALIURUS. *Rai.* 154. *Dod.* 756. [Rhamnus *Paliurus.*

1669. {2381. 2531.} PANICUM *capillare*, paniculâ capillari erectâ patente, foliorum

vaginis hirtis. *Linn.* Panicum miliaceum viride, foliis latis brevibus, paniculâ capillaceâ. *Sloan. Jam.* 1, *p.* 115, *t.* 72, *f.* 2.

1670. 2243. — *colonum*, ſpicis alternis ſecundis nuticis ovatis ſcabris, rachi teretiuſculâ. *Linn.* Gramen paniceum minus, ſpicâ divulsâ, inſulæ barbadenſis. *Pluk. Phyt. t.* 189, *f.* 5.

1671. 2530. — *filiforme*, ſpicis ſubdigitatis approximatis erectis linearibus, rachi flexuosâ, dentibus bifloris: altero ſeſſili. *Linn.*

1672. 1935. — germanicum, ſive paniculâ minore. *C. B. P.* 27. *Offic.* 343. [Panicum *italicum ?*

1673. 2333. — *glaucum*, ſpicâ tereti, involucellis bifloris faſciculato-piloſis, ſeminibus undulato-rugoſis. *L.* Panicum ſpicâ ſimplici, ariſtis aggregatis, floſculo ſubjectis. *Gron. Virg.* 134.

1674. 1049. — indicum, ſpicâ longiſſimâ. *C. B. P.* 343. [

1675. 2332. — *italicum*, ſpicâ compoſitâ, ſpiculis glomeratis ſetis immixtis, paniculis hirſutis. *L.* Panicum italicum ſive paniculâ majore. *C. B. P.* 27.

1676. 2240. — *miliaceum*, paniculâ laxâ flaccidâ, foliorum vaginis hirtis,

glumis mucronatis nervosis. *L.* Milium semine albo & luteo. *C. B. P.* 8. *Th.* 139.

1677. 2239. — *patens*, paniculâ oblongâ flexuosâ capillari patente, calycibus bifloris, foliis lineari-lanceolatis, culmo radicante. *Linn.* Tsiama-pullu. *H. Mal.* 12, 75, *t.* 41.

1678. 2532. — *polystachion*, spicis teretibus, involucellis unifloris fasciculato-setosis, culmis erectis supernè ramosis. *Linn.*

1679. 2241. — *verticillatum*, spicâ verticillatâ, racemulis quaternis, involucellis unifloris bisetis, culmis diffusis. *Linn.* Gramen paniceum, spicâ multiplici. *C. B. P.* 8. *Th.* 139.

1680. 2242. — *viride*, spicâ tereti, involucellis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus nervosis. *Linn.* Gramen paniceum, spicâ simplici. *C. B. P.* 8. *Sch. Agr.* 46.

1681. 1191. PAPAVER hortense, semine nigro, sylvestris Dioscoridis. *C. B. P.* [Papaver *somniferum. b.*

1682. 1739. — laciniato folio, capitulo hispido rotundiore. *T. Inst.* Argemone capitulo rotundiore. *Park.* 369. [Papaver *hybridum.*

1683. 443. — luteum, perenne, laciniato folio; cambrobritannicum. *Raii*

Syn. Ed. 3, 309. Argemone lutea cambrobritannica. *Park. Th.* 369. [Papaver *cambricum.*

1684. 1584. — *nudicaule*, capſulis hiſpidis, ſcapo unifloro nudo hiſpido, foliis ſimplicibus pinnato-ſinuatis. *Linn.*

1685. 1740. — orientale hirſutiſſimum, magno flore. *T. Cor.* 17. [Papaver *orientale.*

1686. 444. — ſpinoſum. *C. B. P.* 171. [Argemone *mexicana.*

1687. 2279. PARIETARIA *luſitanica*, foliis ovatis obtuſis, caulibus filiformibus ſtriatis lævibus procumbentibus. *Linn.* Parietaria luſitanica, annua minima. *T. Inſt.* 506. *Raii Hiſt.* 3, *p.* 129.

1688. 336. — officinarum & Dioſcoridis. *C. B. P.* 121. [Parietaria *officinalis.*

1689. 939. — polygoni folio, caneſcens. *Mill.* [

1690. 337. — vulgaris anglica. *Rand.* Parietaria minor, ocymi folio. *C. B. P.* 121. [Parietaria *judaica.*

1691. 734. PARNASSIA paluſtris & vulgaris. *T. Inſt.* 240. Gramen Parnaſſi, albo ſimplici flore. *C. B. P.* 309. [Parnaſſia *paluſtris.*

1692. 583. PARONYCHIA hiſpanica. *Cluſ. Hiſt.* 182. [Illecebrum *Paronychia.*

1693.

1693. 338. PARTHENIASTRUM americanum; ambrosiæ folio. *A. R. Sc. Par.* [Parthenium *Hysterophorus.*

1694. 1385. —— helenii folio. *H. Elth.* [Parthenium *integrifolium.*

1695. 1785. PASSERINA *filiformis*, foliis linearibus convexis quadrifariàm imbricatis, ramis tomentosis. *L.*

1696. 2334. —— *hirsuta*, foliis carnosis extùs glabris, caulibus tomentosis. *Linn.* Thymelæa tomentosa, foliis sedi minoris. *C. B. P.* 463.

1697. 2382. PASSIFLORA *cœrulea*, foliis palmatis integerrimis. *Linn.* Flos passionis major pentaphyllos. *Sloan. Jam.* 1, *p.* 229.

1698. 2178. —— *laurifolia*, foliis indivisis ovatis integerrimis, petiolis biglandulosis, involucris dentatis. *L.* Passiflora arborea, laurinis foliis, americana. *Pluk. Alm.* 282, *t.* 211, *f.* 3.

1699. 2280. —— *rubra*, foliis bilobis cordatis acuminatis subtùs subtomentosis. *L.* Flos passionis, folii mediâ laciniâ quasi abscissâ, flore minore carneo. *Sl. Jam.* 144. *Hist.* 1, *p.* 229.

1700. 2281. —— *serratifolia*, foliis indivisis ovatis serratis. *L.* Granadilla americana folio oblongo, leviter

ſerrato, petalis ex viridi rufeſcentibus. *Mart. Cent.* 36, *t.* 36.

1701. 2179. — *Veſpertilio*, foliis bilobis baſi rotundatis glanduloſiſque: lobis acutis divaricatis ſubtùs punctatis. *Linn.* Granadilla bicornis, flore candido, filamentis contortis. *Dill. Elth.* 164, *t.* 137, *f.* 164.

1702. 675. PASTINACA ſylveſtris latifolia auſtriaca. *D. Boerh.* [Paſtinaca *ſativa*.

1703. 1283. PAVIA. *Boerh. Ind. Alt.* 2, 260. [Æſculus *Pavia*.

1704. 1638. PELECINUS vulgaris. *T. Inſt.* 417. Aſtragalus purpureus annuus peregrinus, ſiliquis utriuſque ſerræ ſimilibus. *M. Hiſt.* 2, 107. [Biſerrula *Pelecinus*.

1705. 2430. PELTARIA *alliacea*, foliis amplexicaulibus oblongis indiviſis. *L.* Thlaſpi montanum glaſti folio majus. *C. B. P.* 106.

1706. 180. PENTAPHYLLOIDES canadenſe, folio agrimoniæ, Sarraceni. *D. Vaill.* [Potentilla *penſylvanica*.

1707. 179. — erectum. *J. B.* 2, 398. [Potentilla *rupeſtris*.

1708. 181. — fragariæ folio. *Bot. Monſp. Ap.* 309. [Potentilla *monſpelienſis*.

1709. 182. — fragariæ folio & crenis obtuſioribus. *Rand.* [

1710. 33. — fruticoſa. *Raii Syn.* 142. [Potentilla *fruticoſa.*

1711. 32. — paluſtre rubrum. *T. Inſt.* 298. [Comarum *paluſtre.*

1712. 283. PERFOLIATA vulgatiſſima, ſive arvenſis. *C. B. P.* 277. [Buplevrum *rotundifolium.*

1713. 2028. PERICLYMENUM capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis ſummis connato-perfoliatis, ſubtùs glaucis. *Wilm.* [

1714. 1741. — perfoliatum virginianum, ſemper virens & florens. *H. L. B.* [Lonicera *ſempervirens.*

1715. 1085. PERIPLOCA foliis oblongis. *T. Inſt.* [Periploca *græca.*

1716. 1585. PERSICARIA fruteſcens maculoſa virginiana, flore albo. *Park. Th.* 857. [Polygonum *virginianum.*

1717. 280. — mitis. *J. B.* 3, 779. [Polygonum *Perſicaria.*

1718. 281. — mitis major, foliis pallidioribus, D. Bobart. *Raii Syn. Ed.* 2, 58. [Polygonum *penſylvanicum.*

1719. 282. — orientalis, nicotianæ folio; calyce florum purpureo. *T. Cor.* 38. [Polygonum *orientale.*

1720. 633. — perennis repens latifolia. *Rand.* [

1721. 886. PERVINCA vulgaris, anguſtifolia. *T. Inſt.* 120. [Vinca *minor.*

1722. 887. PETASITES major & vulgaris. *C. B. P.* 197. [Tuſſilago *Petaſites.*

1723. 888. —— major, floribus albis, ſpicâ bipedali. *D. Bobart.* Petaſites major, floribus pediculis longis inſidentibus. *Raii Syn.* 3, 179. [Tuſſilago *hybrida.*

1724. 889. —— minor, folio tuſſilaginis. *Mor. H. R. Bl.* [Tuſſilago *alba.*

1725. { 786. / 2479. } PETIVERIA *alliacea*, floribus hexandris. *Linn.* Verbenæ aut ſcorodoniæ affinis anomala flore albido, calyce aſpero, allii odore. *Sloan. H.* 1, 172. Petiveria ſolani foliis, loculis ſpinoſis. *Plum. Nov. Gen.* 50.

1726. 1882. PEUCEDANUM germanicum. *C. B. P.* 149. *Mor. Umb.* 36. Fœniculum porcinum. *Lob. Adv.* 350. [Peucedanum *officinale.*

1727. 2246. PHALARIS *arundinacea*, paniculâ oblongâ ventricosâ amplâ. *L.* Gramen arundinaceum ſpicatum. *C. B. P.* 6. *Theatr.* 64.

1728. { 1136. / 2244. } —— *canarienſis*, paniculâ ſubovatâ ſpiciformi, glumis carinatis. *L.* Phalaris major, ſemine albo. *C. B. P.* 28.

1729. 1137. —— major, ſpicâ longiori. *C. B. P.* 28. [Phalaris *nodoſa?*

1730. 2245. —— *utriculata*, paniculâ ſpicatâ, petalis ariſtâ articulatâ, vaginâ

ſupremi folii ſpathiformi. *Linn.* Gramen pratenſe ſpicâ purpureâ ex utriculo prodeunte. *C. B. P.* 3, *Th.* 44.

1731. 1240. PHASEOLUS, flore coccineo. *Cornut.* [Phaſeolus *vulgaris. b.*

1732. 1742. PHILLYREA, oleæ epheſiacæ folio. *Pluk. Phyt. t.* 310, *f.* 5. [

1733. 2383. PHLEUM paniculatum, paniculâ cylindricâ ſpiciformi, glumis glabris, culmo ſubramoſo. *Hudſ. Fl. Angl.* 23. [

1734. 890. PHLOMIS acuminato viridi ſplendente folio, flore purpuraſcente, caulibus villoſis. *Rand.* [

1735. 187. — fruticoſa, humilis, latifolia, candidiſſima, floribus luteis. *Rand.* [

1736. 34. — fruticoſa, ſalviæ folio latiore & rotundiore. *T. Inſt.* 177. [Phlomis *fruticoſa.*

1737. 35. — fruticoſa, ſalviæ folio longiore & anguſtiore. *T. Inſt.* [

1738. { 892. / 2533. } — *Herba venti*, involucris ſetaceis hiſpidis, foliis ovato-oblongis ſcabris, caule herbaceo. *Linn.* Marrubium nigrum longifolium. *C. B. P.* 230. Phlomis narbonenſis hormini folio, flore purpuraſcente. *T. Inſt.* 178.

1739. 891. — hiſpanica, fruticoſa candidiſſima, flore ferrugineo. *T. Inſt.* 178. [

1740. 1981. —— involucris lanceolatis, foliis cordatis, tomentoſis, caule ſuffruticoſo. *Mill. Dict.* [Phlomis *purpurea ?*

1741. 1982. —— involucris lanceolatis, foliis ovatis ſubtùs tomentoſis. *Linn. Sp.* 585. [Phlomis *purpurea.*

1742. 1743. —— lychnitis. *Cluſ. Hiſt.* 27. Verbaſcum ſylveſtre monſpelienſe, flore luteo hiante. *J. B.* 3, 307. [Phlomis *Lychnitis.*

1743. 36. —— orientalis, lutea, anguſtifolia, cymis fulveſcentibus. *D. Sher.* [

1744. 188. —— orientalis, lutea herbacea, latifolia verticillata. *Rand.* [

1745. 37. —— ſamia, herbacea, lunariæ foliis. *T. Cor.* 10. [Phlomis *ſamia.*

1746. {1533. 2534.} —— *tuberoſa*, involucris hiſpidis ſubulatis, foliis cordatis ſcabris, caule herbaceo. *Linn.* Phlomis hormini folio, floribus parvis ſuavè rubentibus villoſiſſimis. *Amm. Ruth. p.* 39. Galeopſis maxima, foliis hormini. *Buxb. Cent. C.* 1, *p.* 4, *t.* 6.

1747. 2535. PHLOX *glaberrima*, foliis linearilanceolatis glabris, caule erecto, corymbo terminali. *L.* Lychnidea folio melampyri. *Dill. H. Elth.* 203, *t.* 166, *f.* 202.

1748. 1639. PHYLLIS *Nobla*, ſtipulis dentatis. *Linn.* Valerianella canarienſis

fruteſcens, ſimpla-nobla dicta. *H. Elth.* 405.

1749. 2175. PHYSALIS *angulata*, ramoſiſſima, ramis angulatis glabris, foliis ovatis dentatis. *Linn.* Solanum veſicarium indicum. *C. B. P.* 166. Alkekengi indicum glabrum, chenopodii folio. *Dill. Elth.* 15, *t.* 12, *f.* 12.

1750. 2177. — *curaſſavica*, caule fruticoſo, foliis ovatis tomentoſis. *Linn.* Solanum veſicarium curaſſavicum, ſolano antiquorum ſimile, foliis origani ſubincanis. *Hiſt. Ox.* 3, *p.* 527. *Pluk. Alm.* 352, *t.* 111, *f.* 5.

1751. 2176. — *pubeſcens*, ramoſiſſima, foliis villoſo-viſcoſis, floribus pendulis. *Linn.* Solanum veſicarium virginianum procumbens annuum, folio lanuginoſo. *H. Ox.* 3, *p.* 527, *ſ.* 13, *t.* 3, *f.* 24.

1752. 1586. — *viſcoſa*, foliis geminis repandis obtuſis ſubtomentoſis, caule herbaceo ſupernè paniculato. *Linn.* Alkekengi bonarienſe repens, baccâ turbinatâ viſcoſâ. *H. Elt. p.* 11.

1753. 584. PHYTOLACCA americana, majori fructu. *T. Inſt.* 299. Solanum magnum virginianum rubrum. *Park. Theatr.* 347. [Phytolacca *decandra*.

1754. 586. —— americana minor, baccâ monopyrenâ: ſolanoides pariſienſium. *Rand.* [Rivina *humilis ?*

1755. 893. —— fructu monopyreno, majore, folio longiore, glabro. *Rand.* [Rivina *lævis ?*

1756. 585. —— mexicana, baccis ſeſſilibus. *H. Elth.* 318. [Phytolacca *octandra.*

1757. 2286. PIERCEA glabra, foliis ovato-lanceolatis glabris. *Mill. Dict. Hort. Ed.* 8. Rivina *octandra*, racemis ſimplicibus, floribus octandris dodecandriſve. *Linn.*

1758. 894. PILOSELLA major umbellifera, macrocaulos: floribus eſt floſculoſis. *Col. Ecphr.* 248. [Hieracium *Auricula.*

1759. 389. PIMPINELLA major, rigida, prælta, auriculata, ſabauda. *Bocc. Muſ. p.* 19. [Sanguiſorba *officinalis. b.*

1760. 388. —— ſanguiſorba major. *C. B. P.* 160. [Sanguiſorba *officinalis.*

1761. 1936. —— ſanguiſorba minor. *C. B. P.* 160. [Poterium *Sanguiſorba.*

1762. 839. PINUS halepenſis; foliis tenuibus lætè virentibus. *Rand.* [

1763. 2029. PISUM caule angulato procumbente, foliolis inferioribus lanceolatis acutè dentatis, ſummis ſagittatis. *Dict. Hort.* [Piſum *maritimum.*

1764. 990. —— cortice eduli. *T. Inſt.* [Piſum *ſativum. c.*

1765. 1241. —— humile, caule firmo. *T. Inſt.* [Piſum *ſativum.*

1766. 2283. PLANTAGO *afra*, caule ramoſo fruticoſo, foliis lanceolatis dentatis, capitulis aphyllis. *Linn.* Pſyllium foliis crenatis indicum. *C. B. P.* 191.

1767. 1640. —— anguſtifolia, paniculis lagopi. *C.B.P.* 374. [Plantago *Lagopus.*

1768. 2135. —— *aſiatica*, foliis ovatis glabris, ſcapo angulato, ſpicâ floſculis diſtinctis. *Linn.*

1769. 2284. —— *Cynops*, caule ramoſo ſuffruticoſo, foliis integerrimis filiformibus ſtrictis, capitulis ſubfoliatis. *Linn.* Pſyllium majus ſupinum. *C. B. P.* 191.

1770. 1086. —— major incana. *Park.* [Plantago *media.*

1771. 2282. —— *maritima*, foliis ſemicylindraceis integerrimis baſi lanatis, ſcapo tereti. *Linn.* Coronopus maritimus major. *C. B. P.* 190.

1772. 1438. —— maxima tartarica. *Gerber.* [

1773. 1787. PLATANUS occidentalis aut virginienſis. *Park.* 1427. [Platanus *occidentalis.*

1774. {1786. 1788.} —— orientalis verus. *Park.* 1427. Platanus orientalis, aceris folio.

T. Cor. 41. [Platanus *orientalis*.

1775. 1587. PLUMBAGO *zeylanica*, foliis petiolatis ovatis glabris, caulibus filiformibus. *Linn.* Ceylanenſis folio ſplendente, ocymaſtri flore lacteo. *Burm. Zeyl.* 195.

1776. 2387. POA *anguſtifolia*, panicula diffusâ, ſpiculis quadrifloris pubeſcentibus, culmo erecto tereti. *Linn.* Gramen pratenſe paniculatum majus, anguſtiore folio. *C. B. P.* 2.

1777. 2384. —— *annua*, paniculâ diffusâ angulis rectis, ſpiculis obtuſis, culmo obliquo compreſſo. *L.* Gramen pratenſe paniculatum minus. *C. B. P.* 2.

1778. 2247. —— *ciliaris*, paniculâ contractâ, glumarum valvulis interioribus piloſo-ciliatis. *Linn.* Gramen pratenſe, ſpicis brevibus muticis, locuſtis minimis. *Sloan. H. Jam.* 1, *t.* 73, *f.* 1.

1779. 2250. —— *compreſſa*, paniculâ coarctatâ ſecundâ, culmo obliquo compreſſo. *Linn.* Gramen paniculatum radice repente, culmo compreſſo. *Vaill. Par.* 91, *t.* 18, *f.* 5.

1780. 2248. —— *Eragroſtis*, paniculâ patente, pedicellis flexuoſis, ſpiculis ſeratis deceînfloris, glumis triner-

viis. *Linn.* Gramen phalaroides ſparsâ brizæ paniculâ, minus. *Barr. Ic.* 44, *f.* 2.

1781. 2388. —— loliacea ſpicata, ſpiculis alternis ſeſſilibus, ſubſexfloris. *Hudſ. Fl. Angl.* 35. Gramen pumilum loliaceo ſimile. *Raii Syn.* 395. [Triticum *maritimum.*

1782. 2386. —— *pratenſis*, paniculâ diffusâ, ſpiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. *L.* Gramen pratenſe paniculatum majus, latiore folio. *C. B. P.* 2.

1783. 2249. —— *rigida*, paniculâ lanceolatâ ſubramosâ ſecundâ: ramulis alternis ſecundis. *L.* Gramen exile duriuſculum, in muris & aridis proveniens. *Raii Syn.* 410.

1784. 2385. —— *trivialis*, paniculâ diffusâ, ſpiculis trifloris baſi pubeſcentibus, culmo erecto tereti. *L.* Gramen pratenſe paniculatum medium. *C. B. P.* 2.

1785. 1835. POLEMONIUM foliis pinnatis, radicibus reptatricibus. *Fl. Virgin.* 22. [Polemonium *reptans.*

1786. 1242. —— vulgare. *T. Inſt.* [Polemonium *cœruleum.*

1787. 2030. POLIUM candidum tenellum tomentoſum, flore purpureo. *J. B.* 3, 300. [

1788. 479. —— erectum, album, anguſtiori folio & ſpicâ. *Rand.* [

1789. 840. —— erectum, minus anguſtifolium. *Rand.* An polium hiſpanicum tenuifolium, flore albo, capitulo breviori. *T. Inſt.* 207 ? [

1790. 1485. —— maritimum ſupinum venetum. *C. B. P.* 221. [Teucrium *Polium. d.*

1791. 478. —— montanum album. *C. B. P.* 221. [Teucrium *Polium. b.*

1792. 477. —— montanum luteum. *C. B. P.* 220. [Teucrium *Polium.*

1793. 480. —— pyrenaicum, ſupinum, hederæ terreſtris folio. *T. Inſt.* 266. [Teucrium *pyrenaicum.*

1794. 2285. POLYCARPON *tetraphyllum*, caule ramoſo proſtrato, foliis quaternis. *Linn.* Anthyllis alſinifolia polygonoides major. *Barr. Rar.* 103, *t.* 534.

1795. 2389. POLYCNEMUM *arvenſe. Linn.* Camphoratæ congener. *C. B. P.* 486. [Camphorata vaginis ſpinoſis. *Hall. Helv.* 183.

1796. 1486. POLYGALA africana, fruteſcens, buxi folio, maximo flore. *Olden.* [Polygala *myrtifolia ?*

1797. 737. 738. 1087. 1339. POLYGONATUM latifolium, flore majore odoro. *C. B. P.* 303. Polygonatum latifolium vulgare. *C. B. P.* 303. Polygonatum floribus ex ſingulis pediculis. *J. B.* Polygonatum caule

purpuraſcente. *Raii Syn.* 2, 148. [Convallaria *Polygonatum.*

1798. 1284. —— latifolium, hellebori albi foliis. *C. B. P.* [Convallaria *racemoſa.*

1799. 739. —— majus, vulgari ſimile. *J. B.* 3, 529. [Convallaria *Polygonatum. b.*

1800. 2536. POLYGONUM *amphibium*, floribus pentandris ſemi-digynis, ſpicâ ovatâ. *Linn.* Potamogeton ſalicis folio. *C. B. P.* 193.

1801. 1744. —— *ſcandens*, foliis cordatis, caule erecto ſcandente. *Linn.* Fagopyrum ſcandens americanum maximum. *T. Inſt.*

1802. 2390. POLYPODIUM *aculeatum*, frondibus bipinnatis: pinnis lunulatis ciliato-dentatis, ſtipite ſtrigoſo. *Linn.* Filix mas aculeata major. *C. B. P.* 358.

1803. 735. —— cambrobritannicum; pinnulis ad margines laciniatis. *Raii Syn. Ed.* 2, *p.* 35. [Polypodium *cambricum.*

1804. 2391. —— lobatum, fronde bipinnatâ; pinnis lanceolato-ovatis dentato-ciliatis ſupernè baſi lobatis, ſtipite ſtrigoſo. *Hudſ. Fl. Angl.* 390. Filix lonchitidis affinis. *Raii Syn.* 121. *Pluk. Phyt. t.* 180, *f.* 3. [Polypodium *aculeatum.*

1805. 736. —— murale, pinnulis ſerratis. *Pet. Bot. Hort.* [

1806. 940. —— ſenſibile. *Munting. Hiſt.* [

1807. 1937. —— vulgare. *C. B. P.* 359. Polypodium quercinum. *Off.* 379. [Polypodium *vulgare.*

1808. 841. POPULUS nigra, folio maximo; gemmis balſamum odoratiſſimum fundentibus. *Cat. Hiſt. t.* 34. [Populus *balſamifera.*

1809. 284. PORTULACA coraſſavica procumbens, capparidis folio, flore muſcoſo, capſulâ bifurcatâ. *Par. Bat.* 213. [Trianthema *monogyna.*

1810. 2431. POTENTILLA *anſerina*, foliis pinnatis ſerratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Linn.* Potentilla. *C. B. P.* 321.

1811. 1883. —— *multifida*, foliis bipinnatis, ſegmentis integerrimis diſtantibus, ſubtùs tomentoſis, caule decumbente. *Linn.* Pentaphylloides ſupinum minus, folio glabro non ſerrato. *Amm. Ruth.* 116.

1812. {2136. 2355.} —— *norvegica*, foliis ternatis, caule dichotomo, pedunculis axillaribus. *L.* Quinquefolium hirſutum luteum, paucioribus laciniis. *Loeſ. Pruſſ.* 218, *t.* 90.

1813. 740. PRENANTHES americana, folio lato, bipennem militarem referente, flaveſcente flore. *Rand.* [

1814. 2031. — floſculis plurimis, floribus nutantibus ſubumbellatis, foliis haſtato-angulatis. *Linn.* [Prenanthes *alba.*

1815. 1789. — foliis integris ſerratis ſcabris, radice repente, flore purpureo cœruleo. *Mill. Dict.* [

1816. 2432. PRIMULA *veris. c. acaulis*, foliis dentatis rugoſis. *L.* Verbaſculum ſylveſtre majus, ſingulari flore. *C. B. P.* 241.

1817. 1340. PRIMULA VERIS, flore rubro. *Ger.* [Primula *farinoſa.*

1818. 1686. PRUNELLA bracteis pinnato-dentatis ciliatis. *Loeſl. Deſ.* 31. Bugula odorata luſitanica. *Corn. Can.* 46. [Cleonia *luſitanica.*

1819. 2336. — *grandiflora. b. vulgaris*, foliis omnibus ovato-oblongis ſerratis petiolatis. *Linn.* Brunella cœrulea, magno flore. *C. B. P.* 261.

1820. 1349. PSEUDO-ACACIA. *T. Inſt.* 649. [Robinia *Pſeudacacia.*

1821. 991. PSEUDO-DICTAMNUS acetabulis moluccæ. *C. B. P.* [Marrubium *acetabuloſum.*

1822. 941. — verticillatus odorus. *C. B. P.* [Marrubium *Pſeudo-dictamnus.*

1823. 445. PSEUDO-IPECACUANHA noveboracenſis. *D. Colden.* An periclymenum herbaceum, erectum vir-

ginianum, Dr. Tinker's weed vulgò vocatum. *Pluk. Alm.* 287. *Phyt. t.* 104, *f.* 2? [Trioſteum *anguſtifolium?*

1824. 2337. PSORALEA *corylifolia*, foliis ſimplicibus ovatis ſubdentatis, ſpicis ovatis. *Linn.* Loto affinis coryli folio. *Pluk. Phyt. t.* 96, *f.* 5.

1825. 2537. —— *pinnata*, foliis pinnatis linearibus, floribus axillaribus. *Linn.* Geniſtæ affinis arbor africana monoſpermos, flore cœruleo, foliis pinnatis. *Herm. L. B.* 272, *t.* 273.

1826. 676. PSYLLIUM anguſtifolium, perenne. *Rand.* Pſyllium majus ſupinum. *C. B. P.* 191. [Plantago *Cynops.*

1827. 678. —— Dioſcoridis, vel indicum, crenatis foliis. *C. B. P.* 191. [Plantago *afra.*

1828. 677. —— majus erectum anguſtifolium annuum. *Rand.* [

1829. 679. —— majus erectum latifolium annuum. *Rand.* Pſyllium majus erectum. *C. B. P.* 191. [Plantago *Pſyllium.*

1830. 446. PTARMICA agerati folio acutiori, ageratum album vulgò. *Rand.* [Achillea *Ageratum.*

1831. 992. —— flore pleno. *Mill.* [Achillea *Ptarmica.*

1832. 1535. —— *incana*, humilis, foliis laciniatis,

tis, abſynthii æmulis. *H. L.* 510. Abſynthium alpinum umbelliferum. *Cluſ. Hiſt.* 340. [Achillea *Clavennæ.*

1833. 1534. —— orientalis, foliis tanaceti incanis, flore aureo. *T. Cor.* [Achillea *pubeſcens.*

1834. 38. —— orientalis, pinnulis criſtatis. *T. Cor.* Abſynthium ſantonicum ægyptiacum. *C. B. P.* 325. [Achillea *ægyptiaca.*

1835. 587. —— orientalis, ſantolinæ folio, flore minori. *T. Cor.* 37. [Achillea *Santolina.*

1836. 2481. PTERIS *aquilina*, frondibus ſupradecompoſitis: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis: infimis pinnatifidis; ſuperioribus minoribus. *Linn.* Filix ramoſa major, pinnulis obtuſis non dentatis. *C. B. P.* 357.

1837. 2538. —— cheuſanica. *Curt.* Polypodium caule ſimplici, foliis ſimplicibus variis longis ſerratis. *Burm. Theſ. Zeyl. p.* 196, *t.* 82. Filicula cheuſanica. *Pluk. Am. p.* 94, *Phyt. t.* 407, *f.* 2. [

1838. 634. PULEGIUM anguſtifolium. *C. B. P.* 222. Pulegium cervinum. *Off.* [Mentha *cervina.*

1839. 635. —— anguſtifolium, flore albo. *H. R. P.* [Mentha *cervina. a.*

1840. 636. —— latifolium. *C. B. P.* 222. [Mentha *aquatica.*

1841. 637. —— latifolium erectum. *Rand.* [

1842. 741. —— minimum, ſerpilli facie. *Rand.* [

1843. 544. PULMONARIA, calyce veſicario. *Rand.* [

1844. 1285. —— maxima, foliis quaſi ſaccharo incruſtatis. *Pluk.* [

1845. 1836. —— *virginica*, calycibus abbreviatis, foliis lanceolatis obtuſiuſculis. *Linn.* Pulmonaria non maculoſa, foliis glabris, americana, flore patulo cœruleo. *Pluk. Phyt. t.* 227, *f.* 6.

1846. 1286. PULSATILLA folio craſſiore & majore flore. *C. B. P.* 177. [Anemone *Pulſatilla.*

1847. 1487. PUNICA, flore pleno majore. *T. Inſt.* 636. *Off.* 395. [Punica *Granatum. b.*

1848. 1050. PUNICA MALUS. *Off.* Malus granata. *Ger.* [Punica *Granatum.*

1849. 787. PYRETHRUM. *Off.* Pyrethrum, flore bellidis. *C. B. P.* 148. Chamæmelum ſpecioſo flore, radice longâ fervidâ. *D. Shaw. Phyt. Afr. Sp. N°.* 138. [Anthemis *Pyrethrum.*

1850. 788. —— fruteſcens canarienſe. *Rand.* Leucanthemum canarienſe, foliis cryſanthemi, pyrethri ſa-

pore. *T. Inſt.* 666. [Chryſanthemum *fruteſcens.*

Q

1851. 1687. QUAMOCLIT americana, folio hederæ, flore coccineo. *Comm. Rar.* 21. Convolvulus americanus, folio anguloſo, flore parvo coccineo. *Wilm.* [Ipomœa *coccinea.*

1852. 2482. QUERCUS *Ilex*, foliis ovato-oblongis indiviſis ſerratiſque ſubtùs incanis, cortice integro. *L.* Ilex folio anguſto non ſerrato. *C. B. P.* 424.

1853. 2483. — *Suber*, foliis ovato-oblongis indiviſis ſerratis ſubtùs tomentoſis, cortice rimoſo fungoſo. *Linn.* Suber latifolium ſempervirens. *C. B. P.* 424.

1854. 39. QUINQUEFOLIUM album majus alterum. *C. B. P.* 325. [Potentilla *alba.*

1855. 483. — foliis profundè & eleganter inciſis, flore luteo, petalis cordatis. *Cat. Pl. Agr. Flor. Hort. Piſ.*

1856. 186. — folio argenteo. *C. B. P.* 325. [Potentilla *argentea.*

1857. 482. — folio ſubtùs argenteo majus. *R.* An quinquefolium pyrenaicum,

folio ſubtùs argenteo. *T. Inſt.* 297? [Potentilla *argentea. a?*

1858. 185. —— minus, flore pallidè luteo. *T. Inſt.* 297. [Potentilla *argentea. d.*

1859. 484. —— minus, repens, luteum. *C. B. P.* 325. [Potentilla *verna.*

1860. 184. —— quod pentaphyllum, ſeu potiùs heptaphyllum rectum, caule rubro, hirſutius. *H. Cath. Boerh. Ind.* 2, 40. [Potentilla *argentea. c.*

1861. 183. —— rectum luteum. *C. B. P.* 325. [Potentilla *recta.*

R

1862. 1138. RANUNCULUS aconiti folio, flore albo multiplici. *C. B. P.* [Ranunculus *aconitifolius. b.*

1863. 447. 448. 2539. —— *arvenſis*, ſeminibus aculeatis, foliis ſuperioribus decompoſitis linearibus. *Linn.* Ranunculus arvenſis, ſeminibus magis echinatis, D. Sherard. *Boerh. Ind. Alt.* 32. Ranunculus arvenſis echinatus. *C. B. P.* 179.

1864. 2484. —— *auricomus*, foliis radicalibus reniformibus crenatis inciſis; caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. *Linn.* Ranunculus nemoroſus ſeu ſylva-

ticus, folio ſubrotundo. *C. B. P.* 178.

1865. 2433. — *bulboſus*, calycibus retroflexis, pedunculis ſulcatis, caule erecto multifloro, foliis compoſitis. *L.* Ranunculus pratenſis, radice verticilli modo rotundâ. *C. B. P.* 179.

1866. 1938. — ceratophyllus, ſeminibus falcatis in ſpicam adactis. *Mor. Hiſt.* 2, 440. [Ranunculus *falcatus*.

1867. 2485. — *Flammula*, foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Linn.* Ranunculus longifolius paluſtris minor. *C. B. P.* 180.

1868. 285. — hirſutus annuus, flore minimo. *Raii Syn. Ed.* 2, 135. [Ranunculus *parviflorus*.

1869. 2434. — *illyricus*, foliis ternatis integerrimis lanceolatis. *L.* Ranunculus lanuginoſus anguſtifolius, grumosâ radice. *C. B. P.* 181.

1870. 1287. — montanus, foliis plantaginis. *C. B. P.* 180. [Ranunculus *amplexicaulis*.

1871. 1688. — montanus, folio gramineo. *C. B. P.* 180. Ranunculus pumilus, gramineis foliis. *J. B.* 3, 866. [Ranunculus *pyrenæus*.

1872. 1139. — pratenſis erectus acris, flore pleno. *C. B. P.* [Ranunculus *acris. b.*

1873. 1090. —— ſtellatus echinatus creticus. *C. B. P.* [

1874. 1689. —— verus rotundifolius minor. *T. Inſt.* 286. Chelidonium minus. *Off. Ger.* 1669. [Ranunculus *Ficaria.*

1875. 2084. RAPHANUS chinenſis, ſiliquis toroſis acuminatis, foliis integris. *Wilm.* [

1876. 1342. RAPISTRUM maximum rotundifolium, monoſpermum. *Cornut.* 147. [Crambe *hiſpanica.*

1877. 1088. RAPUNCULUS montanus corniculatus. *Ger.* [Phyteuma *comoſa.*

1878. 789. RAPUNTIUM americanum, flore dilutè cœruleo. *Ac. Reg. Par.* [Lobelia *ſiphilitica.*

1879. 1243. —— maximum, coccineo ſpicato flore. *Col. in Rech.* [Lobelia *Cardinalis.*

1880. 588. —— trachelii folio, flore purpuraſcente. *Plum. Cat. p.* 5. [Lobelia *cliffortiana.*

1881. 790. —— virginianum, foliis oblongis, floribus parvis cœruleis, ſpicâ longiſſimâ laxâ. *Rand.* [

1882. 1292. RAUWOLFIA tetraphylla latifolia. *Plum.* [Rauwolfia *caneſcens.*

1883. { 791. / 1293. / 2180. } RESEDA *alba*, foliis pinnatis, floribus tetragynis, calycibus ſexpartitis. *L.* Reſeda alba. *J. B.* 3.

467. Reſeda maxima. *C. B. P.* 100. Reſeda foliis calcitrapæ, flore albo. *Mor. Hort. Bleſ.*

1884. 792. — criſpa gallica. *Bocc. Rar.* 76. [Reſeda *lutea. b.*

1885. 1343. — foliis inferioribus integris, ſuperioribus laciniatis. *Wilm.* [

1886. 1536. — minor vulgaris. *T. Inſt.* 423. Erucago apula. *Col.* 269. [Reſeda *Phyteuma.*

1887. 2181. — *undata*, foliis pinnatis undulatis, floribus trigynis tetragyniſve. *L.* Reſeda minor, foliis inciſis. *Barr. Rar.* 78, *tab.* 588.

1888. 84. RHAGADIOLUS alter. *Cæſalp.* 511. [Lapſana *ſtellata.*

1889. 85. — lampſanæ foliis. *T. Cor.* 36. [Lapſana *Rhagadiolus.*

1890. 1244. RHAMNUS catharticus. *Off.* & *C. B. P.* [Rhamnus *catharticus.*

1891. 2486. RHEUM *palmatum*, foliis palmatis acuminatis. *Linn.* Rhabarbarum. *Brun. Orient.* 192, *t.* 73.

1892. 2435. RHEXIA *virginica*, foliis ſeſſilibus ſerratis, calycibus glabris. *L.* Lyſimachia non pappoſa virginiana, tuberariæ foliis hirſutis, flore tetrapetalo rubello. *Pluk. Alm.* 235, *t.* 202, *f.* 8.

1893. 1939. RHUS foliis ternatis lineari-lanceolatis, integerrimis petiolatis utrinque glabris. *Wilm.* [

1894. 2392. — *radicans*, foliis ternatis: foliolis

petiolatis ovatis nudis integerrimis, caule radicante. *Linn.*

1895. 1140. —— virginiana, ſparsâ paniculâ; ramis patulis glabris. *Hort. Elth.* [Rhus *glabrum.*

1896. 391. RIBES americana; fructu nigro minimo; calyce floris campaniformi. *Rand.* [

1897. 390. —— fructu parvo. *Merr. Pin. Raii Syn. Ed.* 3, 456. [

1898. 1983. —— nigrum vulgò dictum, folio olente. *J. B.* 2, 98. [Ribes *nigrum.*

1899. 589. RICINOIDES americana, alni folio oblongo. *Houſt.* An ricinoides americana caſtaneæ folio. *Plum. Cat. p.* 20? [Croton *caſtaneifolium?*

1900. 339. —— arbor; americana; folio multifido. *T. Inſt.* 656. [Jatropha *multifida.*

1901. 2032. —— ex quâ paratur tourneſol gallorum. *T. Inſt.* 665. [Croton *tinctorium.*

1902. 993. RICINUS humilis, foliis ſubrotundis ſerratis & ſubtùs argenteis, flore fructuque congloneratis. *Houſt. Mill. Dict.* [

1903. 286. —— minor, ſtaphyſagriæ folio; flore pentapetalo purpureo. *Sloan.* 1, 129, *t.* 84. [Jatropha *goſſypifolia,*

1904. 2393. RICOTIA *ægyptiaca. Linn.* Lunaria foliis ſupradecompoſitis : foliolis trifidis, ſiliquis oblongis pendulis. *Mill. Ic.* 169.

1905. 1884. ROBINIA *Caragana*, pedunculis ſimplicibus, foliis abruptè pinnatis, petiolis inermibus. *Linn.* Caragana ſibirica. *Flor. Leyd.* 537.

1906. 1984. — foliis impari-pinnatis, foliolis ovatis, ramis pedunculiſque hiſpidis. *Dict. Hort.* [Robinia *hiſpida.*

1907. 680. ROSA moſchata, flore pleno. *C. B. P.* 482. [

1908. 2137. — *pendulina*, germinibus ovatis glabris, pedunculis cauleque hiſpidis, petiolis inermibus, fructibus pendulis. *Linn.*

1909. 895. — pimpinellæ folio ſcotica, flore eleganter variegato. *R.* Roſa ciphiana. *Sibbald. Scot. Illuſt.* [

1910. 681. — rubra plena ſpinoſiſſima, pedunculo muſcoſo. *Boerh. Ind. Alt.* 252. [

1911. 1194. — ſylveſtris pomifera major noſtras. *Raii Syn.* 2, 297. [Roſa *villoſa.*

1912. 896. — ſylveſtris virginienſis. *Rand.* [

1913. 2540. ROSMARINUS *officinalis. Linn.*

1914. 2338. RUBIA *peregrina*, foliis perennantibus linearibus ſuprà lævibus. *Linn.*

1915. 994. —— procumbens hexaphylla purpurea. *H. L. Bat.* [

1916. 1089. —— tinctorum ſativa. *Off.* [Rubia *tinctorum.*

1917. 2487. RUBUS *arcticus*, foliis ternatis, caule inermi unifloro. *Linn.*

1918. 41. —— odoratus. *Cornut.* 150. [Rubus *odoratus.*

1919. 2138. RUDBECKIA foliis inferioribus ſemilobatis inciſis, caulinis trifidis, vel quinquefidis, pedunculis longiſſimis. *Wilm.* [

1920. 2085. —— foliis lanceolato-ovatis hirſutis, radii petalis bifidis. *Wilm.* [

1921. 2033. RUELLIA *ſtrepens*, foliis petiolatis, pedunculis trifloris brevibus. *L.* Ruellia ſtrepens, capitulis comoſis. *Hort. Elth.* 300.

1922. 2436. RUMEX *acetoſa*, floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis. *Linn.* Acetoſa montana maxima. *C. B. P.* 114.

1923. 2437. —— *Acetoſella*, floribus dioicis, foliis lanceolato-haſtatis. *Linn.* Acetoſa arvenſis lanceolata. *C. B. P.* 114.

1924. 2086. —— floribus dioicis, foliis cordatis amplexicaulibus. *Wilm.* [

1925. 2488. RUSCUS *androgynus*, foliis margine floriferis. *Linn.* Ruſcus latifolius, è foliorum ſinu florifer & baccifer. *Dill. Hort. Elth.* 330, *t.* 250, *f.* 332.

1926. 1690. —— anguſtifolius, fructu ſummis ramulis innaſcente. *T. Inſt.* 79. Laurus alexandrina ramoſa, fructu è ſummitate caulium prodeunte. *H. R. P.* [Ruſcus *racemoſus*.

1927. 40. RUTA chalepenſis, latifolia, florum petalis villis ſcatentibus. *H. L. Bat.* 431. [Ruta *chalepenſis. a.*

1928. 1790. —— ſylveſtris linifolia, hiſpanica. *Barr. Ic.* 1186. *Boccon. Muſ. p.* 2, 82, *t.* 73. [Ruta *linifolia.*

1929. {1692. 2034.} —— ſylveſtris minor. *C. B. P.* 336. [Ruta *graveolens. d.*

1930. 1691. RUTA MURARIA. *C. B. P.* 356. Salvia vitæ. *Lob.* [Aſplenium *Ruta muraria.*

1931. 449. RUYSCHIANA, flore cœruleo, magno. *Boerh. Ind. Alt.* 173. Chamæpitys cœrulea auſtriaca. *C. B. P.* 250. [Dracocephalum *Ruyſchiana.*

1932. 1641. —— floribus verticillatis, nobis. *Wilm.* [

S

1933. 682. SALICARIA hyſſopi folio latiore. *T. Inſt.* 253. [Lythrum *Hyſſopifolia.*

1934. 1837. SALICORNIA. *T. Cor.* 51. Kali geniculatum. *Ger. Em.* 535. [Salicornia *herbacea.*

1935. 742. SALVIA africana fruteſcens; folio ſcorodoniæ; flore violaceo. *H. Amſt.* 2, 181. [Salvia *africana.*

1936. 1940. —— *dominica*, foliis cordatis obtuſis crenatis ſubtomentoſis, corollis calyce anguſtioribus. *L.*

1937. 1885. —— foliis oblongo-ovatis integerrimis, calycibus patulis coloratis. *Wilm.* [

1938. 2394. —— *hæmatodes*, foliis cordato-ovatis rugoſis tomentoſis, calycibus hiſpidis, radice tuberosâ. *Linn.* Horminum ſylveſtre majus hæmatodes glabrum, flore cœruleo italicum. *Barr. t.* 185.

1939. 2339. —— *hiſpanica*, foliis ovatis, petiolis utrinque mucronatis, ſpicis imbricatis, calycibus trifidis. *L.* Sclarea hiſpanica. *Tab. Hiſt.* 764. *Ic.* 374.

1940. 2395. —— *Horminum*, foliis obtuſis crenatis, bracteis ſummis ſterilibus majoribus coloratis. *Linn.* Horminum ſativum. *C. B. P.* 34.

1941. 1195. —— major, an ſphacelus Theophraſti. *C. B. P.* [Salvia *officinalis.*

1942. 1588. —— *mexicana*, foliis ovatis utrinque acuminatis ſerratis. *L.* Sclareæ mexicana altiſſima, facie heliotropii. *Hort. Elth.* 339.

1943. 1196. —— minor, aurita & non aurita. *C. B. P.* [Salvia *officinalis. b.*

1944. 2489. —— *nemoroſa*, foliis cordato-lanceolatis ſerratis planis, bracteis coloratis, corollæ labio infimo reflexo. *Linn.* Horminum ſylveſtre latifolium minus. *C.B.P.* 239.

1945. 86. —— orientalis, abſynthium redolens, foliis pinnatis, flore carneo, elatior. *D. Sher.* [

1946. 485. —— orientalis, foliis alatis, *D. Sher.* Salvia orientalis latifolia, hirſutiſſima, viſcoſa, pinnata, flore & calyce purpureis, inodora. *Boerh. Ind. Alt.* 167. *Cum fig. opt.* [Salvia *pinnata.*

1947. 486. —— orientalis, foliis alatis, major. *Rand.* Horminum chalepenſe, alato folio, flore majore rubicundo. *Hiſt. Ox.* 3, 394. [Salvia *pinnata?*

1948. 1985. SAMBUCUS *canadenſis*, cymis quinquepartitis, foliis ſubbipinnatis, caule fruteſcente. *Linn.*

1949. 1344. —— folio laciniato. *C. B. P.* 456. [Sambucus *laciniata.*

1950. 1345. —— humilis, ſive ebulus. *C. B. P. Off.* 180. [Sambucus *Ebulus.*

1951. 2438. —— *nigra*, cymis quinquepartitis, foliis pinnatis, foliolis ſubovatis ſerratis, caule arboreo. *Linn.*

Sambucus fructu in umbellâ nigro. *C. B. P.* 456.

1952. 1488. —— racemoſa rubra. *C. B. P.* 456. *Off.* 424. [Sambucus *racemoſa.*

1953. 1642. SAMOLUS *Valerandi. J. B.* 3, 741. Anagallis aquatica folio rotundo non crenato. *C. B. P.* 252. [Samolus *Valerandi.*

1954. 2340. SANICULA *marilandica*, floſculis maſculis pedunculatis: hermaphroditis ſeſſilibus. *Linn.*

1955. 1589. —— officinarum. *C. B. P.* 319. Mas Fuchſii, ſive diapenſia. *J. B.* 3, 639. [Sanicula *europæa.*

1956. 297. SANTOLINA caneſcens, foliis cupreſſi. *Rand.* An 4 *Dodon.* 269? [

1957. 292. —— foliis minus incanis. *T. Inſt.* 461. [Santolina *Chamæcypariſſus. d.*

1958. 293. —— foliis obſcurè virentibus. *T. Inſt.* 461. [

1959. 290. —— foliis teretibus. *T. Inſt.* 460. [Santolina *Chamæcypariſſus.*

1960. 295. —— incana, chamæmeli odore ſuaviore. *Boerh. Ind. Alt.* 123. [Santolina *Chamæcypariſſus. b.*

1961. 298. —— minor candidiſſima. *Rand.* [

1962. 291. —— repens & caneſcens. *T. Inſt.* 460. [

1963. 296. —— tota viridis; foliis ericæ aut ſabinæ. *Rand.* An 3 *Dod.* 269? [

1964. 294. —— vermiculata cretica. *T. Inſt.* 461. [Santolina *roſmarinifolia.*

1965. 2439. — SAPONARIA *orientalis*, calycibus cylindricis villosis, caule dichotomo erecto patulo. *Linn.* Lychnis orientalis, annua supina, antirrhini folio, flore minimo purpurascente. *Dill. Hort. Elth.* 205.

1966. 1693. SATUREIA capitulis terminalibus, foliis lanceolatis. *Linn. Sp.* 567. Satureia virginiana. *Herm. Par.* 218. Clinopodium foliis lanceolatis acuminatis, capitulis terminalibus. *Hort. Cliff.* 304. [Thymus *virginicus.*

1967. {1245. 2341.} — *hortensis*, pedunculis bifloris. *L.* Satureia hortensis. *C. B. P.* 218. Satureia hortensis æstiva. *C. B. P.*

1968. 340. — montana. *C. B. P.* 218. [Satureia *montana.*

1969. 341. — montana, latiori folio; ramulis minus erectis. *Rand.* [

1970. 1247. SAURURUS humilis, folio carnoso rotundo. *Plum.* [Piper *obtusifolium.*

1971. 2343. SAXIFRAGA *aizoides*, foliis caulinis lineari-subulatis sparsis nudis inermibus, caulibus decumbentibus. *Linn.* Sedum alpinum, flore pallido. *C. B. P.* 284. *Hist. Ox*, 3, 477, *s.* 12, *t.* 6, *f.* 3.

1972. 1590. — alpina ericoides, flore cœruleo. *T. Inſt.* Sedum alpinum ericoides cœruleum. *C. B. P.* 284. *Prodr.* 132. [Saxifraga *oppoſitifolia. b.*

1973. 1986. — aurea. *Ger.* 693. Rotundifolia aurea. *C. B. P.* 309. [Chryſoſplenium *oppoſitifolium.*

1974. 1791. — muſcoſa, trifido folio. *T. Inſt.* [Saxifraga *hypnoides.*

1975. 1141. — pratenſis, flore pleno. *Mill.* [

1976. 842. — rotundifolia alba. *C. B. P.* 309. [Saxifraga *granulata.*

1977. 1745. — ſedi folio, flore albo multiflora. *T. Inſt.* 252. Sedum pyrenaicum pyramidale longifolium elegantiſſimum. *Sch. Bot. Par.* Sanicula pyrenaica longifolia multiflora elegantiſſima. *H. L.* [Saxifraga *Cotyledon. c.*

1978. 2342. — *ſtellaris*, foliis ſerratis, caule nudo ramoſo, petalis acuminatis. *Linn.*

1979. 2541. — ſtolonifera, foliis radicalibus ſubrotundis, crenatis, hirſutis; ſtolonibus repentibus. *Curtis.* [

1980. 843. — verna, annua, humilior. *T. Inſt.* 252. Sedum tridactylites tectorum. *C. B. P.* [Saxifraga *tridactylites.*

1981. 2287. — *umbroſa*, foliis ovatis ſubretuſis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato. *Linn.* Geum folio

folio ſubrotundo minori, piſtillo floris rubro. *Mill. Ic.* 141, *f.* 2.

1982. 1591. SCABIOSA *africana*, corollulis quinquefidis æqualibus, foliis ſimplicibus inciſis, caule fruticoſo. *Linn.* Scabioſa africana fruteſcens. *Herm. Par.* 219.

1983. 1886. — africana fruteſcens, foliis rugoſis & crenatis, minor. *Par. Bat.* 225, *f.* 2. [Scabioſa *africana*, *b.*

1984. 2035. — africana fruteſcens, folio rigido ſplendente ſerrato, flore albicante. *Hort. Amſt.* 2, 185. [Scabioſa *rigida.*

1985. 2139. — *alpina*, corollulis quadrifidis æqualibus, calycibus imbricatis, floribus cernuis, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis ſerratis. *L.*

1986. 88. — altiſſima annua, foliis agrimoniæ nonnihil ſimilibus. *H. L. B.* 539. [Scabioſa *tranſylvanica.*

1987. 87. — annua centauroides fiſtuloſa. *H. Cath.* [Scabioſa *integrifolia.*

1988. 1197. — arborea cretica. *Ponæ.* [Scabioſa *cretica* ?

1989. 683. — capitulo globoſo, foliis in tenuiſſimas lacinias diviſis. *C. B. P.* 271. [Scabioſa *gramontia.*

1990. 684. — capitulo globoſo, major. *C. B. P.* 270. Scabioſa minor. *Matthiol.* [Scabioſa *columbaria.*

1991. 685. — capitulo globoſo, major, acutiore folio, tenuiter diſſecto. *Rand.* [

1992. 686. — capitulo globoſo tenuifolia, pediculis florum prælongis. *Rand.* An ſcabioſa capitulo globoſo minor. *C. B. P.?* [Scabioſa *columbaria?*

1993. 1987. — corollulis trifidis, foliis caulinis tripinnatis filiformibus. *Sauv. Monſp.* 268. [

1994. 1989. — folio integro hirſuto. *T. Inſt.* 466. *Off.* 475. [Scabioſa *Succiſa. b.*

1995. 1988. — *graminifolia*, corollulis quinquefidis radiantibus, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, caule herbaceo. *Linn.*

1996. 2088. — *ochroleuca*, corollulis quinquefidis radiantibus, foliis bipinnatis linearibus. *Linn.*

1997. 687. — peregrina rubra, capitulo oblongo. *C.B.P.* 270. Foliis integris. *Rand.* [Scabioſa *atropurpurea.*

1998. 1143. — peregrina capite oblongo nigricante, zibethi odore. *Mill.* [*(Ejuſd. var. c.)*

1999. 1990. — pratenſis hirſuta, quæ officinarum. *C. B. P.* 269. *Off.* 134. [Scabioſa *arvenſis.*

2000. {1643. 2087.} — *ſtellata*, corollulis quinquefidis radiantibus, foliis diſſectis, re-

ceptaculis florum ſubrotundis. *Linn.* Scabioſa ſtellata, folio laciniato major. *T. Inſt.*

2001. 2089. —— ſtellata, folio laciniato minor, ſive maritima. *C. B. P.* [Scabioſa *ſtellata. b.*

2002. 1490. —— ſtellata minima. *C. B. P.* [Scabioſa *ſtellata. c.*

2003. 1489. —— ſtellata, folio non diſſecto. *T. Inſt.* [Scabioſa *cretica.*

2004. 590. —— ſtellata, orientalis; floſculis marginalibus fimbriatis. *Rand.* [

2005. 1792. —— virgæ paſtoris folio. *C. B. P.* 270. Scabioſa latifolia peregrina. *Tab. Ic.* 160. [

2006. {2091. 2440.} SCANDIX *Cerefolium*, ſeminibus nitidis ovato-ſubulatis, umbellis ſeſſilibus lateralibus. *L.* Chærophyllum ſativum. *C. B. P.* 152.

2007. 1537. —— cretica minor. *C. B. P.* 152. Aniſomaratrum. *Col.* 1, 90. [Scandix *auſtralis.*

2008. 2441. SCILLA *bifolia*, floribus erectiuſculis paucioribus. *Linn.* Hyacinthus ſtellaris bifolius germanicus. *C. B. P.* 152.

2009. 1091. SCLAREA. *Off.* [Salvia *Sclarea.*

2010. 392. —— africana, ampliſſimo folio, annua. *Boerh. Ind. Alt.* 165. [

2011. 342. —— folio ſalviæ minor, ſive glabra *T. Inſt.* 180. [Salvia *nemoroſa. a.*

2012. 343. —— folio triangulari, caule tomentoſo. *T. Inſt.* 180. [Salvia *canarienſis.*

2013. 1246. —— indica, flore variegato. *Boerh.* [Salvia *indica.*

2014. 42. —— orientalis, betonicæ folio acutiſſimo, comâ purpuraſcente. *T. Cor.* 10.

2015. 189. —— rugoſo, verrucoſo & laciniato folio. *T. Inſt.* 180. [Salvia *ceratophylla.*

2016. 1538. —— ſicula, folio argenteo ſubrotundo. *Boerh. Ind. Alt.* 1, 163. Æthiopis tota argentea, perennis lanuginoſa. *Cup. H. Cath.* [Salvia *argentea.*

2017. 1539. —— vulgaris lanuginoſa, ampliſſimo folio. *T. Inſt.* 179. Æthiopis. *Dod. Pempt.* 148. [Salvia *Æthiopis.*

1018. 2092. SCLERANTHUS *annuus*, calycibus fructûs patulis. *Linn.*

2019. 1439. SCOLYMUS chryſanthemus annuus. *H. R. P.* 111. [Scolymus *maculatus.*

2020. 2141. —— *hiſpanicus*, floribus congeſtis. *Linn.* Foliis margine incraſſatis. *Linn. Sp. Pl.*

2021. 1941. SCORDIUM alterum, ſive ſalvia ſylveſtris. Scorodonia. *Off.* 438. *C. B. P.* 247. [Teucrium *Scorodonia.*

2022. 638. SCORPIOIDES buplevri folio. *C. B. P.* 287. [Scorpiurus *ſulcata.*

2023. 1440. —— buplevri folio, corniculis aſperis magis in ſe contortis & convolutis. *Mor. Hiſt.* [Scorpiurus *ſubvilloſa.*

2024. 639. —— ſiliquâ craſſâ, Bœlii. *Ger. Emac. App.* 1627. [Scorpiurus *vermiculata.*

2025. 640. —— ſiliquâ ſtriatâ, minùs aſperâ. *Rand.* [

2026. 1540. SCORZONERA foliis laciniatis, caule erecto. *T. Inſt.* 477. Tragopogon laciniatis foliis. *Col. Phyt.* 2, 21. [Scorzonera *laciniata.*

2027. 2142. —— *tingitana*, foliis omnibus runcinatis amplexicaulibus. *Linn.*

2028. 1943. SCROPHULARIA aquatica major. *C. B. P.* 235. Betonica aquatica. *Ger.* 579. *Off.* 441. [Scrophularia *aquatica.*

2029. 641. —— flore luteo. *C. B. P.* 236. [Scrophularia *vernalis.*

2030. { 642. / 1290. } —— folio urticæ. *C. B. P.* 236. Scrophularia peregrina. *Cam. Hort. Ic.* 43. [Scrophularia *peregrina.*

2031. 1288. —— hiſpanica, ſambuci folio glabro. *T. Inſt.* 166. [Scrophularia *ſambuciſolia.*

2032. 643. —— lamii folio. *D. Bobart.* [

2033. 1541. —— luſitanica fruteſcens, verbenacæ foliis. *T. Inſt.* 167. Scrophularia foliis lanceolatis obtuſis

ſerratis dentatis, pedunculis bifidis. *Roy. Fl. Leyd. Prodr.* 294. [Scrophularia *fruteſcens.*

2034. 1942. — major. *Park.* 610. Scrophularia nodoſa fœtida. *C. B. P.* 235. *Off.* 440. [Scrophularia *nodoſa.*

2035. 1289. — maxima luſitanica, ſambuci folio lanuginoſo. *T. Inſt.* 166. [Scrophularia *ſambuciſolia. b.*

2036. 644. — nemorenſis, folio urticæ rugoſo, flore atropunicante. *H.C.Boerh. Ind. Alt.* 234. [Scrophularia *coccinea?*

2037. 1491. — orientalis, chryſanthemi folio, flore minimo variegato. *T. Cor.* [Scrophularia *trifoliata?*

2038. 645. — orientalis, foliis cannabinis. *T. Cor.* 9. [Scrophularia *orientalis.*

2039. 1387. — ruta canina dicta vulgaris. *C. B. P.* 236. [Scrophularia *canina.*

2040. { 646. / 1386. } — ſaxatilis lucida, laſerpitii maſſilienſis foliis. *Bocc. Muſ.* 166. Scrophularia, foliis filicis modo laciniatis, vel ruta canina latifolia. *C. B. P.* [Scrophularia *lucida.*

2041. 647. — ſcorodoniæ folio. *Mor. Hiſt. Ox.* 482. [Scrophularia *Scorodonia.*

2042. 2490. SCUTELLARIA *albida*, foliis ſubcordatis ſerratis rugoſis opacis, ſpicis ſecundis, bracteis ovatis,

Linn. Scutellaria teucrii facie, flore albo. *J. B.* 3, 291.

2043. 1346. — foliis cordato-lanceolatis ſerratis, pedunculis multifloris. *Flor. Leyd.* [Scutellaria *lateriflora.*

2044. 43. SECURIDACA lutea major. *C. B. P.* 348. [Coronilla *Securidaca.*

2045. 190. SENECIO ægyptius, folio matricariæ. *Boerh. Ind.* 1, *p.* 40. [

2046. 897. — americanus, folio haſtato, nitidè ſerrato. *Rand.* [

2047. 1838. — corollis radiantibus, foliis crenatis, infimis cordatis petiolatis, ſuperioribus pinnatifidis lyratis. *Flor. Virg.* [Senecio *aureus.*

2048. 2344. — *hieracifolius*, corollis nudis, foliis amplexicaulibus laceris, caule herbaceo erecto. *Linn.* Senecio americanus altiſſimus, blattariæ ſeu hieracii folio. *Herm. Par.* 226, *t.* 226.

2049. 1694. — maderaſpatanus, rapi folio, floribus maximis, cujus radix à nonnullis china dicitur. *Muſ. Pet. N°.* 680. *H. Elth. t.* 258, *f.* 335. [Senecio *Pſeudo-china.*

2050. 249. — virginianus, arboreſcens, atriplicis folio. *Par. Bat.* 225. [Baccharis *halimifolia.*

2051. 942. SENNA italica, ſive foliis obtuſis. *C. B. P.* [Caſſia *Senna. b.*

2052. 289. — ſpuria, arborea, ſpinoſa, foliis alatis ramoſis, ſeu decom-

positis ; flore ex luteo & rubro specioso. *Sloan. Hist.* 2, 49. [Poinciana *pulcherrima.*

2053. 2345. SERAPIAS *latifolia*, bulbis fibrosis, foliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. *L.* Serapias latifolia, bulbis fibrosis, nectarii labio crenato obtuso, petalis æquali, fructibus pendulis. *Hudſ. Angl.* 341. Helleborine altera, atrorubente flore. *Raii Syn.* 383.

2054. {2140. 2346.} — *longifolia*, bulbis fibrosis, foliis ensiformibus sessilibus, floribus pendulis. *Linn.* Serapias palustris, bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso crenato petalis æquali, fructibus pendulis. *Hudſ. Angl.* 341. Helleborine palustris nostras. *Raii Syn.* 283.

2055. 2396. SERIOLA *æthnensis*, hispida, foliis obovatis subdentatis. *L.* Hieracium multicaule, bellidis folio molli. *Bocc. App.* 8.

2056. 995. SERPYLLUM odoratissimum glabrum, longiore folio. *Amm. p.* 52. [Thymus *Serpillum. f.*

2057. 1839. SERRATULA. *C. B. P.* 235. Jacea nemorensis, quæ serratula vulgò. *T. Inst.* 444. [Serratula *tinctoria.*

2058. {193. 194.} — annua, seminibus nitidissimis ad basim compressis. *Rand.* Se-

necio carduus apulus. *Col. p.* 1, 32. Serratula annua, feminibus nitidiſſimis majoribus, & minimè compreſſis. Crupina belgarum vulgò. *Rand.* [Centaurea *Crupina.*

2059. 1840. —— foliis oblongo-ovatis, obtusè dentatis, caule ramoſo patulo, calycibus ſubrotundis mollibus. *Mill. Dict.* [Serratula *glauca?*

2060. 844. —— marilandica, foliis glaucis, cirſii inſtar denticulatis. *H. Elth.* 354. [Serratula *glauca.*

2061. 1746. —— noveboracenſis, maxima, foliis longis ſerratis. *H. Elth.* 355. [Serratula *noveboracenſis.*

2062. {2182. 2347.} —— *ſcarioſa*, foliis lanceolatis integerrimis, calycibus ſquarroſis pedunculatis obtuſis lateralibus. *Linn.* Eupatorio affinis americana bulboſa, floribus ſcarioſis, capitulis contextis. *Pluk. Phyt.* 142, *t.* 177, *f.* 4.

2063. 2491. —— *ſpicata*, foliis linearibus baſi ciliatis, floribus ſeſſilibus lateralibus ſpicatis, caule ſimplici. *Linn.* Jacea anguſtifolia, tuberoſâ radice, virginiana. *Pluk. Alm. t.* 424, *f.* 6.

2064. 2397. SESELI *annuum*, petiolis rameis membranaceis ventricoſis emarginatis. *Linn.* Fœniculum ſylveſtre, annuum, tragoſelini

odore, umbellâ albâ. *Vaill. Par.* 54, *t.* 9, *f.* 4.

2065. 1592. — *montanum*, petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliis caulinis anguſtiſſimis. *Linn.* Fœniculum ſylveſtre elatius, ferulæ folio longiori. *T. Inſt.* 311.

2066. 1887. — *tortuoſum*, caule alto rigido, foliolis linearibus faſciculatis. *Linn.* Œnanthe ſtriata rigida. *H. Cliff.* 99.

2067. 1347. SHERARDIA. *Dill. Cat. Giſſ. p.* 96. [Sherardia *arvenſis.*

2068. 545. — nodiflora, ſtæchados ſerratæ foliis. *D. Vaill.* [Verbena *ſtæchadifolia.*

2069. 546. — repens nodiflora, ſubrotundo folio. *D. Houſt.* [Verbena *nodiflora.*

2070. 547. — ſpicata annua, flore cœruleo, foliis anguſtis & ſerratis. *D. Houſt.* [

2071. 250. — teucrii folio, flore purpureo. *Vaill. Diſc. p.* 49. Verbena folio ſubrotundo, ſerrato, flore cœruleo. *Sloan. Hiſt.* 1, *p.* 171, *t.* 107, *f.* 1. [Verbena *jamaicenſis.*

2072. 2183. SIBBALDIA *procumbens*, foliolis tridentatis. *Linn.* Pentaphylloides pumila, foliis ternis ad extremitates trifidis. *Raii Syn.* 256.

Fragariæ ſylveſtri affinis planta, flore luteo. *Sibb. Pr. Hiſt. Nat. Scot. P.* 2, *p.* 25, *t.* 6, *f.* 1.

2073. 2036. SIBTHORPIA *europæa*, foliis reniformi-ſubpeltatis crenatis. *L.* Chryſoſplenium cornubienſe. *Petiv. Herb. tab.* 6, *f.* 11.

2074. 2492. —— peregrina, foliis reniformibus crenatis, pedunculis geminis. *Linn. Sp. Pl.* 2. Planta anonyma. *Pluk. Phyt. t.* 257, *f.* 5. [Diſandra *proſtrata.*

2075. 1492. SICYOIDES americana, fructu echinato, foliis angulatis. *T. Inſt.* 103. [Sicyos *angulata.*

2076. 1493. SIDA foliis crenatis, inferioribus cordatis obtuſis, ſuperioribus acuminatis. *Wilm.* [

2077. 2288. —— *indica*, foliis cordatis ſublobatis, ſtipulis reflexis, pedunculis petiolo longioribus, capſulis multilocularibus ſcabris, calyce longioribus. *Linn.* Abutilon indicum. *Comm. Hort.* 11, *f.* 1.

2078. 2037. —— tomentoſa, foliis cordatis ſerratis ſubtùs nervoſis. *Wilm.* [

2079. 191. SIDERITIS arvenſis latifolia glabra. *C. B. P.* 233. [Stachys *annua.*

2080. 393. —— cretica, viſcoſa, bitumen olens. *Zan.* 186. [Stachys *glutinoſa.*

2081. 1441. —— hiſpanica fruteſcens, ſeu lignoſior. *T. Inſt.* 192. [Sideritis *incana ?*

2082. 1388. —— orientalis, phlomidis folio. *T. Cor.* [Sideritis *perfoliata.*

2083. 943. —— romana, utriculis ſpinoſis. *H. L. Bat.* [Sideritis *romana.*

2084. 2348. —— *ſcordioides*, foliis lanceolatis ſubdentatis ſuprà glabris, bracteis ovatis dentato-ſpinoſis, calycibus æqualibus. *Linn.*

2085. 192. —— vulgaris hirſuta erecta. *C. B. P.* 233. [Stachys *recta.*

2086. 2542. SIGESBECKIA *orientalis*, petiolis ſeſſilibus, calycibus exterioribus linearibus majoribus patentibus. *Linn.* Bidenti ſimilis, foliis latiſſimis ſerratis. *Buxb. Cent.* 3, *p.* 29, *t.* 52.

2087. 2543. SILENE *acaulis*, acaulis depreſſa, petalis emarginatis. *L.* Muſcus alpinus, lychnidis flore. *J. B.* 3, *p.* 767.

2088. 1888. —— floribus faſciculatis, calycibus tomentoſis. *Fl. Virg.* [

2089. 1889. —— foliis quaternis. *Fl. Virg.* Lychnis caryophilleus virginianus, gentianæ foliis glabris, 4 ex ſingulis geniculis caulem amplexantibus, flore amplo fimbriato. *Raii Hiſt.* 2, *p.* 1895. [Cucubalus *ſtellatus.*

2090. 2290. —— *polyphylla*, foliis faſciculatis ſetaceis : ramorum florentium oppoſitis. *Linn.* Lychnis ſylveſtris VIII. *Cluſ. Hiſt.* 1, *p.* 290.

2091. 2184. — *quinquevulnera*, petalis integerrimis ſubrotundis, fructibus erectis alteruis. *Linn.* Lychnis ſylveſtris, lanuginoſa minor. *C. B. P.* 206. Lychnis hirſuta, flore eleganter variegato. *Raii Hiſt.* 997.

2092. 2185. — *valleſia*, caulibus ſubunifloris decumbentibus, foliis lanceolatis tomentoſis longitudine calycis. *Linn.* Lychnis maritima pinguis, è Corſicâ. *Bocc. Muſ. t.* 34.

2093. 1890. SILER *montanum*, foliis aquilegiæ. *Mor. Hiſt.* 3, 276. Angelica montana perennis, aquilegiæ folio. *T. Inſt.* 313. [Laſerpitium *trilobum.*

2094. 1144. SILIQUA edulis. *C. B. P.* & *off.* [Ceratonia *Siliqua.*

2095. 1695. SILIQUASTRUM, flore purpureo. *Caſt. Dur.* 415. Arbor Judæ. *Dod.* 786. [Cercis *Siliquaſtrum.*

2096. 2289. SILPHIUM *perfoliatum*, foliis oppoſitis deltoidibus petiolatis perfoliatis, caule tetragono lævi. *Linn.*

2097. { 743. / 2399. } SINAPIS *erucoides*, ſiliquis lævibus æqualibus, foliis lyratis oblongis glabris, caule ſcabro. *Linn.* Eruca ſylveſtris, flore albo,

italica. *Barr. Ic.* 132. Sinapi hiſpanicum pumilum album. *T. Inſt.* 227.

2098. 2398. —— *lævigata*, ſiliquis lævibus patulis, foliis lyratis glabris, ſummis lanceolatis, caule lævi. *L.*

2099. 548. SINAPISTRUM americanum, ſpinoſum, flore carneo, foliis trifidis & quinquefidis. *D. Houſt.* [Cleome *ſpinoſa ?*

2100. 1389. —— luſitanicum, triphyllum, flore rubro, ſiliquis corniculatis. *H. L.* [Cleome *violacea.*

2101. 1945. SISARUM germanorum. *C. B. P.* 155. *Off.* 456. [Sium *Siſarum.*

2102. 1696. SISON *canadenſe*, foliis ternatis. *L.* Myrrhis canadenſis trilobata. *Mor. Hiſt. p.* 3, 301.

2103. 2090. SISYMBRIUM *Irio*, foliis runcinatis dentatis nudis, caule lævi, ſiliquis erectis. *Linn.*

2104. 2291. —— *monenſe*, acaule, foliis pinnatodentatis ſubpiloſis, ſcapis lævibus. *Linn.*

2105. 1291. —— orientale, facie barbareæ, foliis plantaginis. *T. Cor.* 16. [Siſymbrium *barbareæ.*

2106. 2442. —— *Sophia*, petalis calyce minoribus, foliis decompoſito-pinnatis. *Linn.* Naſturtium ſylveſtre tenuiſſimè diviſum. *H. P.* 105.

2107. 1891. SISYRINCHIUM, foliis gladiolatis amplexicaulibus, pedunculis brevioribus. *Dict. Hort.* Bermudiana iridis folio, fibrosâ radice. *T. Inst.* 338. [Sisyrinchium *Bermudiana.*

2108. 744. SIUM aromaticum, sison officinarum. *T. Inst.* 308. Sison quod amomum officinis nostris. *C. B. P.* 154. [Sison *Amomum.*

2109. 1946. —— arvense, sive segetum. *T. Inst.* 308. Selinum si foliis. *Ger. Em.* 1018. [Sisum *segetum.*

2110. 898. —— umbellatum repens. *Ger. Em.* 256. [Sium *nodiflorum.*

2111. 1142. SMILAX humillima unifolia. *T. Inst.* [Convallaria *bifolia.*

2112. 1292. SMYRNIUM. *Matth.* 773. *Off.* 457. [Smyrnium *Olusatrum.*

2113. 1992. —— foliis caulinis ternatis petiolatis, foliolis oblongis ovatis integerrimis. *Fl. Virg.* [Smyrnium *integerrimum.*

2114. 693. SOLANUM americanum, glabrum, acinis puniceis, majoribus. *Rand.* [

2115. 1494. —— bahamense, papas floribus. *H. Elth.* [Solanum *bahamense?*

2116. 2186. —— *bonariense*, caule subinermi fruticoso, foliis ovato-oblongis sinuato-repandis scabris. *Linn.* Solanum bonariense arboresc-

cens, papas floribus. *Dill. Elth.* 364, *t.* 272, *f.* 351.

2117. {1593. 2039.} —— *campechienſe*, caule aculeato hirto, foliis cordato-oblongis quinquelobis : ſinubus obtuſis elevatis. *Linn.* Solanum campechianum, calycibus echinatis. *H. Elth.* 360.

2118. 2038. —— caule aculeato, foliis pinnato-ſinuatis, fructu racemoſo. Schiru ſchuna. *Hort. Mal.* 2, *t.* 36. [

2119. 1991. —— caule herbaceo erecto inermi, foliis ovato-lanceolatis, anguloſo-dentatis, floribus lateralibus. *Mill. Dict.* [

2120. 2093. —— caule inermi herbaceo erecto, foliis ovatis integris glabris, umbellis axillaribus. *Wilm.* [

2121. 1944. —— caule inermi ſubfruticoſo, foliis oblongo-ovatis, ſinuatis, utrinque glabris, floribus alaribus. *Mill. Ic.* [Solanum *macrocarpon.*

2122. 2292. —— *ferox*, caule aculeato herbaceo, foliis cordatis angulatis tomentoſis aculeatis, baccis hirtis calyce obtectis. *Linn.*

2123. 899. —— fruticoſum africanum, lauri foliis. *Rand.* [

2124. 793. —— fruticoſum bacciferum. *C. B. P.* [Solanum *Pſeudocapſicum.*

2125. 694. —— guineenſe; fructu ceraſi nigri formâ

formâ & magnitudine. *D. Juſſ.* [

2126. 688. — hortenſe, ſinuatis foliis; acinis ſaturatè virentibus. *Rand.* [

2127. 2187. — *indicum*, caule aculeato fruticoſo, foliis cuneiformibus angulatis ſubvilloſis integerrimis: aculeis utrinque rectis. *Linn.* Solanum indicum ſpinoſum, flore boraginis. *Robert. Ic.* 28. *Dill. Elth.* 362, *t.* 270, *f.* 349.

2128. 689. — nigricans, hortenſi ſimile, elatius, virginianum, flore foris purpuraſcente. *Rand.* [

2129. 690. — nigricans, hortenſi ſimile, minore flore & fructu; ex inſulâ Tobago. *Rand.* [

2130. { 691. / 692. } — officinarum; acinis luteis. *C. B. P.* 166. Solanum officinarum; acinis puniceis. *C. B. P.* 166. [Solanum *nigrum.*

2131. 2294. — *ſodomœum*, caule aculeato fruticoſo tereti, foliis pinnatifido-ſinuatis ſparsè aculeatis nudis, calycibus aculeatis. *Linn.* Solanum ſpinoſum, profundè laciniatis foliis, ſubtùs lanuginoſis, maderaſpatanum. *Pluk. t.* 316, *f.* 4. *?*

2132. 1644. — ſpiniferum fruteſcens, ſpinis igneis, americanum. *Pluk. Phyt.* 225, *f.* 5. [Solanum *igneum.*

2133. 2293. —— *virginianum*, caule aculeato angulato, foliis pinnatifidis undique aculeatis: laciniis ſinuatis obtuſis; calycibus aculeatis. *L.* Solanum americanum laciniatum ſpinoſiſſimum. *Dill. H. Elth.* 360, *t.* 267, *f.* 346.

2134. 1594. SOLDANELLA *alpina. Linn.* Alpina rotundifolia. *C. B. P.* 295.

2135. 2040. SOLIDAGO caule paniculato, racemis confertis, foliis inferioribus lineari-lanceolatis petiolatis, caulinis ſeſſilibus glabris. *Dict. Hort.* [

2136. 1892. —— paniculata, racemis recurvatis, floribus erectis, foliis lanceolatis integerrimis glabris. *Mill. Ic.* [Solidago *ſempervirens?*

2137. 2295. —— *rigida*, foliis caulinis ovatis ſcabris integerrimis, ramis alternis faſtigiatis, corymbis terminalibus. *Linn.* Virga aurea Novæ Angliæ, lato rigidoque folio. *Herm. Par.* 243, *tab.* 243.

2138. 1595. SONCHUS, floribus ſolitariis, foliorum laciniis extrorsùm flexis. *H. Cliff.* Sonchus tingitanus, papaveris folio. *T. Inſt.* 475. [Scorzonera *tingitana.*

2139. 287. —— lævis in plurimas & tenuiſſimas lacinias diviſus. *C. B. P.* 124. [Sonchus *tenerrimus.*

2140. 1442. —— luſitanicus, aſplenii folio. *Wilm.* [

2141. {1348. 2296.} —— *maritimus*, pedunculo nudo, foliis lanceolatis amplexicaulibus indiviſis retrorsùm argutè dentatis. *Linn.* Sonchus maritimus anguſtifolius. *C. B. P.* Sonchus anguſtifolius maritimus. *Pluk. Phyt. t.* 62, *f.* 5.

2142. {2143. 2188.} SOPHORA *alopecuroides*, foliis pinnatis: foliolis numeroſis villoſis oblongis, caule herbaceo. *Linn.* Ervum orientale alopecuroides perenne, fructu longiſſimo. *T. Cor.* 27. *Dill. Elth.* 136.

2143. 1294. SORBUS ſativa. *C. B. P.* 415. *Off.* 464. [Sorbus *domeſtica.*

2144. 1893. —— ſylveſtris, foliis domeſticæ ſimilis. *C. B. P.* 415. Sylveſtris ſive fraxinus bubula. *Ger.* 1290. [Sorbus *aucuparia.*

2145. 1697. SPARTIUM alterum monoſpermum, ſemine reni ſimili. *C. B. P.* 396. [Spartium *ſphærocarpon.*

2146. 1841. —— ramis oppoſitis angulatis, foliis oppoſitis ſubulatis. *L. Sp.* 708. [Spartium *radiatum.*

2147. 549. SPERGULA quæ alſine ſaxatilis & multiflora; capillaceo folio. *T. Inſt.* 243. [Arenaria *ſaxatilis.*

2148. {591. 2297.} SPERMACOCE *tenuior*, glabra, foliis linearibus, ſtaminibus incluſis, floribus verticillatis. *L.* Sper-

macoce verticillis tenuioribus. *Dill. H. Elth.* 370, *t.* 277, *f.* 359.

2149. 2041. SPIGELIA *Anthelmia*, caule herbaceo, foliis ſummis quaternis. *Linn.*

2150. 288. SPINACIA cretica ſupina; capſulâ ſeminis aculeatâ. *T. Inſt.* 533. [Spinacia *oleracea.*

2151. 1842. SPIRÆA africana odorata, foliis piloſis. *Com. Rar.* 3. [Dioſma *hirſuta.*

2152. 1248. —— hiſpanica, hyperici crenato folio. *T. Inſt.* [Spiræa *crenata.*

2153. 1145. —— hyperici folio. *T. Inſt.* Hypericum frutex. *Mill.* [Spiræa *hypericifolia.*

2154. 1146. —— opuli folio. *T. Inſt.* [Spiræa *opulifolia.*

2155. 1147. —— ſalicis folio. *T. Inſt.* Spiræa frutex. *Mill.* [Spiræa *ſalicifolia.*

2156. 1390. STACHYS alba. *Mich.* [Stachys *palæſtina?*

2157. 1092. —— canarienſis fruteſcens, verbaſci folio. *T. Inſt.* [Sideritis *cretica.*

2158. 89. —— cretica. *C. B. P.* 236. [Stachys *cretica.*

2159. 90. —— cretica, foliis ſub verticillis latioribus, acuminatis, flore majore. *Rand.* [

2160. 94. —— elatior, flore flaveſcente punctato. *Rand.* [

2161. 92. —— folio obſcurè virente ; flore ferrugineo. *H. Ox.* 3, 382. [Stachys *paluſtris*.

2162. 1443. —— lychnitis. *Cluſ.* [

2163. 91. —— major germanica. *C. B. P.* 236. [Stachys *germanica*.

2164. 93. —— ſalviæ folio, flore luteo. *D. Juſſ.* [Stachys *maritima*.

2165. 2493. STAPHYLEA *pinnata*, foliis pinnatis. *Linn.* Piſtacia ſylveſtris. *C. B. P.* 401.

2166. 1391. STAPHYLODENDRON virginianum triphyllum. *T. Inſt.* 616. [Staphylea *trifolia*.

2167. 1198. STATICE foliis anguſtioribus, flore rubro. *Boerh.* [

2168. 1392. —— luſitanica, ſcorzoneræ folio. *T. Inſt.* 341. [Statice *Pſeudarmeria*.

2169. 2144. —— *ſpecioſa*, ſcapo dichotomo ancipiti, foliis ovatis mucronatis, floribus aggregatis. *Linn.*

2170. 996. STÆCHAS citrina anguſtifolia. *C. B. P.* [Gnaphalium *Stœchas*.

2171. 1542. —— folio ſerrato. *C. B. P.* 216. Lavendula foliis crenatis. *T. Inſt.* 198. [Lavandula *dentata*.

2172. 1199. —— purpurea. *Off. & C. B. P.* [Lavandula *Stœchas*.

2173. 487. STRAMONIUM ægyptiacum, flore intùs albo, foris violaceo. *T. Inſt.* 119. [Datura *faſtuoſa*.

2174. 1843. —— americanum maximum, flore albo, fructu rotundo ſpinoſo. *T. Inſt.* [Datura *Metel?*

2175. 488. —— ferox. *Bocc. Rar.* 50. [Datura *ferox.*

2176. 645. —— foliis ſubrotundis & denticulatis. *Rand.* [Datura *Tatula?*

2177. 1894. STYRAX folio mali cotonei. *C. B. P.* 452. *Off.* 473. [Styrax *officinale.*

2178. 2443. SWERTIA *perennis*, corollis quinqueſidis, foliis radicalibus ovalibus. *Linn.* Gentiana paluſtris latifolia. *C. B. P.* 188.

2179. 592. SYMPHORICARPOS, foliis alatis. *H. Elth.* 371, *t.* 278. [Lonicera *Symphoricarpos.*

2180. 1543. SYMPHYTUM conſolida major, flore purpureo. *C. B. P.* 259. Symphytum magnum. *J. B.* 3, 593. [Symphytum *officinale.*

2181. 1295. —— majus, tuberosâ radice. *C. B. P.* 259. [Symphytum *tuberoſum.*

2182. 2444. SYRINGA *laciniata*, foliis lanceolatis integris diſſectiſque. *Linn.* Lilac laciniato folio. *Mill. Dict. p.* 163.

2183. 2445. —— *vulgaris*, foliis ovato-cordatis integris. *Linn.* Lilac flore ſaturatè purpureo. *Mill. Dict. p.* 163.

T

2184. 1095. TACAMAHAC foliis ſerratis. *Pluk. Phyt.* 228, *f.* 2. [Populus *balſamifera.*

2185. 1148. TAGETES minor, flore ſimplici ſtriato. *Mill.* [

2186. 1093. TAMARISCUS latiore folio. *Park.* Tamariſcus germanica. *Lob.* [Tamarix *germanica.*

2187. 1094. —— tenuiore folio. *Park.* Tamariſcus narbonenſis. *Lob.* [Tamarix *gallica.*

2188. 593. TANACETUM africanum arboreſcens, foliis lavendulæ, multifido folio. *Hort. Amſt.* 2, *p.* 201. [Tanacetum *fruteſcens.*

2189. 1495. —— africanum fruticans multiflorum, &c. *Com. H. Amſt.* [Tanacetum *ſuffruticoſum?*

2190. 2349. —— *annuum*, foliis bipinnatifidis linearibus acutis, corymbis tomentoſis. *Linn.* Abſynthium corymbiferum annuum. *T. Inſt.* 458.

2191. 1097. —— foliis criſpis. *C. B. P.* [Tanacetum *vulgare. b. criſpum.*

2192. 1096. —— vulgare luteum. *C. B. P.* [Tanacetum *vulgare.*

2193. 2494. TAXUS *baccata*, foliis approximatis. *Linn.* Taxus *C. B. P.* 505.

2194. 594. TELEPHIOIDES græca humifusa, flore albo. *T. Cor.* 50. [Andrachne *Telephioides.*

2195. 1645. TELEPHIUM Dioscoridis. *Imperati.* Telephium repens, folio non deciduo. *C. B. P.* 287. [Telephium *Imperati.*

2196. 1698. TETRAGONIA foliis linearibus. *Flor. Leyd.* Tetragonocarpos africana fruticans, foliis longis & angustis. *H. Amst.* 2, 205. [Tetragonia *frutescens.*

2197. 1699. —— foliis ovatis. *Fl. Leyd.* Tetragonocarpos africana, radice magnâ crassâ & carnosâ. *H. Amst.* 203. [Tetragonia *herbacea.*

2198. 195. TEUCRIUM bœticum. *Clus. Hist.* 229. [Teucrium *fruticans.*

2199. { 196. / 695. } —— bœticum humilius & ramosius, folio subrotundo. *Rand.* Teucrium hispanicum, latiore folio. *T. Inst.* 208. [Teucrium *latifolium.*

2200. 2400. —— *Chamæpitys*, foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso. *Linn.* Chamæpitys lutea vulgaris, folio trifido. *C. B. P.* 249.

2201. 2495. —— *hircanicum*, foliis cordato-oblongis obtusis, caule brachiato dichotomo, spicis longissimis

terminalibus ſeſſilibus ſpiralibus. *Linn.* Teucrium foliis cordatis crenatis petiolatis, ſpicis oblongis denſiſſimis. *Arduin. Sp.* 13, *t.* 4.

2202. 2145. —— *lucidum*, foliis ovatis acutè inciſo-ſerratis glabris, floribus axillaribus ternis, caule erecto lævi. *Linn.*

2203. 1596. —— *montanum*, corymbo terminali: foliis lanceolatis integerrimis ſubtùs tomentoſis. *Linn.* Polium lavendulæ folio. *C. B. P.* 220.

2204. 2496. —— *Scordium*, foliis oblongis ſeſſilibus dentato-ſerratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuſo. *Linn.* Scordium. *C. B. P.* 247.

2205. 2042. —— *Scorodonia*, foliis cordatis ſerratis petiolatis, racemis lateralibus ſecundis, caule erecto. *L.*

2206. 2544. —— *virginicum*, foliis ovatis inæqualiter ſerratis, racemis terminalibus. *Linn.*

2207. 1796. THALICTRUM alpinum, aquilegiæ foliis. *T. Inſt.* [Thalictrum *aquilegifolium.*

2208. 1795. —— canadenſe majus, caulibus viridantibus. *Boerh.* [Thalictrum *Cornuti.*

2209. 1794. —— majus non ſtriatum. *C. B. P.* 336. [Thalictrum *flavum?*

2210. 1793. —— majus, ſiliquâ angulosâ aut

ſtriatâ. *C. B. P.* 336. [Thalictrum *flavum.*

2211. 1747. —— minus. *C. B. P.* 337. Thalictrum minus, ſeu rutæ pratenſis genus minus, ſemine ſtriato. *J. B.* 3, 487. [Thalictrum *minus.*

2212. {1646.} {2096.} —— minus alterum pariſienſium, foliis craſſioribus & lucidis. *H. R. P.* Thalictrum caule folioſo ſulcato, foliis linearibus carnoſis. *Dalib. Par.* 162. [Thalictrum *lucidum.*

2213. 1797. —— minus, aſphodeli radice, magno flore. *T. Inſt.* 271. [Thalictrum *tuberoſum.*

2214. 846. THAPSIA latifolia villoſa. *C. B. P.* 348. [Thapſia *villoſa.*

2215. 1895. —— montana, omnium maxima, foliis lobatis, umbellis luteis. *Mich. H. Flor.* [

2216. 2189. THELIGONUM *Cynocrambe. Linn.* Cynocrambe Dioſcoridis. *C. B. P.* 122. *Prod.* 59, *t.* 59.

2217. 1597. THEVETIA. *H. Cliff.* Ahovai major. *Pis.* [Cerbera *Ahovai.*

2218. 944. THLASPI. *Off.* Thlaſpi arvenſe, ſiliquis latis. *C. B. P* 105. [Thlaſpi *arvenſe.*

2219. 1200. —— amarum arvenſe umbellatum. *J. B.* [Iberis *amara.*

2220. 943. —— arvenſe minus luteum. *Park.* [

2221. 197. —— arvenſe, vaccariæ incano folio,

majus. *C. B. P.* 206. [Thlaſpi *campeſtre.*

2222. 1098. — creticum purpureum. *Park.* [Iberis *linifolia ?*

2223. 44. — halimi folio, ſempervirens. *H. L. Bat.* Alyſſon. *T. Inſt.* 217. [Alyſſum *halimifolium.*

2224. 1544. — montanum, ſempervirens. *C. B. P.* 106. Iberis fruteſcens, foliis linearibus acutis integerrimis. *Linn.* [Iberis *ſempervivirens.*

2225. 198. — vaccariæ incano folio minus. *C. B. P.* 206. [Thlaſpi *campeſtre. b.*

2226. 1393. — virginianum iberidis foliis amplioribus & ſerratis. *T. Inſt.* [

2227. 696. THLASPIDIUM apulum, ſpicatum. *T. Inſt.* 215. [Biſcutella *apula.*

2228. 794. — fruticoſum; leucoii folio; ſemper florens. *T. Inſt.* 214. Thlaſpi fruticoſum, perſicum, foliis keiri, flore odorato. *Zanon.* 196. [Biſcutella *ſempervirens.*

2229. 1798. THUJA *orientalis*, ſtrobilis ſquarroſis, ſquamis acuminatis reflexis. *Linn.*

2230. 1249. — Theophraſti. *C. B. P.* [Thuia *occidentalis.*

2231. 1496. THYMBRA legitima. *Cluſ. Hiſt.* 358. [Satureia *Thymbra.*

2232. 1497. — Sancti Juliani, ſive ſatureia vera. *Lob. Ic.* 425. [Satureia *julianæ*

2233. 2497. THYMUS *acinos*, floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis. *Linn.* Clinopodium arvenſe, ocymi facie. *C. B. P.* 225.

2234. 2498. — *Serpyllum*, floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis. *Linn.* Serpyllum foliis citri odore. *C. B. P.* 220.

2235. 2499. — *vulgaris*, erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-ſpicatis. *Linn.* Thymus vulgaris, folio tenuiore. *C. B. P.* 219.

2236. 745. TILIA caroliniana, foliis acuminatis. *Rand.* [Tilia *americana?*

2237. 1844. — foliis molliter hirſutis, viminibus rubris, fructu tetragono. *Raii Syn.* 2, 316. Tilia hirſuta coryli foliorum æmula; fructu anguloſo. *Pluk. Mant.* 181. [Tilia *Europæa. e.*

2238. 489. TITHYMALUS americanus haſtato folio, pediculum versùs contractiore, & utrinquè ſinuato. *D. Houſt.* [

2239. 595. — americanus, ramoſiſſimus; ocimi minoris folio. *D. Houſt.* [

2240. 1896. — arboreus. *Alpini.* [Euphorbia *dendroides.*

2241. 1444. — arboreus altiſſimus, foliis ſali-

cis, caulibus rubentibus. *Boerh.* [Euphorbia *characias?*

2242. 491. — creticus, characias, anguſtifolius & incanus. *T. Cor.* 1. [Euphorbia *piloſa?*

2243. 490. — cypariſſias. *C. B. P.* 291. [Euphorbia *Cypariſſias.*

2244. 1897. — cypariſſius. *Alp. Exot.* [Euphorbia *aleppica.*

2245. 299. — erectus acris, parietariæ foliis glabris, floribus ad caulium nodos conglomeratis. *Sloan. Hiſt.* 1, 197, *t.* 126. [Euphorbia *hypericifolia.*

2246. 493. — foliis ſubrotundis non crenatis, peplus dictus. *Raii Syn.* [Euphorbia *Peplus.*

2247. 492. — helioſcopius. *C. B. P.* 291. [Euphorbia *helioſcopia.*

2248. 997. — juniperi folio. *Bocc.* [Euphorbia *Pithyuſa.*

2249. 494. — latifolius. *Rand.* An tithymalus latifolius hiſpanicus. *C. B. P.* 291? [Euphorbia *hyberna?*

2250. 2146. — linariæ folio, lunato flore. *Mor. H. R. Bl.* [Euphorbia *ſegetalis?*

2251. 1647. — maritimus. *C. B. P.* 291. Tithymalus paralius. *J. B.* 3, 674. [Euphorbia *Paralias.*

2252. 495. — maritimus, minor, portlandicus, D. Stoneſtreet. *Raii Syn. Ed.* 3, 313, *t.* 24, *f.* 6. [Euphorbia *portlandica.*

2253. 496. — myrſinites latifolius. *C. B. P.* 290. [Euphorbia *myrſinites.*

2254. 1700. — orientalis, ſalicis folio, caule purpureo, flore magno. *T. Cor.* 2. [Euphorbia *orientalis.*

2255. 497. — tuberoſa, pyriformi radice. *C. B. P.* 272. [Euphorbia *Apios.*

2256. 498. — villoſus, folio lato & obtuſo, nervo medio inſigniter albicante. *Rand.* Tithymalus hibernicus. *Merr. Pin. Raii Syn.* 183. [Euphorbia *hiberna?*

2257. 1598. TORDYLIUM *apulum*, umbellulis remotis, foliis pinnatis, pinnis ſubrotundis laciniatis. *Linn.*

2258. 1446. — maximum. *T. Inſt.* 320. [Tordylium *maximum.*

2259. 1296. — minus, limbo granulato, ſyriacum. *Mor. Umb.* 37. [Tordylium *ſyriacum.*

2260. 1799. — narbonenſe minus. *T. Inſt.* 320. [Tordylium *officinale.*

2261. 300. TORMENTILLA reptans alata, foliis profundiùs ſerratis, D. Plot. *Raii Syn. Ed.* 2, 142. [Tormentilla *reptans.*

2262. 1947. — ſylveſtris. *C. B. P.* 326. *Off.* 489. [Tormentilla *erecta.*

2263. 1099. TRACHELIUM azureum umbelliferum. *Pon.* [Trachelium *cœruleum.*

2264. 1994. TRAGACANTHA. *T. Inſt.* 417. Maſſi-

lienſis. *J. B.* 1, 407. [Aſtragalus *Tragacantha.*

2265. 2545. TRAGOPOGON *Dalechampii*, calycibus monophyllis corollâ brevioribus inermibus, foliis runcinatis. *Linn.* Hieracium aſperum, flore magno dentis leonis. *C. B. P.* 127.

2266. 648. —— gramineo folio, ſuavè rubente flore. *Col.* 291. [Geropogon *hirſutum.*

2267. 1545. —— hirſutum. *C. B. P.* 274. Tragopogon apulum, humile, hirſutum, luteum. *Col. p.* 1, 233. [Scorzonera *hirſuta.*

2268. 649. —— luteum, foliis gramineis; caule purpuraſcente. *Boerh. Ind. Alt. p.* 90. [

2269. 1447. TRAGOSELINUM maximum auſtriacum, foliis inciſis. *Boerh.* [Pimpinella *magna ?*

2270. 2044. TRIANTHEMA foliis obovatis petiolatis, floribus ſeſſilibus, caulibus procumbentibus. *Wilm.* Trianthema. *Sauv. Meth.* 127. *Linn. Sp.* 223. [Trianthema *monogyna.*

2271. 2043. —— foliis ovatis petiolatis, floribus confertis ſeſſilibus, caule diffuſo. *Wilm.* [

2272. { 344. / 1393. } TRIBULUS terreſtris. *J. B.* 2, 352. Tribulus terreſtris, foliis cice-

ris, fructu aculeato. *C. B. P.* [Tribulus *terreſtris*.

2273. 345. — terreſtris, hexaphyllos, americanus. *Rand.* An tribulus terreſtris major ; flore maximo odorato. *Sloan. Hiſt.* 1, *p.* 209, *t.* 132, *f.* 1 ? [Tribulus *maximus ?*

2274. 795. TRICHOMANES, ſive polytrichum officinarum. *C. B. P.* 356. [Aſplenium *trichomanoides*.

2275. 1800. TRIDAX *procumbens*. *Linn.* After americanus procumbens, foliis laciniatis & hirſutis. *Houſt.*

2276. 346. TRIFOLIUM anguſtifolium ſpicatum. *J. B.* 2, 376. [Trifolium *anguſtifolium*.

2277. 347. — arvenſe, humile ſpicatum, ſive lagopus. *C. B. P.* 328. Foliis latioribus. Lagopodium lagopus. *Tab. Ic.* 524. [Trifolium *arvenſe*.

2278. 1648. — bitumen redolens. *C. B. P.* 327. [Pſoralea *bituminoſa*.

2279. 1649. — bitumen redolens, anguſtifolium. *Boerh. Ind. Alt.* 2, *p.* 32. Trifolium bituminoſum arboreum anguſtifolium ac ſempervirens. *H. Cath.* [Pſoralea *bituminoſa. b.*

2280. 1297. — clypeatum argenteum. *Alp. Exot.* 307. [Trifolium *clypeatum*.

2281,

2281. 1445. — globoſum repens. *C. B. P.* 329. [Trifolium *Cherleri.*

2282. 348. — lagopus dictum, anguſtioribus foliis. *Rand.* Lagopus. *Lob. Ic.* 39. [Trifolium *ſquarroſum?*

2283. 2094. — *Lupinaſter*, capitulis dimidiatis, foliis quinatis ſeſſilibus, leguminibus polyſpermis. *Linn.*

2284. 2446. — *Melilotus cœrulea*, racemis ovatis, leguminibus ſeminudis mucronatis, caule erecto, ſpicis oblongis. *Linn.* Lotus hortenſis odorata. *C. B. P.* 331.

2285. 2095. — *Melilotus indica*, leguminibus racemoſis nudis monoſpermis, caule erecto. *Linn.*

2286. 45. — peltatum creticum. *C. B. Prod.* 142. [Trifolium *Melilotus cretica.*

2287. 350. — pratenſe, folliculatum. *C. B. P.* 329. [Trifolium *reſupinatum.*

2288. 349. — pratenſe hirſutum majus, flore albo ſulphureo. *Raii Syn. Ed.* 2, 193. [

2289. {1298. 2546.} — *rubens*, ſpicis villoſis longis, corollis monopetalis, caule erecto, foliis ſerrulatis. *Linn.* Trifolium montanum, ſpicâ longiſſimâ rubente. *C. B. P.* 328.

2290. 1993. — ſpicis ſubvilloſis, laciniâ caly-

cum infimâ maximâ, caule fruticoſo, foliis ſubſeſſilibus. *L. Sp.* 770. [Pſoralea *bracteata.*

2291. 2191. TRIGONELLA *corniculata*, leguminibus pedunculatis congeſtis declinatis ſubfalcatis, pedunculo longo ſubſpinoſo, caule erecto. *Linn.* Melilotus corniculis reflexis major. *C. B. P.* 331.

2292. 1349. — leguminibus pedunculatis congeſtis, &c. *Hort. Upſ.* [Trigonella *platycarpos.*

2293. 2193. — *monſpeliaca*, leguminibus congeſtis ſeſſilibus arcuatis divaricatis inclinatis brevibus, pedunculo mucronato inermi. *Linn.* Fœnum græcum ſylveſtre polyceration minus, monſpeliacum. *Breyn. Cent.* 80, *t.* 33, *f.* 2.

2294. 2190. — *polycerata*, leguminibus ſubſeſſilibus congeſtis erectis ſubrectis longis linearibus, pedunculis muticis. *Linn.* Fœnum græcum ſylveſtre alterum polyceration. *C. B. P.* 348.

2295. 2192. — *ſpinoſa*, leguminibus ſubpedunculatis congeſtis declinatis falcatis compreſſis, pedunculis ſpinoſis breviſſimis. *Linn.* Fœnum græcum ſylveſtre polyceration creticum majus. *Breyn. Cent.* 79, *t.* 33, *f.* 1.

2296. 1845. TRILLIUM *cernuum*, flore pedunculato cernuo. *Linn.*

2297. { 596. / 597. } TURNERA fruteſcens, ulmi folio. *Plum. Nov. Gen. p.* 15. Turnera lycopi folio; flore ampliore. *Rand.* Ciſtus urticæ folio, flore luteo, vaſculis trigonis. *Sloan. Hiſt.* 1, *t.* 127, *f.* 4 & 5. [Turnera *ulmifolia.*

2298. 1299. TURRITIS annua verna, flore purpuraſcente. *T. Inſt.* 224. [Heſperis *verna.*

2299. 797. — leucoii folio. *T. Inſt.* 224. [Eryſimum *cheiranthoides.*

2300. 798. — leucoii folio, floribus ampliori-bus. *Rand.* [

2301. { 1150. / 2045. } — minor. *Bot. Monſp.* Turritis muralis hirſuta minor. *Mill.* [Turritis *hirſuta.*

2302. 796. — vulgaris ramoſa. *T. Inſt.* 224. Piloſella ſiliquata. *Thalii. Tab.* VIII. [Arabis *Thaliana.*

2303. 1995. TUSSILAGO vulgaris. *C. B. P.* 197. *Off.* 495. [Tuſſilago *Farfara.*

V

2304. 2046. VACCINIUM *Oxycoccos*, foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repentibus filiformibus nudis. *Linn.* Vitis idæa paluſtris. *C. B. P.* 471.

2305. 2196. VALANTIA *articulata*, floribus masculis quadrifidis, pedunculis dichotomis aphyllis, foliis cordatis. *L.* Cruciata orientalis latifolia, erecta, glabra. *T. Cor.* 4.

2306. 2197. —— *Cruciata*, floribus masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis. *Linn.* Cruciata hirsuta. *C. B. P.* 335.

2307. 2194. —— *hispida*, floribus masculis trifidis, germini hermaphroditici hispido insidentibus. *Linn.* Galium floribus masculis trifidis, omnibus plantæ partibus hispidis. *Zinn. Goet.* 233.

2308. 2195. —— *muralis*, floribus masculis trifidis germini hermaphroditici glabro insidentibus. *L.* Rubeola echinata saxatilis. *C. B. P.* 334. Cruciata muralis minima romana. *Col. Ecp.* 1, *p.* 298, *t.* 297. *Hist. Ox.* 3, 328, *s.* 9, *t.* 21, *f.* 2.

2309. 1448. VALERIANA lusitanica, latifolia annua laciniata. *T. Inst.* 132. [Valeriana *Calcitrapa. b.*

2310. 1100. —— major hortensis. *Mor.* Phu. *Off.* [Valeriana *Phu.*

2311. 1546. —— maxima pyrenaica, cacaliæ folio, D. Fagon. *T. Inst.* 131. [Valeriana *pyrenaica.*

2312. 1846. —— montana, subrotundo folio. *C. C. P.* 165. [Valeriana *montana.*

2313. 1948. — *fibirica*, floribus tetrandris æqualibus, foliis pinnatifidis, seminibus paleæ ovali adnatis. *L.*

2314. 2147. — sylvestris major altera, folio lucido. *H. R. P.* [Valeriana *officinalis.*

2315. 499. VALERIANELLA cornucopioides rubra. *Mor. Umb.* [Valeriana *Cornucopiæ.*

2316. 947. — semine stellato. *C. B. P.* [Valeriana *Locusta. c. coronata.*

2317. 1300. VELLA *annua*, foliis pinnatifidis, siliculis pendulis. *Linn.*

2318. 1949. VERATRUM, flore subviridi. *T. Inst.* 272. *Off.* 226. [Veratrum *album.*

2319. {2097. 2148.} — *nigrum*, racemo composito, corollis patentissimis. *Linn.*

2320. 1748. VERBASCUM fœmina, flore luteo magno. *C. B. P.* 329. [Verbascum *phlomoides.*

2321. 1547. — humile alpinum villosum, borraginis flore & folio. *T. Inst.* 147. Sanicula alpina, folio borraginis villosa. *C. B. P.* 243. [Verbascum *Myconi.*

2322. 697. VERBENA americana humilior, urticæ longiori folio; spicâ ferè simplici; flore albo. *Rand.* [

2323. 698. — americana, spicâ multiplici laxâ. *Rand.* An verbena caroliniana, melissæ folio aspero. *H. Elth.* 407? [Verbena *caroliniana?*

2324. 998. — anguſtifolia. *Mill.* [

2325. 847. — bonarienſis altiſſima, lavendulæ canarienſis ſpicâ multiplici. *H. Elth.* [Verbena *bonarienſis.*

2326. 699. — luſitanica, latifolia, procerior. *T. Inſt.* 200. [Verbena *officinalis. a.*

2327. {2098. 2547.} — *nodiflora*, tetrandra, ſpicis capitato-conicis, foliis ſerratis, caule repente. *Linn.* Verbena nodiflora. *C. B. P.* 269.

2328. {700. 1498.} — peregrina, foliis urticæ. *Dod. Mem.* Verbena urticæ foliis, canadenſis. *Cornut.* [Verbena *urticifolia.*

2329. {1150. 1449.} — tenuifolia. *C. B. P.* [Verbena *ſupina.*

2330. {1548. 2149.} VERONICA *auſtriaca*, racemis lateralibus, foliis lineari-lanceolatis pinnato-dentatis. *L.* Veronica auſtriaca foliis tenuiſſimè laciniatis. *T. Inſt.* 144. Chamædrys ſpuria tenuiſſimè laciniata. *J. B.* 3, 387.

2331. 1395. — cœrulea, trifido & quinquefido folio. *Fl. Bat.* [Veronica *triphyllos.*

2332. 2198. — *Chamædrys*, racemis lateralibus, foliis ovatis rugoſis dentatis ſeſſilibus, caule bifariàm piloſo. *Linn.* Chamædrys ſpuria minor rotundifolia. *C. B. P.* 249.

2333. 746. — cymbalariæ folio, verna. *T. Inſt.* 145. Alſine hederulæ folio. *C. B. P.* 250. [Veronica *hederifolia.*

2334. { 747. / 1898. } — floſculis oblongis pediculis inſidentibus, chamædryos folio. *Hiſt. Ox.* 2, 322. *Hort. L. Bat.* 622. [Veronica *agreſtis.*

2335. 450. — fruticoſa erecta dulcis, hexangulari caule; flore dilutè cœruleo. *Sloan. Cat. Jam.* 81. *Hiſt. t.* 108, *f.* 2. [Scoparia *dulcis.*

2336. 748. — mas ſupina & vulgatiſſima. *C. B. P.* [Veronica *officinalis.*

2337. 394. — minor alpina, ſerpylli folio. An Ponæ? [Veronica *fruticuloſa?*

2338. 2199. — *montana*, racemis lateralibus paucifloris, calycibus hirſutis, foliis ovatis rugoſis crenatis petiolatis, caule debili. *Linn.* Veronica chamædryoides, foliis pediculis oblongis inſidentibus. *Raii Syn.* 28. Chamædry ſpuriæ affinis, rotundifolia ſcutellata. *C. B. P.* 249.

2339. 47. — multicaulis pannonica. *T. Inſt.* 145. [Veronica *Chamædrys. c.*

2340. 1549. — orientalis minima, foliis laciniatis. *T. Cor.* 7. [

2341. 1396. — petræa ſempervirens. *Pon. Bald.* [Pæderota *Bonarota.*

2342. 1000. — ſpicata anguſtifolia. *C. B. P.* Aſſurgens ſive ſpicata. *Ger.*

Erecta anguſtifolia. *Park.* [Veronica *ſpuria.*

2343. 46. — ſpicata, hirſuta, folio ſubrotundo ſerrato. *Rand.* [

2344. 1599. — ſpicata, lanuginoſa & incana, floribus cæruleis. *Amm. Ruth.* [Veronica *incana.*

2345. 999. — ſpicata, latifolia major. *Park.* [Veronica *longifolia.*

2346. 2099. — ſpicis terminalibus, foliis oppoſitis lineari-lanceolatis, acutè ſerratis, caule erecto. *Wilm.* [

2347. 1397. — virginiana altiſſima, ſpicâ multiplici, floribus candidis. *Flor. Bat.* [Veronica *virginica.*

2348. 2350. VIBURNUM *dentatum*, foliis ovatis dentato-ſerratis plicatis. *Linn.*

2349. 1950. — foliis ovatis acuminatis ſerratis venoſis, petiolis lævibus. *Wilm.* [

2350. {2074. 2100.} — *Lentago*, foliis ovatis ſerrulatis acuminatis glabris, petiolis marginatis undulatis. *Linn.*

2351. 1899. — Matthioli. *C. B. P.* 249. [Viburnum *Lantana.*

2352. 1847. VICIA *biennis*, pedunculis multifloris, petiolis ſulcatis ſubdodecaphyllis; foliolis lanceolatis glabris. *Linn.*

2353. 95. — craccæ majori Gerardi ſimilis, per omnia minor, anglica. *R.* [

2354. 2548. — *Faba. b. minor*, caule erecto,

petiolis abſque cirrhis. *L.* Faba minor, ſive equina. *C.B.P.* 338.

2355. 1749. — *lutea*, leguminibus ſeſſilibus reflexis piloſis ſolitariis pentaſpermis, corollæ vexillis glabris. *Linn.* Vicia leguminibus ſolitariis, deorsùm flexis, hirſutis. *Sauv. Monſp.* 235.

2356. 96. — ſupina, latiſſimo folio non ſerrato. *T. Inſt.* 397. [Vicia *narbonenſis.*

2357. 97. — ſupina, latiſſimo folio ſerrato. *T. Inſt.* 397. [

2358. 99. — ſylvatica maxima. *Phyt. Brit.* 129. Vicia ſylvatica multiflora maxima. *Raii Syn.* 189. [Vicia *dumetorum.*

2359. 1848. — ſylvatica multiflora maxima, perennis, tetro odore, floribus albentibus lineis cœruleis ſtriatis. *Pluk. Alm.* 387. [Vicia *ſylvatica.*

2360. 1849. VINCA foliis oblongo-ovatis integerrimis, tubo floris longiſſimo, caule ramoſo fruticoſo. *Mill. Ic.* [Vinca *roſea.*

2361. 2447. — *major*, caulibus erectis, foliis ovatis, floribus pedunculatis. *Linn.* Clematis daphnoides major. *C. B. P.* 302.

2362. 2448. VIOLA *canina*, caule adultiore adſcendente, foliis oblongo-cordatis. *Linn.* Viola martia

inodora, ſylveſtris. *C. B. P.* 199.

2363. 2449. — *hirta*, acaulis, foliis cordatis piloſo-hiſpidis. *Linn.* Viola martia hirſuta inodora. *Mor. Hiſt.* 2, *p.* 475.

2364. 1350. — martia arboreſcens, purpurea. *C. B. P.* 199. [Viola *montana.*

2365. 1996. — montana lutea grandiflora, noſtras. *Raii Syn.* 3, 365. [Viola *calcarata.*

2366. 2500. — *odorata*, acaulis, foliis cordatis, ſtolonibus reptantibus. *L.* Viola martia purpurea, flore ſimplici odoro. *C. B. P.* 199.

2367. 50. VIRGA AUREA altiſſima ſerotina, paniculâ ſpeciosâ patulâ. *Rand.* [Solidago *canadenſis. c.*

2368. 397. — americana altiſſima anguſtifolia ſerotina, radice repente. *Rand.* [Solidago *altiſſima.*

2369. 396. — americana anguſtifolia media; paniculâ ſpeciosâ. *Rand.* [

2370. 49. — anguſtifolia, paniculâ ſpeciosâ, canadenſis. *H. R. P.* [Solidago *canadenſis.*

2371. { 199. / 200. } — canadenſis, aſteriſci folio. *Par. Bat.* Montana ſcrophulariæ folio. *Ic. Rob. Pluk. Phyt. t.* 235, *f.* 3. [Solidago *flexicaulis.*

2372. 48. — floribus fiſtuloſis, ſenecionis inſtar, foliis anguſtioribus non ſerratis. *Hiſt. Ox. p.* 3, 125. [

2373. 1499. —— foliis latioribus, in ſummis virgis albis ſpicatim diſpoſitis. *Wilm.*

2374. 398. —— humilis, foliis rigidis latis utrinque acuminatis. *Rand.* An virga aurea, folio hirſuto ſalicis rarò & leviſſimè ſerrato, caulibus atropurpureis. *Boerh. Ind. Alt.* 97? [

2375. 598. —— major, foliis glutinoſis & graveolentibus. *T. Inſt.* 484. [Erigeron *viſcoſum.*

2376. 848. —— marilandica cæſia glabra. *H. Elt.* 414. [Solidago *cæſia.*

2377. 395. —— mexicana. *C. B. P.* 517. Virga aurea limonii folio; paniculâ uno verſu diſpoſitâ. *H. R. P.* [Solidago *mexicana.*

2378. 400. —— minor, foliis ſerratis utrinque acuminatis. *Rand.* [

2379. 399. —— montana, folio anguſto ſubincano, floſculis conglobatis. *Rai Syn. Ed.* 2, 81. [Solidago *Virgaurea. c.*

2380. 849. —— Novæ Angliæ, lato rigidoque folio. *P. Bat.* [Solidago *rigida.*

2381. { 749. / 1650. } —— ſeu ſolidago procerior americana; caule multiplici. *Pluk. Phyt.* 235, *f.* 5. Virga aurea canadenſis foliis carnoſis non ſerratis latioribus. *H. Ox.* [Solidago *ſempervirens.*

2382. 750. —— virginiana annua. *Zan.* 205. [Erigeron *canadenſe.*

2383. 599. —— ulmi folio virginiana. *Rand.* Virga aurea americana aſpera, foliis brevioribus ſerratis. *H. Elth.* 411. [Solidago *canadenſis.* *e.*

2384. 850. —— vulgaris latifolia. *J. B.* 2, 1062. [Solidago *Virgaurea.*

2385. 600. VITEX foliis anguſtioribus, cannabis modo diſpoſitis. *C. B. P.* 475. [Vitex *Agnus-caſtus.*

2386. 1900. —— foliis ternatis quinatiſque pinnato-inciſis, ſpicis verticillatis terminalibus. *Dict. Hort.* [

2387. 2200. VITIS *arborea*, foliis ſupradecompoſitis: foliolis lateralibus pinnatis. *Linn.* Frutex ſcandens petroſelini foliis, virginianus, claviculis donatus. *Pluk. Mant.* 85, *t.* 412, *f.* 2.

2388. 799. ULMARIA. *Cluſ. Hiſt.* 198. Barba capræ floribus compactis. *C. B. P.* 164. [Spiræa *Ulmaria.*

2389. 800. —— floribus in longas ſpicas congeſtis. *Boerh. Ind. Alt.* 295. Barba capræ floribus oblongis. *C. B. P.* 163. [Spiræa *Aruncus.*

2390. 1750. ULMUS folio latiſſimo ſcabro. *Ger. Em.* 1481. Latiore folio. *Park.* 1404. [Ulmus *campeſtris.*

Digitized by Google

2391. 2150. VOLKAMERIA *inermis*, ramis inermibus. *Linn.*

2392. 550. VOLUBILIS americana, bryoniæ folio; hirſutiâ lappaceâ obſita. *D. Houſt.* Gronovia ſcandens lappacea, pampineâ fronde, Houſton. *Martyn. Hiſt. Pl. Rar. Dec. IV, N°.* 8. [Gronovia *ſcandens.*

2393. 2298. URTICA *cylindrica*, foliis oppoſitis oblongis, amentis cylindricis ſolitariis indiviſis ſeſſilibus. *Linn.* Urtica racemoſa humilior iners. *Sloan. Jam.* 38.

2394. 2299. —— *divaricata*, foliis alternis ovatis, racemis compoſitis divaricatis. *Linn.* Urtica racemoſa major, virginiana, hirſutior, ſive minor, urens. *Pluk. Phyt.* 237, *f.* 2.

2395. 2048. —— foliis alternis ovato-cordatis ſerratis, racemis compoſitis erectis. *Mill.* [Urtica *canadenſis.*

2396. 1398. —— foliis profundè laciniatis, ſemine lini. *Amm.* [Urtica *cannabina.*

2397. 946. —— pilulifera, parietariæ foliis. *H. R. P.* [Urtica *balearica.*

2398. 1450. —— racemifera maxima ſinarum, foliis ſubtùs argenteâ lanugine villoſis. *Pluk. Alm.* 212. [Urtica *nivea.*

2399. 900. VULNERARIA erecta, annua, flore

ſubrotundo, leviter crenato. *Rand.* Loto affinis coryli folio. *Dod. Mem.* [Pſoralea *coryliſolia.*

2400. 950. —— pentaphyllos. *T. Inſt.* Anthyllis leguminoſa, veſicaria, hiſpanica. *Park.* 1094. [Anthyllis *tetraphylla.*

2401. { 948. 949. } —— ruſtica. *J. B.* Anthyllis leguminoſa. *Raii Syn.* Vulneraria flore purpuraſcente. *T. Inſt.* [Anthyllis *Vulneraria.*

W

2402. 2049. WACHENDORFIA foliis lanceolatis quinquènerviis canaliculato-ſpicatis, floribus in thyrſum collectis. *Burm. Fig.* [Wachendorfia *thyrſiflora.*

2403. 2050. WALCHERIA. *Gen. Nov.* [Nolana *proſtrata.*

2404. 1550. WALTHERIA *americana*, foliis ovalibus plicatis ſerrato-dentatis tomentoſis, capitulis pedunculatis. *L.* Monoſpermalthæa arboreſcens villoſa, flore majore. *D. Iſn. A. R. S.* 1721, *p.* 278, *t.* 74.

2405. 1998. WARNERIA. *Mill. Ic.* [Hydraſtis *canadenſis.*

2406. 1999. WATSONIA. *Mill. Ic.* [Antholyza *Meriana ?*

X

2407. 500. XANTHIUM luſitanicum ſpinoſum. *Par. Bat.* 439. [Xanthium *ſpinoſum.*

2408. 1850. —— ſive lappa minor. *J. B.* 3, 572. Lappa minor, ſive xanthium Dioſcoridis. *C. B. P.* 198. [Xanthium *ſtrumarium.*

2409. 1150. XERANTHEMUM, flore albo pleno. *H. L. B.* [Xeranthemum *annuum. (Var.)*

2410. 1500. —— flore pleno purpureo majore. *H. L. B.* [*(Ejuſdem alia varietas.)*

2411. 650. —— flore ſimplici purpureo minore. *T. Inſt.* 499. [*(Ejuſdem alia varietas.)*

2412. 1399. XYLON americanum præſtantiſſimum, ſemine vireſcente. *T. Inſt.* [Goſſypium *hirſutum.*

Z

2413. 1400. ZACINTHA ſive cichorium verrucarium. *Matth.* 505. [Lapſana *Zacintha.*

2414. 2450. ZINNIA *multiflora*, floribus pedunculatis. *Linn. Jacq. Obſ.* 2, *tab.* 40.

2415. 2300. — *pauciflora*, floribus ſeſſilibus. *Linn.* Bidens calyce oblongo, ſeminibus radii corollâ non deciduâ coronatis. *Mill. tab.* 64.

2416. 2549. ZIZIPHORA *capitata*, faſciculis terminalibus, foliis ovatis. *L.* Thymus humilis latifolius. *Buxb. Cent.* 3, *p.* 28, *t.* 51, *f.* 1.

2417. 2550. — *tenuior*, floribus lateralibus, foliis lanceolatis. *Linn.* Acynos ſyriaca, folio mucronato, foliis hirſutis. *Mor. Hiſt. p.* 404, *ſ.* 11, *t.* 19, *f.* 3, 4.

2418. 1600. ZYGOPHYLLUM *ſeſſilifolium*, foliis conjugatis ſeſſilibus : foliolis lanceolato-ovalibus margine ſcabris, caule fruticoſo. *Linn.* Fabago africana arboreſcens, flore ſulphureo, fructu rotundo. *Comm. Rar.* 10.

2419. 2000. — *ſeſſilifolium. b. fulvum*, capſulis ovatis acutis. *Linn.* Fabago flore luteo, petalorum unguibus rubris, fructu ſulcato acuto oblongo. *Burm. Pl. Afr.* 6.

ART. II.

ART. II.

Plantes rares trouvées dans un voyage au Peck, en Derbyshire. Par J. Martin, Membre de la Soc. Roy. Ann. 1729. N°. 407.

Ann. 1729. N°. 407. Plantes rares du Derbyshire.

Ces Plantes qui ne ſont pas communes dans le reſte de l'Angleterre, & dont l'Évêque de Londres n'a pas fait mention dans ſon édition de Cambden, ſont :

Bryum hypnoides, capitulis plurimis erectis, lanuginoſum. *Dill.* [Bryum *hypnoides.*

Cardamine impatiens altera hirſutior. *Raii Syn.* [Cardamine *impatiens.*

Cochlearia rotundifolia minima. *Merr.* [Cochlearia *groenlandica.*

Empetrum montanum, fructu nigro. *T.* [Empetrum *nigrum.*

Erica humilis, cortice cinereo, arbuti flore albo. *H. R. P.* [Erica *cinerea.*

Feſtuca humilior, paniculâ brevi heteromallâ. Gramen paniculatum bromoides minus, paniculis

Ann. 1729. N°. 407. Plantes rares du Derbyshire.

ariſtatis, unam partem ſpectantibus. *Raii Syn.* [Feſtuca *bromoides*.

Filix mas non ramoſa, pinnulis anguſtis, raris, profundè dentatis. *Ger. Em.* [Polypodium *Filix fœmina*.

Geranium ſaxatile. *Ger. Em.* [Geranium *lucidum*.

Ladanum arvenſe, flore amplo luteo; labro purpureo. Lamium cannabinum, flore amplo luteo, labio purpureo. *Raii Syn.* [Galeopſis *Tetrahit. a*.

Lichenoides ſaxatile tinctorium, foliis piloſis purpureis. *Dill.* [Lichen *omphalodes*.

Lychnis ſylveſtris alba, IX. *Cluſii.* [Silene *nutans*.

Lycopodium ſabinæ facie. *Fl. Jen.* [Lycopodium *complanatum*.

Oxycoccus, ſeu vaccinia paluſtria. *J. B.* [Vaccinium *Oxycoccus*.

Roſa ſylveſtris alba, cum aliquo rubore, foliis hirſutis. *J. B.* [Roſa *alba*.

Rubus idæus ſpinoſus, fructu rubro. *J. B.* [Rubus *idæus*.

Salix folio laureo, ſeu lato glabro odorato. *Phyt. Brit.* [Salix *pentandra*.

Scariola ſylveſtris, Anguillaræ. Lactuca ſylveſtris murorum, flore luteo. *J. B.* [Prenanthes *muralis*.

Scrophularia, ſcorodoniæ folio. *Mor.* [Scrophularia *Scorodonia.*

Selago, foliis & facie abietis. *Fl. Jen.* [Lycopodium *Selago.*

Stachys Fuchſii. *J. B.* [Stachys *germanica.*

Thalictrum minus. *Ger.* [Thalictrum *minus.*

Viola montana. *Raii.* Variété à fleurs bleues & jaunes. [Viola *calcarata.*

Uſnea ſaxatilis capillacea. Muſcus corallinus, ſaxatilis, fœniculaceus. *Raii Syn.* [Lichen *pubeſcens?*

Ann. 1719. N°. 407. Plantes rares du Derbyshire.

ART. III.

Plantes obſervées dans les Alpes Tyroloiſes, au commencement de Septembre. Par le Docteur Balthaſar Ehrard. Ann. 1740. N°. 458.

Acetoſa lanceolata, alpina, rotundifolia. *N.* [Rumex *alpinus.*

Acini pulchra ſpecies. *J. B.* 3, 260. [Thymus *alpinus.*

Cacalia tomentoſa. *C. B. P.* 198. [Tuſſilago *frigida.*

Ann. 1740. N°. 458. Plantes alpines.

Ann. 1740. N°. 458. Plantes alpines.

Cardamine alpina. *Cluſ. Pannon.* [Cardamine *trifolia.*

Caryophyllata alpina, chamædryos folio. *Boerh.* 45. [Geum *montanum.*

Chamærhododendros alpina villoſa. *T.* 604. [Rhododendron *hirſutum.*

Cotoneaſter. *J. B.* 1, 73. [Meſpilus *Cotoneaſter.*

Cratægus folio ſubrotundo, ſerrato, ſubtùs incano. *T.* 633. [Cratægus *Aria.*

Daucus montanus, multifido longoque folio. *C. B. P.* [Athamanta *cretenſis.*

Dioſpyros. *J. B.* 1, 75. I. Myrtomelis Geſneri. [Dioſpyros *Lotus.*

Doria, quæ Jacobæa alpina. *C. B. Prod.* 66. [Cineraria *alpina?*

Erica arboreſcens, floribus luteolis vel herbaceis. *J. B.* 3, 356. [Erica *ſcoparia.*

Gallium ſaxatile ſupinum, molliore folio. *A. R. P.* 1714. [Galium *ſaxatile.*

Horminum luteum glutinoſum. *C. B. P.* 238. [Salvia *glutinoſa.*

Larix folio deciduo, conifera. *J. B.* [Pinus *Larix.*

Pinaſter alpinus pumilio. *Cluſ. Pannon.* [Pinus *Cembra?*

Quinquefolium album, 1. *Cluſ.* [Potentilla *alba.*

Sedum minus, flore luteo. *J. B.* 694. [Sedum *rupeſtre.*

Ann. 1740. N°. 458. Plantes alpines.

Siler montanum minus. *Boerh.* 52. [Laſerpitium *Siler. b.*

Vitis idæa foliis oblongis albicantibus. *C. B. P.* 470. [Arbutus *alpina.*

ART. IV.

Plante aquatique trouvée à Bagneres en Gaſcogne. Par M. Secondat de Monteſquieu. Ann. 1744. N°. 472.

L'Auteur écrit à M. Folkes, alors Préſident de la Société Royale, en ces termes :

« J'ai trouvé à Bagneres une plante aquatique particuliere, que j'avois vue pour la premiere fois dans le grand baſſin de la ſource bouillante à Dax. Elle ne porte ni fruits ni fleurs, du moins en apparence. Sa ſubſtance eſt entierement compoſée de petites veſſies pleines d'air. Sa ſurface reſſemble à un réſeau ou à du canevas. Elle ne croît que dans les ſources minérales les plus chaudes. On la trouve

Ann. 1744. N°. 472. Fucus *thermalis.*

Ann. 1744. N°. 472. Fucus thermalis.

à la *ſource* nommée *de la Reine*, au *bain des pauvres*, & à la *nouvelle ſource*; mais plus abondamment à l'endroit où une partie de la *ſource de la Reine* ſort d'un rocher, auprès des Capucins. Perſonne, que je ſache, n'a jamais parlé de cette plante, avant le détail que j'en donnai, il y a deux ans, à la rentrée publique de nos aſſemblées académiques.

» La végétation & les qualités particulieres de cette plante mériteroient peut-être un examen plus approfondi. Je crois qu'on peut l'appeller : *Fucus thermalis veſicularis, ſuperficie reticulari.* »

ART. V.

Nouvelle eſpece de Fungus. Par J. Martin, Profeſſeur de Botanique à Cambridge, Membre de la Société Royale. Ann. 1745. N°. 475.

Ann. 1745. N°. 475. Champignons.

Ce Champignon, dont M. Martin donne la deſcription & la figure, ſous le nom de *Boletus caule ramoſo; ſummitatibus concavis expanſis; ramis minoribus in acutum mucronem deſinentibus*, me paroît être une variété de la Clavaria *hypoxylon*, *Linn.*

L'Auteur préſente à ce ſujet une table ſynoptique

des Champignons, qu'il peut n'être pas inutile de mettre ſous les yeux du Lecteur.

Ann. 1745. N°. 475. Champignons.

Fungi ſunt :

- Lamellati.
  - Cauliferi : *Ammanita.*
  - Seſſiles : *Agaricoides.*
- Poroſi....
  - Cauliferi : *Boletus.*
  - Seſſiles : *Boletoides.*
- Cancellati aut ſcrobiculis excavati.
  - Expilâ erumpentes : *Phallus.*
  - Non erumpentes : *Merulius.*
- Echinati : *Erinaceus.*
- In pulverem abeuntes : *Lycoperdon.*
- Solidi.....
  - Cauliferi : *Chanterella.*
  - Seſſiles.
    - Calyciformes : *Pezica.*
    - Non calyciformes.....
- ——
  - In longitudinem producti : *Digitellus.*
  - Horizontaliter prodeuntes : *Agaricus.*
  - Subterranei : *Tuber.*

ART. VI.

Établiſſement d'un nouveau genre de plante, nommé Salvadora, *avec ſa deſcription. Par le Docteur Laurence Garcin, de Neufchatel en Suiſſe, Membre de la Société Royale. Traduit du françois par le Docteur T. Stack. Ann.* 1749. N°. 491.

Ann. 1749. N°. 491. Salvadora *perſica.*

Il s'agit du Salvadora *perſica. Linn.*

L'Auteur lui a donné ce nom en l'honneur de feu M. Salvador, de Barcelonne, très-habile Botaniſte, dont M. de Tournefort fait mention dans ſon *Iſagoge in rem herbariam*, où il le nomme le Phœnix de ſa nation, parce qu'il étoit vraiment le plus riche Naturaliſte & le plus ſavant Botaniſte que l'Eſpagne eût jamais produit. Avant le dernier ſiege de Barcelonne, en 1713 & 1714, ils herboriſerent enſemble en Catalogne & ſur les Pyrénées, dans le voyage que fit M. de Tournefort dans ces contrées. Ils étoient amis intimes, & ils eurent enſemble une correſpondance ſuivie pendant pluſieurs années.

« Comme je l'ai connu perſonnellement, » continue l'Auteur, « pendant trois ou quatre ans, pour

» avoir auſſi herboriſé avec lui, avant le ſiege dont » j'ai parlé; & ayant été depuis honnoré de ſon » amitié & de ſa correſpondance, je me ſuis fait » un devoir d'éterniſer ſa mémoire, en donnant ſon » nom à cette plante. Cette juſtice lui étoit due, » car je ſais que s'il eût vécu, il ſe propoſoit de » donner une Hiſtoire des Plantes d'Eſpagne, dont » l'exactitude lui auroit mérité la reconnoiſſance & » les éloges de tous les Botaniſtes de l'Europe. »

Ann. 1759. N°. 491. Salvadora *perſica*.

ART. VII.

Sur les reſtes du jardin de J. Tradeſcant, à Lambeth. Par M. Guillaume Watſon, Membre de la Société Royale. Ann. 1749. N°. 492.

L'Auteur dit qu'étant allé viſiter ce jardin avec le Docteur Mitchell, ils y trouverent les plantes exotiques dont il ſera fait mention ci-deſſous.

Ann. 1749. N°. 492. Jardin de Tradeſcant.

« Ce jardin, ajoute-t-il, avoit été planté, il y a environ cent vingt ans, par Tradeſcant, & c'étoit probablement, après celui de M. John Gerard, Auteur de l'Herbier, le premier jardin botanique qu'il y ait eu en Angleterre. Tradeſcant, après avoir paſſé nombre d'années au ſervice du Lord

Ann. 1749. N°. 492. Jardin de Tradeſcant.

Tréſorier Salisbury, du Lord Wotton, &c., voyagea pendant long-tems ; il enrichit la Botanique d'un grand nombre de plantes & de ſemences juſqu'alors inconnues en Angleterre, & dont pluſieurs furent déſignées ſous ſon nom par les Jardiniers de ſon tems : comme l'Éphémere de Tradeſcant (Tradeſcantia *virginica. Linn.*), l'Aſter *Tradeſcanti. Linn.*, l'Aſphodele de Tradeſcant.

» Il planta ici le premier le *Cupreſſus americana, acaciæ foliis deciduis* (Cupreſſus *diſticha. Linn.*), qui a depuis été ſi eſtimé, & qui fait maintenant un des principaux ornemens du Jardin du Duc d'Argyll, à Witton.

» Le jardin de Tradeſcant eſt entierement négligé depuis longues années, & la maiſon qui y étoit jointe tombe en ruine ; mais quoique ce jardin ſoit entierement couvert de méchantes herbes, il reſte parmi elles des traces manifeſtes de ſon fondateur. Nous y trouvâmes le *Borrago latifolia ſempervirens. C. B.* (Anchuſa *ſempervirens. Linn.*), le *Polygonatum vulgare latifolium. C. B.* (Convallaria *Polygonatum. Linn.*), l'*Ariſtolochia clematitis recta. C. B.* (Ariſtolochia *Clematis. Linn.*), & le *Dracontium. Dod.* (Arum *Dracunculus. Linn.*) Il y reſte encore deux arbouſiers, les plus gros que j'aie jamais vus. Ils étoient depuis ſi long-tems accoutumés à nos hivers, qu'ils réſiſterent aux froids

exceſſifs de 1729 & 1740, auxquels il n'échappa preſqu'aucun des arbres de cette eſpece dans toute l'Angleterre. Il y a dans le verger un nerprun, Rhamnus *catharticus*, d'environ vingt pieds de hauteur, & de près d'un pied de diametre. C'eſt le plus gros que je connoiſſe.

Ann. 1749. N°. 492. Jardin de Tradeſcant.

» Il peut ſans doute y avoir encore dans ce jardin pluſieurs autres plantes étrangeres qui nous ont échappé, parce qu'elles fleuriſſent dans une autre ſaiſon. »

ART. VIII.

Détails ſur le Cannellier. Par M. Guillaume Watſon, Membre de la Société Royale. Lu le 21 Novembre 1751.

« Le vrai Cannellier ne croît que dans l'iſle de Ceylan, dont les États de Hollande ſont les maîtres. Ils ſont très-jaloux de cet arbre, qui eſt pour eux d'un produit immenſe ; & ils ont expreſſément défendu d'en exporter des ſemences ou des plants. Cette prohibition paroît cependant n'être pas de très-ancienne date, car Paul Hermann, qui avoit ſéjourné pendant quelque tems dans cette Iſle,

Ann. 1751. Tom. 47. Sur le Cannellier.

Ann. 1751. Tom. 47. Sur le Cannellier.

nous dit dans ſon *Hortus Lugduni-Batavus*, publié en 1687, qu'il avoit envoyé pluſieurs de ces arbres en Hollande, & qu'ils avoient ſubſiſté dans ſon jardin à Leyde, ainſi que chez d'autres particuliers, pendant deux ou trois ans, après quoi un hiver rigoureux les fit périr.

» Je ſais de bonne part, ajoute l'Auteur, qu'on avoit préſenté trois de ces arbres dans des pots, au feu Roi Guillaume. Il les fit placer dans le jardin d'Hampton-court, d'où l'on ſe propoſoit de les envoyer à la Jamaïque, pour les y multiplier ſous les auſpices du Comte d'Inchiquin, qui s'y rendoit en qualité de Gouverneur. Mais ils furent laiſſés par inadvertance; & comme l'art du jardinage étoit alors très-peu avancé, & n'avoit pas encore perfectionné la conſtruction & l'uſage des ſerres chaudes, on laiſſa mourir ces arbres ineſtimables. . . . »

ART. IX.

Notice du jardin de l'Évêque de Londres à Fulham. Par M. Guillaume Watſon, Membre de la Soc. Roy. Lu le 27 Juin 1751.

Ann. 1751. Tom. 47. Jardin de Fulham.

Henri Compton, qui fut Évêque de Londres depuis 1675 juſqu'en 1713, raſſembla dans ſon jardin de Fulham un grand nombre de plantes, &

Ann. 1751. Tom. 47. Jardin de Fulham.

ſur-tout d'arbres exotiques, qu'on n'avoit point encore vus en Angleterre, & qui n'étoient point décrits. Ce jardin devint extrêmement curieux & intéreſſant pour les Botaniſtes de ſon tems; & pluſieurs en ont parlé avec les plus grands éloges: tels ſont Herman, Ray, Plukenet, Commelin & autres.

Après la mort de l'Évêque Compton, toutes les plantes de ſerre & les arbres étrangers les plus délicats furent donnés à un Comte de Tylney; & on fit ſi peu de cas des autres raretés de ce jardin, que quelques-uns des arbres exotiques les plus robuſtes furent déracinés pour faire place à des potagers.

Voici le catalogue (*a*) de ceux qui reſtent dans ce jardin, le 25 juin 1751.

Acer *Negundo. Linn.*
Acer *Platanoides.*
Acer *rubrum.*
Æſculus *Pavia.*
Arbutus *Unedo.*
Celtis *auſtralis.*
Cercis *Siliquaſtrum.*

(*a*) *Note du Traducteur.* J'ai ſubſtitué aux phraſes que donne l'Auteur, la nomenclature abrégée de Linné.

Ann. 1751. Tom. 47. Jardin de Fulham.

Cupreſſus *ſempervirens.*
Cupreſſus *ſempervirens. b.*
Cytiſus *Laburnum.*
Dioſpyros *virginiana.*
Fraxinus *Ornus.*
Fraxinus *Ornus. Var.*
Gleditſchia *triacanthos.*
Juglans *nigra.*
Juniperus *virginiana.*
Laurus *Benzoin.*
Pinus *Abies.*
Pinus *Cedrus.*
Pinus *Larix.*
Pinus *Picea.*
Pinus *Pinea.*
Pinus *Tæda.*
Piſtacia *vera.*
Quercus *alba.*
Quercus *Ilex.*
Quercus *Suber.*
Rhus *glabrum.*
Robinia *Pſeudacacia.*
Ruſcus *racemoſus.*
Syringa *perſica. b. laciniata.*
Viburnum *prunifolium.*

Morifolia virginienſis arbor, loti arboris inſtar ramoſa, foliis ampliſſimis. *Pluk. Phyt. tab.* 46,

fig. 2. Corylus maxima, folio latiſſimo, virginiana. *Raii Hiſt.* 1799.

Ann. 1751. Tom. 47. Jardin de Fulham.

Parmi ces reſtes d'un jardin autrefois ſi fameux, il y a des plantes qu'on ne trouve preſque nulle autre part. Pluſieurs de ces arbres ont eu le tems de devenir les plus gros de leur eſpece que j'aie jamais vus, & il n'en exiſte probablement pas de plus gros en Europe. Ce détail n'eſt donc point un objet de ſimple curioſité ; il nous apprend que pluſieurs de ces arbres, quoique originaires de climats bien différens du nôtre, ſont parvenus chez nous à une grandeur conſidérable, & ont enduré nos rudes hivers, quelques-uns pendant près d'un ſiecle. On peut conſéquemment les propager, comme ils le méritent, ſoit par leur utilité, ſoit par leur beauté, dans le terrein & dans la ſituation qui leur conviennent. Je recommanderois, par exemple, à l'attention des curieux, le Noyer noir de Virginie (Juglans *nigra*), le Pin d'Amérique (Pinus *Tæda*), le Févier (Gleditſchia *triacanthos*), le faux Acacia (Robinia *Pſeudacacia*), l'Érable de Virginie, à feuilles de frêne (Acer *Negundo*), &c., qui reſtent encore à Fulham.

ART. X.

Catalogue de quelques Plantes rares, obſervées par M. Richard Pultney, Apoticaire à Leiceſter; communiqué par le Docteur Guillaume Watſon. Lu le 25 Novembre 1756.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. Partie. Plantes rares du Leiceſterſhire.

« M. Pultney eſt un homme de mérite, habile non ſeulement dans ſa profeſſion, mais encore dans pluſieurs parties de l'Hiſtoire Naturelle. Ses connoiſſances en Botanique ſont très-étendues, & il eſt très-zélé pour l'avancement de cette Science. Il a déja donné au public, quoique ſa modeſtie l'ait empêché d'y mettre ſon nom, un Recueil d'Obſervations auſſi curieuſes qu'utiles, ſur les Poiſons végétaux qui croiſſent en Angleterre, & dont la connoiſſance ne ſauroit être trop univerſellement répandue.

» Les plantes dont il eſt queſtion dans ce Mémoire ſont diſpoſées ſuivant le ſyſtême ſexuel du Docteur Linné. M. Pultney y a ajouté les ſynonymes des meilleurs Auteurs (*a*), le nom des lieux où elles

(*a*) *Note du Traducteur.* Nous avons penſé qu'il ſuffiroit d'indiquer chaque plante par ſon nom ſpécifique, ſans y ajouter la phraſe qui l'accompagne, & les ſynonymes des Auteurs. Nous avons omis auſſi, pour abréger, le nom des lieux particuliers où l'Auteur a trouvé les plantes.

croiſſent,

croiſſent, & quelques obſervations relatives à leur uſage dans la médecine & dans les arts.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſterſhire.

Rien n'eſt plus propre à concourir aux progrès de l'Hiſtoire Naturelle dans ce royaume, que le ſoin que prennent les Savans répandus dans ſes différentes provinces, de recueillir les productions naturelles qui ſe trouvent à leur portée, & d'en communiquer le détail à la Société Royale. Pour reconnoître l'utilité de cette correſpondance, il n'y a qu'à voir le *Synopſis Stirpium Britannicarum*, que feu M. Ray a publié au moyen d'un pareil ſecours, & qui eſt l'Ouvrage le plus parfait en ce genre qu'aucune nation ait encore vu paroître ».

Stirpium rariorum in agro Leiceſtrenſi ſponte naſcentium Sylloge.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

HIPPURIS *vulgaris. Linn.* Dans les eaux ſtagnantes ou preſque plates, & dans les marécages.

Cette plante fut bientôt découverte par les Botaniſtes après le renouvellement des Lettres; mais ils furent fort embarraſſés ſur le genre auquel il falloit la rapporter. Pluſieurs la prirent pour le

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſter-shire.

polygonum ou *ſanguinaria fœmina* de Dioſcoride; à la fin, elle fut rangée parmi les *equiſetum* ou prêles : juſqu'à ce que Ruppius, Dillen & Vaillant trouvant que les parties de la fructification dans cette eſpece différoient beaucoup de celles de la prêle, l'en diſtinguerent, le premier par le nom de *pinaſtella*, & les deux autres par l'ancienne dénomination de *limnopeuce*.

La fleur de cette plante eſt peut-être la plus ſimple qui exiſte dans la nature. Elle n'a ni calyce, ni petale, & ne conſiſte qu'en une étamine & un piſtile ſuivi d'une ſeule ſemence.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

VERONICA *officinalis*. *Linn*. Sur les terreins ſecs & ſtériles, ſpécialement dans les bruyeres. Fleurit en Juin.

C'eſt ici la véritable véronique des boutiques, tant recommandée par Hoffman, Boerhaave, & autres, comme un excellent déobſtruant. Celle que vendent nos Herboriſtes de campagne, eſt la *veronica pratenſis minor* de Gerard & de Parkinſon (Veronica *ſerpillifolia*. *Linn*.), qui eſt infiniment plus commune que la véritable. Il n'y a pas long-

tems que la véronique étoit un remede à la mode pour la goutte. Les uns la prenoient comme du thé; les autres en avaloient les feuilles ſeches & pulvériſées.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſterſhire.

VERONICA *ſcutellata. Linn.* Au bord des foſſés & ſur les fondrieres. Fleurit en Mai & Juin. Très-rare dans ces cantons.

PINGUICULA *vulgaris. Linn.* Dans les fondrieres & les marais. Fleurit en Juin.

La graſſette eſt purgative. Parkinſon rapporte que dans le pays de Galles, les gens du peuple en font un ſirop, dont ils ſe ſervent pour ſe purger. On a obſervé depuis long-tems qu'elle eſt nuiſible aux moutons; & ſuivant Linné (*Amœn. Acad. Tom.* 2, *p.* 238), ni les chevaux, ni les chevres, ni le gros bétail ne veulent en manger. Elle eſt d'un grand uſage dans l'économie rurale des Lapons : voyez *Fl. Lappon. p.* 10.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

SCIRPUS *ſylvaticus. Linn.* Dans les lieux aquatiques, autour des foſſés, des ruiſſeaux, des étangs, &c. Fleurit en Juillet & Août.

ERIOPHORUM *polyſtachion. Linn.* Sur les fondrieres & dans les marais.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſter-shire.

Il eſt des perſonnes en Suede, qui faute de plumes ſe font des couchers avec le duvet de cette plante. *Fl. Lappon. p.* 18. On pourroit ſans doute l'appliquer à d'autres uſages économiques; car il eſt d'une grande fineſſe, & on en recueilleroit facilement & en quantité dans bien des endroits de cette contrée.

NARDUS *ſtricta. Linn.* Sur les landes ſeches & ſtériles, & quelquefois dans les marais. Fleurit en Avril.

Les chevaux & autres beſtiaux, & ſur-tout les moutons, ſont très-friands de ce fourrage; mais on en trouve rarement dans nos foins, parce qu'il eſt trop court pour être atteint par la faux.

DIGYNIA.

AIRA *precox. Linn.* Sur les terreins ſecs & ſtériles, ſur-tout ſur les ſols graveleux, & aſſez communément ſur les murs de terre.

MELICA *nutans. Linn.* Dans les bois. Fleurit en Avril & Mai.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

DIPSACUS *piloſus. Linn.* Sur les bords des foſſés, vers les haies, ſur-tout dans les lieux humides & peu fréquentés. Fleurit en Juillet & en Août.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſterſhire.

ASPERULA *odorata. Linn.* Dans les bois montueux, & ſous les buiſſons. Fleurit en Mai.

Le Docteur Gmelin, cité par Haller, *Enum. Stirp. Helv. p.* 458, obſerve que le ſel fixe de cette plante eſt plus fortement alkalin qu'aucun autre. Elle a une odeur agréable, & chaſſe les teignes. *Amœn. Acad. T.* 1, *p.* 358.

PLANTAGO *coronopifolia. Linn.* Sur les terreins ſecs & ſabloneux, & dans les bruyeres. Fleurit en Juillet.

Ses feuilles étendues d'une maniere réguliere ſur le terrein l'ont fait nommer par quelques-uns l'*étoile de la terre* (the ſtar of the earth), & on a beaucoup parlé de ſa vertu contre la morſure des chiens enragés. Voyez les Tranſact. philoſ. en anglois. Ann. 1687, N°. 187; & Ann. 1738, N°. 457; & le Tom. I. de la MATIERE MÉDICALE dans cet Abrégé, p. 292.

ALCHEMILLA *vulgaris. Linn.* Dans les prés & les pâturages élevés. Fleurit en Mai. Elle n'eſt pas commune dans nos contrées.

Le Docteur Haller, dans ſon *Iter Helveticum*, attribue l'abondance & l'excellence extraordinaires du lait dans certaines parties de la Suiſſe, principalement à cette plante & à deux autres, qui abondent dans leurs pâturages : ce ſont le plantain à feuilles étroites (Plantago *lanceolata. Linn.*), & le

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſter-ſhire.

mutellina de Geſner & de Camerarius (Phellandrium *Mutellina. Linn.*).

DIGYNIA.

CUSCUTA *europæa. Linn.* Elle n'eſt pas commune dans ces contrées.

La cuſcute eſt toujours la même par-tout, quoique les Auteurs lui aient donné des noms différens ſuivant la plante ſur laquelle on la trouve. Elle eſt ſujette à varier dans la couleur de ſes tiges, qui d'abord ſont jaunâtres, enſuite pourpres. La couleur de ſa fleur eſt variable auſſi; & ces accidens ont été cauſe qu'on en a fait pluſieurs eſpeces. Mr. Vaillant, quoique ordinairement ennemi de la multiplication des eſpeces, compte néanmoins trois eſpeces de cuſcute, dans le *Botanicon Pariſienſe*, *p.* 43; mais Linné, Haller & Mr. Dalibard s'accordent à les rapporter toutes à la *cuſcuta major* de Gaſpard Bauhin, dont il s'agit ici, & qui eſt dans le fait la ſeule eſpece qu'on en trouve en Europe.

La cuſcute fournit une teinture tirant ſur le pourpre. *Amœn. Acad. Tom. I, p.* 359.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſterſhire.

LITHOSPERMUM *officinale. Linn.* Dans les lieux ſecs & incultes, au bord des chemins, &c.

Cette plante eſt rare dans nos contrées. Le Lithoſpermum *arvenſe. Linn.* y eſt beaucoup plus commun.

HOTTONIA *paluſtris. Linn.* Dans les eaux ſtagnantes, ou peu rapides. Fleurit en Avril & Mai.

LYSIMACHIA *vulgaris. Linn.* Dans les lieux aquatiques, autour des foſſés & des rivieres. Fleurit en Juin. Rare dans ces cantons.

ANAGALLIS *tenèlla. Linn.* Sur les fondrieres & les terreins marécageux. Fleurit en Juin & Juillet.

Cette plante eſt preſque particuliere à la France & à l'Angleterre. Il eſt ſingulier que Linné l'ait omiſe dans ſa *Flora Anglica.*

La pimprenelle jaune des bois (Lyſimachia *nemorum. Linn.*) & la nummulaire (Lyſimachia *Nummularia. Linn.*) ſont plus communes ici que la précédente.

CAMPANULA *patula. Linn.* Dans les bois & les haies. Fleurit en Juillet & Août.

CAMPANULA *glomerata. Linn.* Dans les lieux

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſter-ſhire.

montueux, ſur-tout dans les terres crayeuſes. Fleurit en Juillet. Très-rare dans cette Comté, quoique très-abondante dans le Lincolnshire.

CAMPANULA *hybrida. Linn.* Dans les bleds. Fleurit en Juin & Juillet.

Le Docteur Haller la regarde comme une variété de la doucette (Campanula *Speculum. Linn.*) des jardins; & quoique Linné en faſſe une eſpece diſtincte, il met en doute ſi elle ne tire pas ſon origine de la même plante.

SAMOLUS *Valerandi. Linn.* Dans les marécages. Fleurit en Juin. Très-rare ici.

ATROPA *Belladonna. Linn.* Fleurit en Mai.

La qualité enyvrante & vénéneuſe de cette herbe eſt bien connue, & l'on trouve dans différens Auteurs un grand nombre d'exemples de ſes fâcheux effets. L'hiſtoire mémorable de l'empoiſonnement des Danois par les Ecoſſois, telle que la rapporte Buchanan, *Rer. Scot. lib.* 7, eſt citée par la plupart de ceux qui ont écrit depuis au ſujet de cette plante. *Voyez le Ier. Volume de la* MATIERE MÉDICALE *dans cet Abrégé, p.* 338.

Mais quelque pernicieuſe qu'ait toujours paru cette plante lorſqu'elle a été introduite dans l'eſtomac, des Médecins ont oſé la donner intérieurement comme remede, dans une des plus cruelles maladies auxquelles l'humanité ſoit ſujette: je veux

dire le cancer. En 1739, dans une thefe publiée à Hall en Saxe, on l'annonçoit comme ſpécifique contre cette maladie. On l'a depuis adminiſtrée avec le plus grand ſuccès dans un cas de ce genre, qui eſt rapporté d'une maniere très-circonſtanciée, & avec la plus grande apparence de candeur & de vérité, dans la Bibliotheque des Sciences & des Arts pour les trois premiers mois de 1755. Un ſeul cas favorable eſt loin de ſuffire pour déterminer la valeur d'un nouveau remede; mais il doit exciter à en faire de nouvelles épreuves.

Ann. 1758. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſterſhire.

RHAMNUS *Frangula. Linn.* Dans les bois humides. Fleurit en Avril & Mai.

L'écorce intérieure de la bourgêne, ſur-tout celle de ſa racine, eſt un violent purgatif. Haller obſerve que le charbon du bois de cet arbre eſt préférable aux autres pour la fabrication de la poudre à tirer. Il ſert à cet uſage en Suede. *Fl. Suec. p.* 68. *Amœnit. Acad. Vol.* 1, *p.* 360. Les baies de la bourgêne teignent d'un beau verd, comme les baies du nerprun, & ſon écorce intérieure fournit une couleur jaune. *Ibid.*

DIGYNIA.

GENTIANA *amarella. Linn.* Dans les pâturages ſecs & montueux, ſur-tout dans les terres crayeuſes. Fleurit en Août.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſter-ſhire.

CAUCALIS *latifolia. Linn.* Je n'ai jamais vu cette plante dans le Leiceſtershire ; mais je l'ai obſervée dans les bleds du Lincolnshire.

TORDYLIUM *nodoſum. Linn.* Au bord des champs, aux côtés des chemins, & ſur les rives ſeches. Fleurit en Juin & Juillet.

PEUCEDANUM *Silaus. Linn.* Cette plante eſt très-abondante dans la plupart de nos prés & de nos pâturages humides, & ſe trouve aſſez fréquemment ſur les terreins élevés. Fleurit en Mai & Juin.

Linné l'a omiſe dans la *Flora Anglica*, quoiqu'on la trouve ici auſſi abondamment que dans aucune autre partie de l'Europe.

SIUM *latifolium. Linn.* Dans les rivieres & ſur leurs bords. Fleurit en Juillet.

SISON *Amomum. Linn.* Dans les lieux humides, au bord des foſſés, &c. Fleurit en Juillet.

PHELLANDRIUM *aquaticum. Linn.* Croît abondamment dans la riviere Soar près de Leiceſter.

Cette plante a été très-vantée en Allemagne ; & Heiſter entr'autres l'a beaucoup recommandée. On l'emploie à l'extérieur pour réſoudre les tumeurs ſquirreuſes, & on en fait des cataplaſmes pour le cancer & la gangrene. Elle eſt vénéneuſe, & on a obſervé que ſi les chevaux en mangent, elle leur cauſe une paraplégie. D'un autre côté, les vaches

en ſont avides, & la mangent ſans inconvénient. *Amœnit. Acad. Vol.* 1, *p.* 361 & 418.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſterſhire.

CICUTA *viroſa. Linn.* Sur les bords des rivieres & des étangs, & dans les marécages. Fleurit en Juillet & Août. Elle n'eſt pas commune ici.

Il y a de nombreux & terribles exemples des funeſtes effets de cette plante. On en trouve dans le Traité de Wepfer, & dans beaucoup d'autres Ouvrages, Journaux, &c. Le Docteur Haller en cite pluſieurs: *Enum. Stirp. Helv. p.* 436. Voyez auſſi le premier Volume de la MATIERE MÉDICALE dans cet Abrégé, p. 358, 361 & ſuiv. Linné étant à Torneo, dans ſon voyage en Laponie, apprit aux habitans de ce pays, que la grande mortalité de leurs bêtes à cornes dans le printems, lorſqu'on les remet aux champs & qu'elles périſſent par centaines, eſt entierement occaſionnée par cette plante qui croît en abondance dans leurs pâturages. *Flor. Lappon. p.* 72. — Le Docteur Gmelin, qui en a trouvé les marécages infeſtés dans preſque toute la Ruſſie & la Sibérie, nous dit que tout le monde aſſure dans ces contrées, que les chevaux la mangent ſans inconvénient, mais qu'elle tue infailliblement les bêtes à cornes, & qu'elles enflent beaucoup avant de mourir: ſymptôme que Linné avoit remarqué dans celles qui périſſoient à Torneo. Les habitans de ces pays diſent auſſi que les racines de cette

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leicestershire.

plante ſont infiniment plus meurtrieres que ſes feuilles. Voy. *Flora Sibirica*, *Vol. I. p.* 203.

PIMPINELLA *magna. Linn.* Dans les bois, parmi les buiſſons, dans les lieux ombragés. Fleurit en Juillet.

Sa racine eſt un des ingrédiens de la poudre d'arum compoſée, des boutiques, & eſt très-eſtimée par quelques Médecins Allemands, ſur-tout par les ſectateurs de Stahl.

Il eſt très-peu de nos Herboriſtes qui connoiſſent cette plante; & ils donnent à ſa place la racine de la pimprenelle ordinaire, ou celle de la ſaxifrage des prés.

TETRAGYNIA.

PARNASSIA *paluſtris. Linn.* Sur les fondrieres & dans les marais. Fleurit en Août.

PENTAGYNIA.

STATICE *Armeria. Linn.* Le gazon d'Olympe fleurit en Juin & Juillet. On le trouve non ſeulement dans les marécages près de la mer, mais encore dans l'intérieur des terres.

Ann. 1754. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſterſhire.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

NARCISSUS *Pſeudo-narciſſus. Linn.* Très-rare dans ces cantons. Fleurit en Mars.

ALLIUM *urſinum. Linn.* Il n'eſt pas commun dans le Leiceſtershire; non plus que l'Allium *vineale. Linn.*

CONVALLARIA *majalis. Linn.* Dans les bois ombragés. Fleurit en Mai.

Le Docteur Haller obſerve qu'on peut retirer des feuilles de cette plante, préparées avec la chaux, une belle couleur verte durable. *Enum. Stirp. Helv. p.* 287.

ACORUS *Calamus. Linn.* On le trouve dans la riviere Soar, en divers endroits. Il pouſſe ſon chaton en Mai.

TRIGYNIA.

RUMEX *ſanguineus. Linn.* Dans les jardins potagers, dans les friches, ſur les fumiers, &c. Aſſez commun. Fleurit en Juillet & Août.

RUMEX *maritimus. Linn.* Dans les pâturages humides, & autour des foſſés.

TRIGLOCHIN *paluſtre. Linn.* Au bord des

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſter-ſhire.

ruiſſeaux, & dans les lieux marécageux; mais en petite quantité.

Ce fourrage eſt abondant en Suede, en Ruſſie & en Sibérie, & les bœufs en ſont très-friands; il paroît par le *Pan Suecus*, que les chevres, les moutons, les cochons & les chevaux le mangent auſſi.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

VACCINIUM *Myrtillus*. *Linn.* Sur les landes & dans les bois. Fleurit en Avril.

Ses baies fourniſſent aux Lapons quelques-uns de leurs mets favoris. *Flor. Lappon. p.* 108. Elles ſont très-aſtringentes. Haller cite les Actes de Breſlaw, Ann. 1722, pour un cas dans lequel une décoction de ces baies occaſionna une telle conſtipation de boyaux, que la mort s'enſuivit. *Enum. Stirp. Helv. p.* 415.

ERICA *cinerea*. *Linn.* Parmi la bruyere commune.

ERICA *Tetralix*. *Linn.* Avec la précédente, & plus abondamment.

Le Docteur Plot nous informe qu'on ſe ſert de la bruyere, au lieu de houblon, pour la biere, dans quelques parties du Staffordshire, & qu'elle

la conſerve auſſi long-tems, ſans lui donner aucun mauvais goût. La bruyere plaît extrêmement aux abeilles, & on ſait qu'elles en tirent beaucoup de miel; mais celui qu'elles recueillent ſur cette plante, donne communément à la totalité une couleur rougeâtre, & ce miel n'eſt pas réputé le meilleur.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſterſhire.

DAPHNE *Laureola. Linn.* Dans les haies, parmi les buiſſons, & dans les bois. Fleurit en Mars.

TRIGYNIA.

POLYGONUM *Biſtorta. Linn.* Dans les prés humides. Fleurit en Mai.

DECANDRIA.

DIGYNIA.

CHRYSOSPLENIUM *oppoſitifolium. Linn.* Dans les lieux humides peu fréquentés; autour des haies, des foſſés; & dans les bois. Fleurit en Avril & Mai.

PENTAGYNIA.

COTYLEDON *Umbilicus. b. tuberoſa. Linn.* Sur les rochers & les vieux murs. Fleurit en Mai.

CERASTIUM *arvenſe. Linn.* Sur les landes &

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leicestershire.

les pâturages secs dont le sol est sabloneux. Très-abondant en Lincolnshire.

Nous avons très-communément ici les trois especes de cerastium qui suivent : savoir,

CERASTIUM *viscosum. Linn.*

—— *semidecandrum. Linn.*

—— *aquaticum. Linn.*

SPERGULA *nodosa. Linn.* Sur les fondrieres, en petite quantité.

DODECANDRIA.

TRIGYNIA

RESEDA *lutea. Linn.* Aux bords des champs, dans les fonds sablonneux & crayeux. Elle est rare ici, & abondante en Lincolnshire.

ICOSANDRIA.

POLYGYNIA.

ROSA *spinosissima. Linn.* Dans les terreins sabloneux. Fleurit en Juin & Juillet.

RUBUS *idæus. Linn.* Dans les lieux pierreux & montueux. Fleurit en Mai. Le Rubus *cæsius. Linn.* est assez commun ici.

FRAGARIA

FRAGARIA *ſterilis. Linn.* Dans les pâturages ſecs & les bois montueux. Elle eſt très-commune chez nous, au lieu que la fraiſe ordinaire (Fragaria *veſca. Linn.*) ne ſe trouve qu'en petite quantité dans nos bois.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſterſhire.

POTENTILLA *argentea. Linn.* Dans les pâturages ſecs & montueux, ſur-tout dont le ſol eſt ſabloneux. Fleurit en Juillet.

TORMENTILLA *reptans. Linn.* Dans les enclos.

(L'Auteur obſerve que le caractere ſpécifique dont Linné s'eſt ſervi, pour diſtinguer cette plante de la tormentille ordinaire, n'eſt pas ſuffiſant; mais cette erreur a été rectifiée dans les Editions de Linné poſtérieures à la date de ce Mémoire.)

POLYANDRIA.

PENTAGYNIA.

AQUILEGIA *vulgaris. Linn.* Dans les bois. Fleurit en Mai & Juin.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

TEUCRIUM *Scorodonia. Linn.* Dans les bois & parmi les rochers. Pluſieurs de nos Herboriſtes vendent cette eſpece pour le vrai ſcordium, auquel elle n'eſt pas beaucoup inférieure en vertus.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſter-ſhire.

NEPETA *Cataria. Linn.* Sur les rives ſeches, autour des haies, &c. Fleurit en Juin & Juillet.

MENTHA *ſylveſtris. Linn.* Elle n'eſt pas très-commmune. Fleurit en Juillet.

MENTHA *gentilis. Linn.* Très-rare ici.

THYMUS *Acinos. Linn.* Le petit baſilic ſauvage fleurit en Juin; il eſt très-rare autour de Leiceſter. Nous avons en revanche beaucoup du grand (Clinopodium *vulgare. Linn.*).

MELISSA *Nepeta. Linn.* Sur les bords des champs, le long des chemins & des haies. Fleurit en Juillet & Août.

ANGIOSPERMIA.

OROBANCHE *major. Linn.* Fleurit en Juin, parmi les bruyeres & les genêts.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

IBERIS *nudicaulis. Linn.* Sur les terreins montueux, ſecs & ſabloneux, parmi les rochers & les pierres. Fleurit en Mai.

SILIQUOSA.

CARDAMINE *impatiens. Linn.* Fleurit en Mai & Juin, parmi les rochers.

CARDAMINE *hirſuta. Linn.* A côté des ruiſſeaux; peu abondante.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſter-ſhire.

GERANIUM *lucidum. Linn.* Ce geranium n'eſt pas commun ici. Je l'ai trouvé ſur les rochers.

GERANIUM *molle. Linn.*

— *diſſectum. Linn.*

— *rotundifolium. Linn.*

Ces trois dernieres eſpeces ſont toutes fréquentes chez nous; mais la derniere y eſt moins abondante. Le Geranium *pratenſe. Linn.* s'y rencontre auſſi aſſez communément.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

FUMARIA *claviculata. Linn.* Dans les endroits pierreux & parmi les rochers, ſur un ſol ſabloneux; & quelquefois autour des eaux ſtagnantes. Fleurit en Mai.

DECANDRIA.

ANTHYLLIS *Vulneraria. Linn.* Dans les pâturages ſecs & montueux, ſur-tout dont le ſol eſt crayeux. Fleurit en Mai & Juin.

Cette plante eſt ſujette à varier beaucoup dans

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſter-shire.

la couleur de ſes fleurs. On la trouve en différens endroits avec des fleurs blanches, ou jaunes, ou rouges, ou écarlate. Linné penſe que cette variation dépend en grande partie de la différence des terreins, ayant obſervé qu'en certains lieux où le ſol étoit une glaiſe rougeâtre, les fleurs de cette plante étoient rouges, & qu'ailleurs où le ſol paroiſſoit compoſé d'une argille blanche, il trouvoit ces mêmes fleurs de couleur blanche. *Voy. Fl. Suec. p.* 215.

LATHYRUS *ſylveſtris. Linn.* Dans les bois & ailleurs.

LATHYRUS *paluſtris. Linn.* Dans les lieux aquatiques & ſur les fondrieres.

HEDYSARUM *Onobrychis. Linn.* Je ne l'ai pas trouvé chez nous; mais dans le Lincolnshire. Fleurit en Mai & Juin.

TRIFOLIUM *ſubterraneum. Linn.* Très-commun ſur les rives ſeches, ſabloneuſes. Fleurit en Mai.

TRIFOLIUM *ſcabrum. Linn.* Sur les rives ſeches.

TRIFOLIUM *glomeratum. Linn.* Dans les enclos.

TRIFOLIUM *ſtriatum. Linn.* Dans les jacheres.

TRIFOLIUM *arvenſe. Linn.* Sur les bords des ruiſſeaux.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

HYPERICUM *humifuſum. Linn.* Dans les landes & terreins ſabloneux ſtériles. Fleurit en Juillet.

HYPERICUM *pulchrum. Linn.* Dans preſque tous nos bois. Fleurit en Juillet.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

LACTUCA *ſaligna. Linn.* Dans les chemins creux & ombragés.

HIERACIUM *umbellatum. Linn.* Dans preſque tous nos bois, & parmi les rochers. Fleurit en Juin & Juillet.

Cette plante eſt ſujette à varier beaucoup, & nous paroît avoir été diviſée en pluſieurs eſpeces par les Auteurs. Nous avons obſervé que dans les bois elle devient plus branchue & pouſſe beaucoup plus de feuilles, qui ſont auſſi plus larges, de couleur plus obſcure, & ſes fleurs ſont d'un jaune plus pâle, que lorſqu'on la trouve en plein air; & nous croyons que c'eſt la plante que le Docteur Deering a priſe, dans le *Catalogus Nottinghamenſis*, pour la pul-

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſter-ſhire.

monaire des François (Hieracium *murorum. Linn.*); car nous n'avons rencontré que cet *hieracium* dans les lieux qu'il indique, au lieu de la pulmonaire qui ne s'y trouve point.

CARDUUS *eriophorus. Linn.* Commun ſur les terreins montueux. Fleurit en Juillet & Août.

CARDUUS *heterophyllus. Linn.* Fleurit en Juin, & eſt très-rare dans ces contrées.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

TUSSILAGO *hybrida. Linn.* Elle fleurit en Mai, & eſt preſque auſſi fréquente ici que la pétaſite ordinaire.

SOLIDAGO *Virgaurea. Linn.* On la trouve dans les lieux montueux & boiſés. Fleurit en Juillet & Août.

INULA *Pulicaria. Linn.* Elle eſt très-rare ici, quoique, au rapport de M. Watſon, on la trouve abondamment autour de Londres.

MONOGAMIA.

JASIONE *montana. Linn.* Abondante dans les bois. Fleurit en Juin & Juillet.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

ORCHIS *bifolia. Linn.* En petite quantité dans quelques clos.

ORCHIS *biſolia. c. Linn.* Dans les bois. Fleurit en Mai.

OPHRYS *ſpiralis. Linn.* Fleurit en automne. Je l'ai obſervée en certains endroits avec le Gentiana *Amarella. Linn.*; mais elle eſt très-peu abondante.

OPHRYS *ovata. Linn.* Dans les bois & les prés. Fleurit en Mai. Peu abondante ici.

SERAPIAS *grandiflora. Linn.* Dans les bois. Fleurit en Juin.

SERAPIAS *grandiflora. b. Linn.* Dans les fondrieres & les marécages. Fleurit en Juin.

MONOECIA.

POLYANDRIA.

CERATOPHYLLUM *ſubmerſum. Linn.* Dans les foſſés & les étangs; mais il n'eſt pas très-commun. Le Myriophyllum *ſpicatum. Linn.* l'eſt beaucoup davantage.

POTERIUM *Sanguiſorba. Linn.* Dans les pâturages ſecs & montueux, ſur-tout dont le ſol eſt crayeux. Fleurit en Juin.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſter-ſhire.

DIOECIA.

DIANDRIA.

SALIX *fuſca. Linn.* Sur les côteaux ; mais peu abondamment.

Cet arbuſte, dont Parkinſon a donné une bonne figure, ſous le nom de *Salix humilis latifolia & alpina repens.* 1432, *fig.* 1433, paroît ſe rapporter au Salix *fuſca* de Linné ; & la forme de ſa feuille eſt mieux repréſentée par la fig. *r*, pl. 8 du *Flora Lapp.*, que par aucune autre ; mais comme Linné a omis cette eſpece dans le *Flora Anglica*, nous ne ſommes pas trop fondés à adopter ſon ſynonyme. La deſcription que donne Haller de ſon *Salix foliis lævibus ovatis, ſpicâ rariſſimâ*, dans l'*Enum. Stirp. Helvet. p.* 134, & dans l'*Iter Helv. Opuſc. Bot. p.* 301, 302, répond paſſablement à notre arbuſte : *Sed omnes ferè ſalicum ſpecies difficillimè extricantur.*

POLYGAMIA.

MONOECIA.

VALANTIA *Cruciata. Linn.* Parmi les haies & les buiſſons. Fleurit en Mai & Juin.

Cette plante qui eſt rare en quelques provinces

d'Angleterre, croît très-abondamment ici preſque par-tout.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſterſhire.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

OPHIOGLOSSUM *vulgatum. Linn.* Dans les bois humides, les prés & les pâturages. Fleurit en Mai. Elle n'eſt pas très-abondante.

OSMUNDA *Lunaria. Linn.* Dans les clos, dans les prés.

OSMUNDA *regalis. Linn.* Dans les bois humides, les fondrieres & les marais. Fleurit en Juin & Juillet.

OSMUNDA *Spicant. Linn.* Abondante dans les bois.

ASPLENIUM *trichomanoides. a. Linn.* Sur les vieux murs.

ASPLENIUM *trichomanoides. b. Linn.* Sur les rochers.

On trouve ici communément l'Aſplenium *Adiantum nigrum. Linn.* dans les bois, parmi les rochers & ſur les vieux murs de pierre : les Herboriſtes le vendent ſouvent pour l'eſpece précédente ; mais c'eſt une erreur de peu d'importance, ces deux eſpeces ayant ſans doute à-peu-près les mêmes vertus.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſter-shire.

POLYPODIUM *aculeatum. Linn.* Dans les bois. Il n'eſt pas très-commun.

MUSCI.

On ſait que l'Angleterre eſt de tous les pays du monde celui qui contient le plus grand nombre de mouſſes. Nous en avons diſtingué au moins une centaine d'eſpeces qui toutes ſont très-communes chez nous ; mais ce ſeroit nous écarter de notre plan que d'en inférer ici pluſieurs. Nous ne ferons mention que de quelques-unes des plus rares.

BRYUM *glaucum. Linn.* Je l'ai obſervé parmi le Sphagnum *paluſtre. Linn.*, qui eſt beaucoup plus fréquent.

JUNGERMANNIA *furcata. Linn.* Autour des racines des arbres, parmi d'autres mouſſes ; mais peu abondante.

ANTHOCEROS *lævis. Linn.* Je l'ai trouvé ſur les bords des ruiſſeaux & des foſſés ; mais non pas communément. Il pouſſe ſes têtes en Avril.

LICHEN *pulmonarius. Linn.* Dans les bois, autour des racines des arbres & ſur les rochers ; mais on ne le trouve pas auſſi abondamment que d'autres eſpeces congéneres. Le Lichen *caninus. Linn.* eſt très-commun dans tous nos pâturages ſecs.

LICHEN *paſchalis. Linn.* Dans les bois.

LICHEN *fragilis. Linn.* Sur les rochers les plus élevés.

LICHEN *lanatus. Linn.* Sur les rochers.

On trouve auſſi dans nos bois le Lichen *hirtus* & le Lichen *floridus* de Linné.

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſterſhire.

Pluſieurs des eſpeces qui appartiennent à ce genre nombreux ſont en uſage dans l'Économie & dans la Médecine. Telles ſont le Lichen *pyxidatus. Linn.*, & le Lichen *ſubulatus. Linn.*, qu'on a vantés dans les toux invétérées : le premier ſurtout dans la coqueluche des enfans. La pulmonaire de chêne (Lichen *pulmonarius. Linn.*) n'a pas été moins fameuſe contre les conſomptions. Les Gens de l'Art font actuellement peu de cas de toutes ces plantes, à la réſerve du Lichen *caninus. Linn.*, que le Docteur Méad a introduit dans la pratique.

Leurs uſages économiques ſont beaucoup plus étendus. L'orſeille, par ſa propriété pour la teinture, forme une branche de commerce; mais ce n'eſt pas la ſeule eſpece propre à être employée de cette maniere : d'autres Lichens teignent en pourpre & en jaune; & il ſeroit d'autant plus intéreſſant d'en faire des eſſais, que ces plantes ſont extrêmement abondantes dans nos contrées.

Le Lichen *rangiferinus. Linn.* eſt la principale

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſter-ſhire.

nourriture des rennes, en hiver, dans les parties ſeptentrionales de la Laponie, & cette plante ſuffit ſouvent pour les engraiſſer.

On trouve dans le *Flora Œconomica*, *Amœn. Acad. Vol.* 1, l'indication de pluſieurs autres uſages économiques de cette famille de plantes, tirée des *Itinera* de Linné : Ouvrages dont la lecture nous eſt interdite, parce qu'ils ſont écrits en langue ſuédoiſe. Il eſt à regretter que parmi l'énorme quantité de livres beaucoup moins utiles & moins agréables qu'on a traduits, ceux-ci ne l'aient pas encore été dans une langue plus univerſellement connue.

TREMELLA *Noſtoc. Linn.*

Ce végétal n'eſt pas très-commun ici. Je l'ai obſervé après la pluie, dans les pâturages, ſur-tout autour des haies. Nos campagnards le nomment *Tar-ſlough ;* & comme on le voit principalement après les pluies, quelques-uns croient, comme en Suede, qu'il tombe des nues.

ULVA *inteſtinalis. Linn.* Très-abondamment dans la riviere Soar.

FUNGI.

AGARICUS *piperatus. Linn.* En abondance dans les bois, où je les ai vus ſouvent conformes à tous

égards à la variété nommée par Vaillant : *Fungus lacteus maximus, infundibuli formâ. Bot. Par. p.* 61, *n°.* 8.

AGARICUS *umbelliferus. Linn.*

J'ai obſervé ce joli petit champignon s'élevant parmi les feuilles pourries au fond des haies, & dans les bois. Il eſt exactement repréſenté par la figure de Micheli, *p.* 166, *n°.* 3, *tab.* 80, *fig.* 11, & répond aux deſcriptions d'Haller & de Vaillant.

BOLETUS *bovinus. Linn.* Abondamment dans les bois.

Ce champignon eſt bon à manger; & Micheli nous apprend qu'on le vend avec les autres dans les marchés en Italie. Les vaches en mangent; mais il rend leur lait très-nauſéeux. *Fl. Œconom.*

POLYPORUS *exiguus coriaceus albus, lignis adnaſcens. Mich. p.* 130, *tab.* 70, *fig.* 7. *Boletus albicans, poris tenuiſſimis. Deering. Cat. Nottingham.* 86.

J'ai trouvé ce champignon ſur les chicots des arbres; mais il n'eſt pas commun ici. Le Docteur Deering l'ayant communiqué au fameux Profeſſeur d'Oxford, feu M. Dillen, il le lui renvoya avec la dénomination qu'on vient de lire, comme une eſpece non décrite.

HYDNUM *imbricatum. Linn.*

Ann. 1756. Tom. 49. 2e. partie. Plantes rares du Leiceſter-shire.

J'ai obſervé quelquefois cette eſpece autour de Leiceſter ; mais elle eſt très-rare.

HELVELA *Mitra. Linn.* Dans les pâtis. Il n'eſt pas commun ici.

ÆCIDIUM *tuberoſum reniforme. Hill. Hiſt. Pl. p.* 64.

On le trouve ſur les vieux arbres.

ÆCIDIUM, *quod lichen-agaricus bullatus parvus ex obſcuro nigricans, ſub cute arborum exſiccatarum erumpens. Mich. p.* 105, *tab.* 54, *fig.* 2, *Hall. Helv. p.* 91.

J'ai fréquemment obſervé cette eſpece ſur les bûches pourries dans les lieux humides.

AGARICUS *ſupernè villoſus & verſicolor, infernè corrugatus & violaceus. Hall. Helv.* 59.

AGARICUS *membranaceus ſinuoſus, ſubſtantiæ gelatinæ. Cat. Giſſ. p.* 194. *Raii Syn. p.* 21.

Ces deux eſpeces ſe trouvent ſur le bois pourri ; mais elles ne ſont pas communes.

CLAVARIA *lutea minima. Mich. p.* 208, *n°.* 9, *tab.* 87, *fig.* 5.

CLAVARIA *vermiculata fiſtuloſa candida. Mich. p.* 209, *tab.* 87, *f.* 13. *Hall. Helv. p.* 14.

J'ai trouvé quelquefois ces deux-ci dans nos pâturages ; mais ellesn'y ſont pas très-communes.

CLAVARIA *Coralloides. Linn.* Dans les pâturages.

CLAVARIA *Coralloides* (*Var.*) *Linn.* Dans les pâturages.

CLAVARIA *Hypoxylon. Linn.* Autour du bois pourri, ſur-tout du frêne. Aſſez commun.

Le Docteur Haller ſuppoſe que le *fungus niger compreſſus, variè divaricatus & implexus inter lignum & corticem. Raii Syn.* 15, *n°.* 9, n'eſt que la racine de ce champignon formant une expanſion réticulaire entre l'écorce & le bois. Nous avons ſouvent obſervé ce *fungus reticulatus* autour de Leiceſter. Il eſt exactement repréſenté par Micheli (pl. 66, fig. 3), qui l'a rangé parmi les agarics.

LYCOPERDON *ſtellatum. Linn.*

GEASTER *volvæ radiis & operculo elevatis. D. Watſon. Act. Philoſ. n°.* 474.

Ces deux jolies veſſes de loup ont été trouvées près de Loughborough.

ART. XI.

Mémoire hiſtorique ſur un genre de plantes nommé Lichen *par Micheli, Haller & Linné, & compris par Dillen ſous les noms d'*Uſnea, Coralloides & Lichenoides; *où l'on traite principalement des différens uſages de ces plantes. Communiqué par le Docteur Guillaume Watſon, Membre de la Société Royale. Lu le 27 Avril & le 4 Mai* 1758.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

— Natura nihil fruſtra creaverit. Poſteros tamen tot inventuros utilitatis ex muſcis auguror, quot ex reliquis vegetabilibus. CUI BONO? *Amœnitates Acad.* T. III, p. 241.

Les reſtaurateurs de la Botanique, dans le ſeizieme ſiecle, ne donnerent que très-peu d'attention à la claſſe des mouſſes en général. Ils prirent à la vérité quelques peines pour diſtinguer les eſpeces particulieres dont les Auteurs avoient fait mention; mais ils négligerent preſque tout le reſte. Ils ne furent cependant pas très-heureux, s'il faut en croire les Botaniſtes modernes, dans l'application qu'ils firent des noms anciens aux plantes qu'ils avoient ſous les yeux; & on ne ſera point ſurpris de

de leur peu de succès en ce genre, si l'on fait attention à la trop grande concision & à la fréquente obscurité des descriptions que les Anciens nous ont laissées. Dans la classe des mousses, comme dans les autres, les détails qui nous ont été transmis ne sont gueres plus qu'un amas confus d'incertitudes.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Histoire des Lichens.

C'est aux Modernes qu'on doit la découverte du plus grand nombre de plantes de cette classe. Parmi nos concitoyens, MM. Ray, Buddle, Dale, Doody, Petiver, Morison, Sherard, Richardson, &c. & parmi les étrangers, MM. Vaillant, Micheli & le célebre Haller se sont distingués dans cette partie de la Botanique; mais aucun n'y a fait autant de progrès que le savant & infatigable Professeur d'Oxford, feu Dillen, comme le prouve son immortel Ouvrage sur cette matiere.

On trouve le nom de *Lichen* dans les Ouvrages de Dioscoride & de Pline; & quoiqu'il puisse y avoir du doute, il est au moins probable que Dioscoride a décrit sous ce nom la plante même, ou du-moins une de ses congéneres, à laquelle les Commentateurs sont convenus d'appliquer sa description. Ce nom a été depuis employé diversement par différens Auteurs; & il est à remarquer que l'hépatique des boutiques, *lichen sive hepatica. Off.* n'est pas comprise sous ce terme générique, dans la distribution systématique des plantes de cet Ordre faite

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

par les trois Auteurs dont je viens de parler. Ils comprennent ſous le nom de *lichen*, & Dillen ſous ceux d'*uſnea*, *coralloides* & *lichenoides*, les mouſſes d'arbre chevelues ou uſnées des boutiques (hairy tree moſs); la pulmonaire d'arbre (tree lungwort) ou pulmonaire de chêne (oak-lungs), *muſcus pulmonarius*; l'hépatique terreſtre cendrée (ash coloured ground liver-wort), *lichen terreſtris cinereus*; les mouſſes corallines (coralline moſſes), les mouſſes à urnes (cup-moſſes), les mouſſes à cornes (horn-moſſes); l'orſeille (orchel, or Canary weed); le *muſcus iſlandicus* de Bartholin, & une multitude d'autres qu'on trouve ſur les arbres, ſur les murs, ſur les rochers & ſur les pierres, dans toutes les parties du monde; & qui dans bien des endroits ſont en très-grande abondance.

Gaſpard Bauhin dans ſon *Pinax*, Jean Bauhin, nos compatriotes Gerard & Parkinſon, & les Auteurs contemporains, ayant écrit avant le tems où les caracteres génériques ont été introduits dans la Botanique, comprirent ces lichens parmi les autres mouſſes herbacées, ſous le nom général de *muſcus*, auquel ils ajouterent pour chaque eſpece quelque épithete relative à ſa forme, au lieu où elle croît, ou à la vertu qu'on lui ſuppoſoit.

M. Ray, dans ſon Hiſtoire des plantes & dans le ſupplément, ſuivant ſa répugnance ordinaire à

forger de nouveaux noms, les a distribués parmi les autres mousses, sous le caractere de *musci steriles seu aspermi*, en conservant à chaque espece les synonymes des deux Bauhin, de Gerard & de Parkinson.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Histoire des Lichens.

Le Docteur Morison paroît avoir été le premier qui les ait entierement séparés des mousses herbacées; & d'après l'analogie qu'il leur supposoit avec la classe des champignons, il en forma un genre qu'il nomma *musco-fungus*. Il en a compté au delà de cinquante especes sous ce nom, dans son *Historia Oxonienſis*, & les a divisées en cinq Ordres, suivant leurs diverses apparences: comme il suit,

1. *Musco-fungi è terrâ prominentes, latiores.* 5.
2. *Musco-fungi pixidati.* 11.
3. *Musco-fungi corniculati.* 26.
4. *Musco-fungi crustæ modo adnascentes.* 37.
5. *Musco-fungi corticibus arborum dependentes.* 53.

La 7e. planche de sa section 15e. présente plusieurs bonnes figures de quelques-uns de ces Lichens.

Tournefort fut le premier qui leur appliqua le terme générique de lichen; mais ce fut parce qu'il les joignit au lichen des boutiques. Il a néanmoins exclu les mousses corallines, & en a formé un genre sous le nom de *coralloides*, auquel il a joint quel-

Ann. 1758. Tom. 50. ae. partie. Hiſtoire des Lichens.

ques plantes qui appartiennent proprement à la claſſe des champignons. Boerhaave a ſuivi cette diſtribution dans ſon *Index Alter Plantarum.*

Le Docteur Dillen les nomma d'abord *lichenoides*, dans ſon Catalogue des plantes des environs de Gieſſen, conſervant le nom de lichen à l'hépatique des boutiques. Cependant il ne comprend pas ſous ce nom, dans l'Ouvrage cité, les uſnées ou mouſſes d'arbre chevelues, qu'il rapporte aux *conferva*, ajoutant à chaque eſpece l'épithete *arborea*, pour les diſtinguer des aquatiques. Il fait l'énumération de plus de ſoixante eſpeces de *lichenoides*; mais il ne leur applique preſque point de ſynonymes.

Il les a introduits ſous le même terme générique dans la 3e. édition du *Synopſis* des plantes britanniques, de Ray, en y joignant les uſnées; & il en compte au delà de quatre-vingt-dix eſpeces, qui toutes croiſſent ſpontanément en Angleterre. Il y en a un grand nombre qui ne ſont indubitablement que des variétés; elles ſont diviſées très-naturellement dans le même Ouvrage en pluſieurs Ordres & ſubdiviſions, qui les rendent plus faciles à diſtinguer. En voici le tableau.

- LICHENOIDES
  - *Caulifera*
    1. *Capillacea & non tubuloſa ſcutellata.*
    2. *Coralliformia, tuberculoſa plerumque . . . .*
       - a. *Solida & non tubuloſa.*
       - b. *Tubuloſa.*
    3. *Pixidata.*
    4. *Fungiformia.*
  - *Cauliculis deſtituta*
    1. *Merè cruſtacea.*
    2. *Cruſtâ foliosâ ſcutellatâ, ſeu foliis ſcutellatis arctè adnaſcentibus . . . . .*
       - a. *Subſtantiæ gelatinoſæ.*
       - b. *Subſtantiæ durioris.*
    3. *Foliis magis liberis, nec tam arctè adnaſcentibus . . . . .*
       - a. *Scutellatis & tuberculatis.*
       - b. *Subſtantiæ durioris.*

M. Vaillant, dans le *Botanicon Pariſienſe*, a conſervé les noms de Tournefort. Un grand nombre de ces lichens, ainſi que d'autres mouſſes, ſont exactement repréſentés dans les planches élégantes qui ornent cet Ouvrage. Le Docteur Haller nous dit qu'il a appris à diſtinguer preſque toutes les mouſſes par le ſeul ſecours de ces planches, tant la nature y eſt naïvement repréſentée. Les amateurs de la Botanique doivent ſavoir gré à Boerhaave d'avoir été l'éditeur de ce bel Ouvrage.

Micheli, d'après Tournefort, adopte le terme *lichen*, & comprend ſous ce nom toutes les eſpeces, à l'exception d'une ou deux qu'il nomme *lichenoides*. Cet Auteur ne renferme cependant pas,

Ann. 1758 Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

ſous ce genre, l'hépatique de la matiere médicale, qu'il décrit ſous le nom de *marchantia*; & il a employé près de 20 planches de ſon *Nova Plantarum Genera*, pour repréſenter différentes eſpeces de ce genre. Les lichens dans cet Ouvrage ſont diviſés en 38 ordres ou ſubdiviſions. Il n'en falloit pas moins, ſi l'on conſidere combien *Micheli* a multiplié le nombre des eſpeces : méthode erronée qui ne ſert qu'à mettre de la confuſion & de l'embarras dans la Botanique, & par conſéquent à en retarder les progrès.

Le Docteur Haller a conſervé le nom générique de Micheli, & compte 160 eſpeces de lichen dans ſon *Enumeratio Stirpium Helvetiæ*. Il les diviſe en ſept Ordres ſous les titres ſuivans.

1. *Lichenes corniculati & pixidati.*
2. —— *coralloidei.*
3. —— *fruticoſi alii.*
4. —— *pulmonarii.*
5. —— *cruſtacei, ſcutis floralibus ornati.*
6. —— *ſcutellis ornati.*
7. —— *cruſtacei, non ſcutati.*

Le grand nombre des eſpeces & la difficulté de les diſtinguer avec un certain degré de certitude a empêché le Docteur Haller, d'ajouter aux plantes de ce genre une ſuite de ſynonymes auſſi longue & auſſi complette, qu'il l'a fait ailleurs dans ce

magnifique Ouvrage. Sa pl. 2 préſente pluſieurs jolies eſpeces de ces lichens.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

Linné & les Auteurs qui ont ſuivi ſa méthode, ayant fondé leur caractere générique ſur les découvertes de Micheli, ont auſſi adopté ſa dénomination générique. Le penchant qu'avoit Micheli pour la multiplication des eſpeces, n'eſt nulle part plus viſible que dans ce genre, dont il a porté les eſpeces juſqu'au nombre énorme de 298. On ne ſauroit imputer la même foibleſſe au Profeſſeur ſuédois; tous ſes écrits enſeignent le contraire, & ce n'eſt pas leur moindre mérite. Il a tellement retranché ce genre, que dans ſon énumération générale des plantes, il ne compte que 80 eſpeces de lichen, qu'il a diſtribuées dans cet Ouvrage en huit Ordres, ſuivant les différences qu'elles préſentent dans leur *facies externa*, en n'ayant que peu ou point d'égard à ce qu'on nomme ordinairement les parties de la fructification.

1. *Lichenes leproſi tuberculati.*
2. — *leproſi ſcutellati.*
3. — *imbricati.*
4. — *foliacei.*
5. — *coriacei.*
6. — *ſcyphiferi.*
7. — *fruticuloſi.*
8. — *filamentoſi.*

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

Le Docteur Dillen, dans ſon excellent Ouvrage intitulé *Hiſtoria Muſcorum*, a diviſé ce genre de Micheli en trois, ſous les noms d'*uſnea*, *coralloides* & *lichenoides*. Il comprend ſous celui d'*uſnea*, les mouſſes d'arbre chevelues, parmi leſquelles ſont l'uſnée des boutiques & la vraie uſnée des Arabes; il en décrit ſeize eſpeces. Sous celui de *coralloides*, il décrit trente-neuf eſpeces, parmi leſquelles ſont les mouſſes à urnes, & beaucoup d'autres, diſpoſées dans l'ordre ſuivant.

ORDO I. *Fungiformia, non tubuloſa, nec ramoſa.* 5.

ORDO II. *Scyphiformia, tubuloſa, ſimplicia & prolifera.*

Series 1. *ſcyphis perfectioribus.* 13. Ce ſont les mouſſes à urnes (cup-moſſes).

Series 2. *ſcyphis imperfectis.* 20. Mouſſes à cornes (horned-moſſes).

ORDO III. *Ramoſa fruticuli ſpecie, ſummitatibus acutis multifariàm diviſis.*

Series 1. *ſpecies tubuloſæ.* 30. Mouſſes corallines tubulées.

Series 2. *ſpecies ſolidæ.* 39. Mouſſes corallines ſolides, parmi leſquelles eſt l'orſeille.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

Le genre *lichenoides* contient 135 eſpeces, diſpoſées de la maniere qui ſuit :

ORDO I. *Species aphyllæ merè cruſtaceæ.*
1. *tuberculoſæ.* 8.
2. *ſcutellatæ.* 18.

ORDO II. *Species folioſæ.*
1. *gelatinoſæ tuberculoſæ & ſcutellatæ.* 35.
2. *aridiores & exſuccæ ſcutellatæ.* 100.
3. *aridiores peltatæ & clypeatæ.* 121.

Ces plantes ſont bien décrites & accompagnées du plus parfait aſſemblage de ſynonymes ; & en outre chaque eſpece eſt exactement figurée : pluſieurs le ſont ſous différentes faces, & dans des états d'accroiſſement différens ; auſſi doit-on regarder cet Ouvrage comme un des plus complets qui exiſtent dans la Botanique, quoiqu'il traite des objets les plus menus, & par conſéquent les plus difficiles de cette ſcience.

Le Docteur Hill, dans ſon Hiſtoire des plantes, a diſpoſé les lichens en cinq genres, ſous les noms ſuivans :

1. *Uſnea.* Comprenant les mouſſes d'arbre chevelues.

2. *Platyſma.* Les mouſſes d'arbre à rameaux plats : la pulmonaire & autres.

3. *Cladonia.* Contenant l'orſeille & les mouſſes corallines.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

4. *Pyxidium*. Les mouſſes à urnes.

5. *Placodium*. Les mouſſes écailleuſes.

Les plantes de ce genre ſi étendu ſont très-différentes dans leur forme, dans leur maniere de croître, & dans leur apparence générale. Auſſi les Auteurs qui les ont laiſſées ſous le même nom, ont-ils jugé néceſſaire de les arranger ſous différentes ſubdiviſions, pour rendre les eſpeces plus faciles à diſtinguer. C'eſt ſur le même principe que Dillen & Hill en ont fait pluſieurs genres.

Les parties de la fructification, autant qu'on peut les diſcerner ſur ces plantes, paroiſſent ſous diverſes formes dans les différentes eſpeces. Dans les unes, ſous la forme de tubercules; dans les autres, ſous la forme de petits plats concaves qu'on nomme *ſcutellæ*; dans d'autres, ſous celle d'écus plats & oblongs. Toutes ces parties ſont regardées par Micheli & par Linné comme les réceptacles des fleurs mâles; & ils ſoupçonnent que les fleurs femelles & les ſemences y ſont diſperſées ſous la forme de farine ou de pouſſiere ſur les mêmes plantes, & dans quelques cas ſur des individus ſéparés. Dillen n'a oſé prononcer rien de poſitif ſur les vraies parties de la fructification dans les lichens. Il y a lieu d'eſpérer que le tems éclaircira cette matiere.

Afin de donner une idée plus diſtincte des diverſes plantes de ce genre, qui ſervent aux uſages écono-

miques & médicinaux dans les différentes parties du monde, nous les diſtribuerons en pluſieurs Ordres, ſuivant l'uſage des Auteurs qui nous ont précédés; & comme il n'entre point dans notre plan de décrire chacune de ces eſpeces en particulier, nous renverrons aux Ouvrages les plus modernes qui en traitent, & auxquels on pourra avoir recours.

1. LICHENES FILAMENTOSI.

Compoſés de ſimples filamens ſolides, d'un tiſſu fort, mais flexible. Ayant l'apparence de fructification ſous la forme de ſcutellæ *ou de corps ronds & plats, croiſſant ſur les côtés ou à l'extrémité de ces filamens.*

Cet Ordre comprend les mouſſes d'arbre chevelues, ou *uſnea* de Dillen & de Hill, pluſieurs des eſpeces du 5e. Ordre des lichens de Micheli, & les *lichenes filamentoſi* de Linné.

Dillen décrit, ſous le nom d'*uſnea*, ſeize eſpeces dont pluſieurs ſe trouvent en Angleterre; quoiqu'il y en ait, comme l'uſnée ordinaire des boutiques, qui y ſont très-rares; & aucune n'y eſt en abondance. Les bois touffus, dans beaucoup d'autres endroits de l'Europe & du reſte du globe, en fourniſſent très-abondamment. Elles pendent aux branches de différentes ſortes d'arbres, comme de groſſes touffes de cheveux d'une longueur conſidérable. Quelques

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

eſpeces s'étendent à pluſieurs pieds de longueur. Les rochers au ſommet des hautes montagnes en produiſent de différentes ſortes. Elles ſont de diverſes couleurs: les unes blanchâtres, cendrées; les autres griſes ou noirâtres, & deux ou trois eſpeces ont une teinte jaune ou orangée.

Les Commentateurs en général s'accorderent à faire du *bryon* de Dioſcoride (*a*), une de ces mouſſes d'arbre chevelues qu'ils nommerent *uſnea*. Il n'eſt donc pas étonnant qu'au renouvellement des Lettres on ait diſputé pour ſavoir laquelle de ces mouſſes étoit l'*uſnea* des Anciens. Dioſcoride recommande la ſienne comme un aſtringent, & nous dit que « la meil» leure croît ſur le cedre; mais que ſur quelque arbre » qu'on la recueille, la plus blanche & la plus odo» rante eſt préférable à la noire ». Les uſnées ſe trouvoient ſans doute ſur différens arbres dans les différens pays. En Italie, celle du méleſe étoit la plus odoriférante; c'eſt pourquoi Matthiole (*b*) la préféroit à toutes les autres. L'eſpece qui enfin obtint une place dans les boutiques, comme étant l'*uſnea* des Anciens, & ſous le nom d'uſnée, ſe trouvoit communément dans nos contrées, ſur les vieux chênes & ſur d'autres arbres; c'eſt la mouſſe d'arbre

(*a*) *Lib.* 1. *c.* 20. Voyez ce ſujet amplement diſcuté dans Bodæus à Stapel, *Comment. in Theophr. p.* 156 *& ſeq.*

(*b*) *Opera omnia à C. B. edit.* 1598, *p.* 64.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

fibreuſe (ſtringy tree-moſs) de Dillen (*a*). On lui a attribué d'excellentes vertus, dans l'idée que c'étoit la véritable uſnée; mais il ne paroît pas qu'elle mérite cette réputation; & la pratique actuelle, dumoins en Angleterre, l'a entierement rayée des pharmacopées; probablement avec raiſon.

Le Docteur Dillen paroît cependant perſuadé que cette uſnée ordinaire, quoique reconnue pour telle dans les boutiques, n'eſt pas le *bryon* de Dioſcoride & de Pline, ou le *phaſcon* de Theophraſte; car il applique les noms que nous ont tranſmis ces Peres de la Botanique, à une autre eſpece qu'il nomme uſnée barbue (*b*); mais ni l'une ni l'autre ne paroiſſent être la véritable uſnée des Arabes, quelque titre que leur couleur ou leur odeur ſemblent leur donner à cette dénomination. Bellon, cité par Dillen, nous dit que « la véritable uſnée, ou *bryon* comme il la nomme, ſe vend à Conſtantinople ſous le nom d'*uſnech*; & ajoute que nous ſommes dans l'erreur en croyant que la nôtre eſt la

(*a*) *Uſnea vulgaris, loris longis implexis. Hiſt. Muſcor. p.* 56. *muſcus arboreus: uſnea offic. C. B. P. Raii Syn.* 3, *p.* 64. Lichen *plicatus. Linn.*

(*b*) *Uſnea barbata, loris tenuibus fibroſis. Hiſt. Muſc. p.* 63. *Querciſ excrementum villoſum. C. B. P.* 422. Lichen *barbatus. Linn.* Bauhin regardoit cette eſpece comme la vraie uſnée des Arabes.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

vraie uſnée. » Dillen décrit en conſéquence une autre eſpece (*a*) qu'il avoit reçue des Indes Orientales, de Madagaſcar & de Ste. Helene, comme l'*uſnea arabum*. Les Indiens nomment cette plante ſaliaga; & Camelli nous aſſure que quand elle eſt fraiche, elle a une très-forte odeur de muſc. Il ajoute qu'il a éprouvé lui-même ce que Serapion en dit: ſavoir, qu'infuſée dans le vin elle arrête les diarrhées & le vomiſſement, fortifie l'eſtomac & diſpoſe au ſommeil.

On prétend que l'uſnée ordinaire des boutiques étoit la baſe de cette belle poudre parfumée que les François nommoient *corps de cypre gris*, & qui formoit anciennement un grand article de commerce à Montpellier. Le Docteur Brown dit, dans ſon Hiſtoire Naturelle & Civile de la Jamaïque (en anglois) p. 80, que les Parfumeurs s'en ſervent encore; mais il n'ajoute pas en quel pays. Jean Bauhin donne le procédé entier (*b*) pour faire cette poudre, qui ſe vendoit de ſon tems en grande quantité dans toutes les parties de la France. Il eſt cependant vrai que d'autres lichens avoient

(*a*) *Uſnea ceratoides candicans glabra & odorata. Hiſt. Muſc. p.* 71. *Muſcus arboreus candicans & odorifer, Camelli. Raii Hiſt.* 3. *App. p.* 3. Lichen *Uſnea. Linn.*

(*b*) *Hiſt. Plant.* 1, *pars* 2, *p.* 88.

autant de part que l'uſnée dans cette compoſition ; car jamais ceux qui la fabriquoient n'auroient pu ſuffire aux demandes, s'ils s'étoient bornés à l'uſnée ſeule ; & cela eſt d'autant plus naturel à penſer, que pluſieurs autres eſpeces de lichen ſont également propres aux mêmes uſages (*a*).

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

Cette uſnée eſt très-abondante dans les bois de Laponie, & Linné rapporte (*b*) que les habitans en appliquent à leurs pieds, lorſqu'ils ſont douloureux & écorchés par des marches exceſſives. Le bon effet qu'ils en éprouvent dans ce cas, eſt dû ſans doute à ſa qualité ſtyptique, qui a été remarquée par Matthiole, & reconnue par M. Ray (*c*), d'après les Éphémerides d'Allemagne.

L'uſnée barbue dont nous avons parlé eſt extrêmement commune ſur les arbres, dans les parties ſeptentrionales de l'Europe & de l'Amérique, ainſi que dans l'Orient. Suivant la deſcription qu'en fait Mr. Ray, elle eſt compoſée de filamens qui ne ſont pas plus gros qu'un fil ordinaire, & qui pendent de la longueur de deux pieds. Elle eſt d'un blanc verdâtre. Les habitans de Penſylvanie s'en ſervent pour teindre en couleur d'orange. C'eſt de M. Bartram que Dillen en avoit été informé.

(*a*) *Flor. Lap. p.* 342. *e. Flor. Suec. Ed.* 2, *p.* 416.
(*b*) *Flor. Lap. p.* 348.
(*c*) *Hiſt. Plant.* 1, *p.* 115.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

L'uſnée noire à criniere, qui croît en quantité dans les bois de Laponie, fait partie du fourrage, à défaut de la mouſſe coralline ordinaire, & les rennes s'en accommodent également dans l'hiver (*a*).

L'uſnée longue à chapelet ou mouſſe à collier (*b*) ſert aux mêmes uſages économiques dans la Virginie, où elle eſt très-abondante. Les habitans en font un fourrage d'hiver très-agréable aux moutons & aux vaches (*c*).

Les Norwégiens retirent un ſingulier avantage d'une de ces uſnées. Pontoppidan rapporte, dans ſon Hiſtoire Nat. de Norwege (en anglois), p. 148, « qu'ils ont une certaine eſpece de mouſſe jaune, » pendante aux branches des pins & des ſapins, » qui eſt très-vénéneuſe, & dont ils ſe ſervent » à un uſage très-néceſſaire; ils la mêlent avec du » potage ou de la viande, & en font pour les loups un » appât qui les tue infailliblement ». On ne ſauroit douter que l'eſpece en queſtion ne ſoit l'uſnée à fils

(*a*) *Uſnea jubata nigricans. Dill. Hiſt. Muſc. p. 64. Muſcus corallinus ſaxatilis fœniculaceus (rock-hair). Raii Syn. 3, p. 65. n°. 7.* Lichen *jubatus. Linn.*

(*b*) *Uſnea capillacea & nodoſa. Dill. Hiſt. Muſc. 60. Muſcus arboreus nodoſus. C. B. P. 361. Raii Syn. 3, p. 65, n°. 4.* Lichen *articulatus. Linn.*

(*c*) *Raii Hiſt. Pl. 3, p. 28.*

fils de laiton (braſs-wired uſnea), de Dillen (*a*), ou Lichen *vulpinus* de Linné, puiſque ce dernier Auteur nous apprend qu'on en fait ailleurs, à très-peu de choſe près, la même application (*b*). Elle eſt très-rare en Angleterre, & abonde en Suede, ſur-tout dans la province de Smoland, où les habitans s'en ſervent pour teindre en jaune les étoffes de laine.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

Jean Bauhin décrit, ſous le nom de *laricus muſcus* (*c*), une très-belle eſpece d'uſnée qui donne une couleur ſuperbe, lorſqu'on la mâche ou qu'on la fait macérer dans l'eau. Dillen doute ſi ce n'eſt pas celle qu'il a décrite ſous le nom d'uſnée fourchue, couleur d'orange (*d*).

Nous obſerverons ici en paſſant que l'uſnée de crane humain, que la ſuperſtition avoit anciennement placée dans les catalogues de matiere médicale, n'appartient point à cette diviſion des lichens.

(*a*) *Uſnea capillacea citrina, fruticuli ſpecie. Hiſt. Muſc. p. 73. Muſcus aureus tenuiſſimus. Merret. Pin. p. 79. Raii Syn. 3, p. 65, n°. 8.*

(*b*) *Flor. Suec. Ed. 2, p. 427.*

(*c*) *Hiſt. Plant. 3, p. 2, lib. 9, p. 273.*

(*d*) *Uſnea dichotoma compreſſa, ſegmentis capillaceis teretibus. Hiſt. Muſc. 72. Muſcus arboreus aurantiacus, ſtaminibus tenuiſſimis. Pluck. Alm. p. 254. Raii Hiſt. 3, 28.*

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

Les Praticiens d'alors diſtinguoient deux ſortes d'*uſnea humana*, ſous les noms de *cruſtacea* & de *villoſa*. On employoit pour la premiere tout lichen cruſtacé; mais plus proprement le *lichenoides vulgatiſſimum*, &c. Lichen *ſaxatilis*. *Linn.*; & au rapport de Dale, c'étoit le plus eſtimé. L'*uſnea villoſa* étoit une eſpece d'*hypnum*. Dans le fait, il ne paroît pas qu'on fût très-attentif, dans ces tems d'ignorance, à déterminer exactement l'eſpece qu'on cherchoit; & ſans doute toute mouſſe qui venoit à croître ſur un crane humain ſuffiſoit pour l'uſage qu'on en vouloit faire.

II. LICHENES FRUTICULOSI.

Compoſés d'une matiere flexible, coriace, diſpoſée en ramifications, preſque ſimples dans quelques eſpeces; dans d'autres repréſentant de petits arbriſſeaux. Dans certaines eſpeces, les rameaux ſont entierement ſolides; dans d'autres, ils ſont tubulés.

Cet Ordre comprend le troiſieme Ordre du genre *coralloides*, de Dillen, tout le *cladonia* de Hill, le ſecond Ordre & quelques eſpeces du troiſieme des lichens de Haller; quelques eſpeces du cinquieme Ordre & tout le ſixieme de Micheli, & les *lichenes fruticuloſi* de Linné.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

Les plantes de ce genre croiſſent principalement ſur le terrein, dans les landes, les forêts & les lieux montueux ſtériles, à l'exception de l'orſeille (Canary-weed), qu'on trouve ſur les rochers, au bord de la mer.

C'eſt à cette diviſion qu'appartient la mouſſe cornue (*a*). On la trouve chez nous aſſez communément dans les terreins ſtériles, parmi les rochers & ſur les vieux murs. Elle étoit autrefois en grande réputation comme pectorale; mais on n'en fait plus de cas aujourd'hui.

La mouſſe coralline branchue ordinaire (*b*) eſt une des plantes les plus utiles de toute la famille des lichens. Elle eſt aſſez fréquente dans nos landes, nos forêts & nos montagnes. Les pays du nord la produiſent en abondance, & c'eſt ſur-tout là qu'elle eſt ſingulierement utile. Elle eſt vraiment la baſe & le ſoutien de toute l'économie rurale dans la Laponie; & ſans elle les Lapons ne pour-

(*a*) *Coralloides corniculis longioribus & rarioribus. Dill. Hiſt. Muſc. p.* 103. *Muſcus corniculatus. Ger. p.* 1372. *Parck.* 1308. *Raii Hiſt. I, p.* 112, 3, *p.* 28. *Lichenoides tubuloſum cinereum cruſtaceum, minuſque ramoſum. Raii Syn.* 3, *p.* 67. Lichen *ſubulatus. Linn.*

(*b*) *Coralloides montanum, fruticuli ſpecie, ubique candicans. Hiſt. Muſc. p.* 107. *Muſcus corallinus. Tab. Ger. Em.* Lichen *rangiferinus. Linn.*

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

roient faire paſſer l'hiver à leurs rennes. Linné nous aſſure (*a*) qu'il ne croît aucun végétal auſſi abondamment dans ce pays-là que ce lichen & ſes congéneres. Il y a des plaines de pluſieurs milles d'étendue, quien ſont totalement couvertes, comme d'une couche de neige; & là où aucune autre plante ne pourroit même prendre racine, celle-là profite & devient luxuriante. Ces déſerts affreux, qu'un étranger appelleroit l'apanage de la mort, ſont les fertiles pâturages de la Laponie. Les rennes paiſſent ce lichen en hiver, lorſqu'il eſt dans ſon état le plus floriſſant, & qu'on ne ſauroit avoir aucun autre végétal; il engraiſſe ces animaux précieux, dont le nombre fait la richeſſe des Lapons. En effet, ils ſe couvrent de leurs peaux, ſe nourriſſent de leur chair, & font du beurre & du fromage de leur lait. La nature dans ces climats rigoureux ſe refuſe preſqu'entierement à toute culture. Les Lapons ne ſement ni ne moiſſonnent. Ils paſſent leur vie dans une migration perpétuelle, avec leurs troupeaux de rennes, auxquels ils conſacrent tous leurs ſoins.

Le lait des rennes eſt très-gras & très-ſubſtantiel. Il reſſemble par le goût à du lait de vache, avec lequel on auroit intimement uni du beurre & une

(*a*) *Flor. Lappon. p.* 332.

petite quantité de graiſſe ou de ſuif. Le Docteur Haller (*a*) ſoupçonne que la richeſſe de ce lait provient du lichen dont les rennes ſe nourriſſent. La plupart des plantes de cette famille ont une qualité aſtringente qui ſe manifeſte au goût : cette aſtriction dans la nourriture contribue ſans doute beaucoup à donner tant de conſiſtance au lait de ces animaux.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

Les rennes ne ſont pas les ſeuls beſtiaux qui ſe nourriſſent de la mouſſe coralline. Les nouveaux colons (*b*) en amaſſent de grandes proviſions pour nourrir leurs bœufs durant l'hiver. Ils ont ſoin de la rateler dans les ſaiſons pluvieuſes, pendant qu'elle eſt ferme & ſouple ; car dans les tems ſecs, elle tombe facilement en pouſſiere. Ils l'humectent avec un peu d'eau en hiver lorſqu'ils l'emploient, & trouvent que c'eſt un excellent fourrage.

Les mouſſes corallines ſont ſujettes à varier beaucoup, & quoiqu'il y en ait pluſieurs eſpeces réellement diſtinctes, elles ſe confondent tellement enſemble, qu'il n'eſt point aiſé dans bien des cas de

(*a*) *Enum. Stirp. Helv. p.* 69, *n°.* 38.

(*b*) C'eſt une colonie de Finlandois qui s'eſt établie en Laponie depuis quelques années, & qui trafique avec les anciens habitans.

Ann. 1758. Tom. 50. pe. partie. Hiſtoire des Lichens.

déterminer leurs véritables caracteres ſpécifiques. Quelques eſpeces ſont parfaitement blanches; d'autres ont les extrêmités de leurs branches rougeâtres; dans quelques-unes elles ſont brunes, & dans d'autres preſque noires. La mouſſe coralline ordinaire en Laponie croît aſſez ſouvent à pluſieurs pouces, & même juſqu'à un pied de hauteur.

Les mouſſes corallines branchues, tubulées ou creuſes, ne ſont pas les ſeules que broutent les rennes. Preſque tous les lichens ſont répandus avec bien plus de profuſion dans les climats ſeptentrionaux que dans ceux que nous habitons. Il y en a pluſieurs eſpeces à branches ſolides. Celle que Dillen nomme *coralloides criſpum & botryforme alpinum* (*a*) y eſt preſque auſſi abondante que l'eſpece ordinaire, & plait également à ces animaux (*b*). Nous avons dit plus haut qu'à défaut de ces mouſſes, l'uſnée à criniere noire (black mane-uſnea) eſt un *ſuccedaneum* dont ces animaux s'accommodent ſans peine.

(*a*) *Hiſt. Muſc. p.* 114. *Lichenoides non tubuloſum cinereum ramoſum, totum cruſtaceum. Raii Syn.* 3, 66, n°. 11. Lichen *paſchalis. Linn.*

Cette mouſſe n'eſt pas commune en Angleterre. Le Docteur Dillen l'a trouvée ſur quelques-unes des montagnes du pays de Galles. On la trouve auſſi en Leiceſtershire.

(*b*) *Flor. Lappon.* n°. 489.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

Une autre plante des plus remarquables & des plus utiles de cette diviſion eſt l'orſeille (orchel ou argol, comme on la nomme vulgairement) (*a*). Celle-ci entre plus qu'aucune autre de ce genre dans nos uſages économiques. Tout le monde ſait qu'elle forme un article conſidérable dans la partie des teintures, où on l'emploie de pluſieurs manieres. Sa propriété colorante a été connue des Anciens; & quelques-uns de nos plus célebres Auteurs de Botanique penſent qu'on s'en ſervoit pour la teinture dès le tems de Théophraſte. Ce Pere de la Botanique fait mention d'un fucus, qui croît, dit-il, ſur les rochers, autour de l'iſle de Crete, & avec lequel on teignoit en pourpre, ou plutôt en rouge les vêtemens de laine.

L'orſeille croît ſur les rochers des bords de la mer, dans bien des endroits de l'Archipel, & dans les iſles Canaries, d'où nous la tirons pour l'ordinaire, ainſi que du Cap verd, qui en produit abondamment. Les demandes pour cet article ſont ſi conſidérables, au rapport de M. Hellot, de

(*a*) *Coralloides corniculatum tinctorium, fuci teretis facie. Dill. Hiſt. Muſc. p.* 110. *Cladonia tophacea. Hill. Hiſt. Pl. p.* 93. *Fucus capillaris tinctorius. Raii Hiſt.* 1, *p.* 74. Lichen *Roccella*, fruticuloſus ſolidus aphyllus ſubramoſus, tuberculis alternis. *Linn.*

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

l'Académie Royale des Sciences (*a*), qu'on en recueille annuellement, pour terme moyen, 500 quintaux dans l'iſle de Ténériffe ; 400 dans les iſles Canaries ; 300 dans Forte ventura ; 300 dans Lancerota ; autant dans Gomera ; & 800 dans l'iſle de Fer.

La préparation de l'orſeille pour l'uſage des teintures a été long-tems un ſecret, connu de peu de perſonnes ; mais on la prépare maintenant en perfection à Londres & en d'autres endroits de l'Europe. M. Ray a donné, d'après Impératus, une deſcription ſommaire du procédé (*b*). Micheli en a publié depuis un détail plus circonſtancié (*c*). C'eſt du moins la méthode qu'emploient les Teinturiers de Florence. Dans les deux procédés, l'urine & la potaſſe ſont les principaux ingrédiens qui ſervent à extraire la couleur.

Pluſieurs autres plantes de ce genre contiennent la même matiere tophacée que l'orſeille ; & on a trouvé par expérience qu'elles donnent une bonne teinture. Micheli, après avoir rapporté la préparation de l'orſeille, fait la même obſervation. M.

(*a*) L'Art de la teinture des laines & des étoffes de laine. Paris. 1750, p. 543.

(*b*) *Raii Hiſt. Pl.* 1, *p.* 74.

(*c*) *Nova Plant. Gen. p.* 78.

Hellot nous dit, dans le Traité cité plus haut, qu'il y a beaucoup d'autres lichens, propres à fournir une auſſi bonne couleur que l'orſeille ; & il ajoute que M. Bernard de Juſſieu lui en avoit apporté de la forêt de Fontainebleau, qui mis à l'épreuve avec de l'urine & de la chaux prirent une couleur pourpre. Nous indiquerons quelques-unes de ces eſpeces dans la ſuite de ce mémoire. M. Hellot nous a donné un procédé pour diſtinguer les lichens propres à fournir une couleur rouge ou pourpre : le voici.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie, Hiſtoire des Lichens.

« Mettez environ deux drachmes d'un lichen » quelconque dans un petit bocal de verre. Humectez-les bien avec parties égales de forte eau » de chaux & d'eſprit volatil de ſel ammoniac : » liez une veſſie humide à l'orifice du vaiſſeau, & » laiſſez-le en cet état pendant trois ou quatre » jours. Au bout de ce tems, ſi le lichen a la » propriété deſirée, la petite quantité de liqueur » que vous trouverez dans le vaiſſeau ſera d'un » rouge cramoiſi foncé ; & la plante conſervera » la même couleur quand tout le liquide ſe ſera » évaporé. Si ni la liqueur ni la plante n'ont pris » aucune couleur, il eſt inutile de la ſoumettre à » d'autres épreuves ».

Ce procédé eſt ſimple & facile ; il mérite l'atten-

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

tion de tous ceux qui ſont diſpoſés à faire des expériences en ce genre. Il vaudroit certainement la peine d'eſſayer ſi pluſieurs lichens que nous avons en ſuffiſante quantité chez nous, ne rempliroient pas le même objet.

III. LICHENES PYXIDATI.

Compoſés d'une matiere ferme coriace flexible, diſpoſée en tiges ſimples tubulées, dont les ſommets ſont élargis en forme de petites coupes.

Cette diviſion contient les mouſſes à coupes (cup-moſſes) des Auteurs; le ſecond Ordre des *coralloides* de Dillen; une grande partie du premier Ordre des lichens dans Haller; les 7e. 8e. 9e. & 10e. Ordre dans Micheli; & les *lichenes ſcyphiferi* de Linné. Le Docteur Hill a fait un genre entier de ces mouſſes à coupes, ſous le nom de *pyxidium*.

Ces plantes ſont communes ici dans les landes & autres lieux ſecs & ſtériles. Quelques-unes ſont proliferes, même au troiſieme degré, & font un très-bel effet à la vue. Il en eſt qui portent au bord de leurs coupes des tubercules d'une belle couleur écarlate.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

La mouſſe à coupes (*a*) a été long-tems en grande vogue pour les toux, & ſur-tout pour la coqueluche des enfans, dont elle paſſoit pour le ſpécifique. On la donnoit à cet effet ſous diverſes formes. Gerard & Parkinſon recommandent de la prendre en poudre pluſieurs jours de ſuite. Le Docteur Willis l'a ſur-tout préconiſée. Il nous enſeigne pluſieurs manieres de l'adminiſtrer : comme en poudre, en décoction, & ſous forme de ſirop (*b*).

La pratique actuelle l'a entierement rejettée, ſans doute comme ayant uſurpé la réputation de ſpécifique contre la maladie dont nous avons parlé; elle en avoit cependant ſoutenu le titre avec autant d'éclat & peut-être à auſſi bon droit que la plupart des ſpécifiques de nos jours. Nous avons obſervé plus haut, que cette claſſe de mouſſes eſt en général aſtringente. Comme telles, les mouſſes à coupes ſont de nature fortifiante. Il n'eſt donc pas étonnant qu'elles puiſſent produire de bons effets dans cette maladie, purement comme remedes corroborans. On ne ſauroit douter, en effet, qu'elles

(*a*) *Coralloides ſcyphiforme, tuberculis fuſcis. Hiſt. Muſc.* 79. *Lichenoides tubuloſum pyxidatum cinereum. Raii Syn.* 3, *p.* 68. *Pyxidium margine leviter ſerrato. Hill. Hiſt. Pl. p.* 94. Lichen *pyxidatus. Linn.*

(*b*) *Willis Pharm. Rational. Sect.* 1, *Cap.* 6. *De tuſſi puerorum convulſivâ.*

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

n'aient été quelquefois utiles à un certain point ; & le célebre Docteur Huxham (*a*), en traitant de cette maladie rébelle, ſemble préférer la mouſſe à coupes, à d'autres vains ſpécifiques. Heureuſement pour nous, le quinquina fournit un remede infiniment meilleur, lorſqu'il eſt beſoin d'un analeptique de ce genre.

Le Docteur Liſter, dans quelques obſervations ingénieuſes qu'il a faites ſur les couleurs & les teintures, & qui ſe trouvent dans les Tranſactions Philoſophiques (*b*), obſerve que les têtes écarlates de ces mouſſes, traitées avec une leſſive de cendres, donnent une couleur pourpre ſolide.

IV. LICHENES CRUSTACEI.

Compoſés d'une matiere ſeche & friable, plus ou moins épaiſſe, diſpoſée en écailles plates, qui adherent très-étroitement aux corps ſur leſquels elles croiſſent.

Quelques eſpeces de cette diviſion ſont compoſées d'une matiere extrêmement fine & mince, ou

(*a*) *De Aëre & Morbis Epidem. Vol.* 1, *p.* 76, 77.

(*b*) Abrégé de Lowthorp (en anglois). Tom. 3, p. 660. Il en ſera fait mention dans la ſuite de cet ABRÉGÉ : Part. des ARTS, Sect. des *Teintures*.

plutôt farineuſe, ſuivant l'expreſſion de Micheli : les fructifications paroiſſant ſous la forme de tubercules. D'autres conſiſtent en une croute ſcabreuſe plus épaiſſe, & leurs fructifications ſont en forme de petites coupes nommées *ſcutellæ*.

Cette diviſion comprend le premier Ordre des *lichenoides* de Dillen ; les 5e. 6e. & 7e. Ordres des lichens de Haller ; les *lichenes leproſi* & *cruſtacei* de Linné, & pluſieurs des *placodium* de Hill.

Ses eſpeces ſont nombreuſes & la plupart très-communes ſur les rochers, ſur les pierres, les vieux murs, l'écorce des arbres, les anciens pieux, &c. qui en ſont tout couverts dans les endroits peu fréquentés. Elles forment une agréable variété, & quelques-unes préſentent des formes élégantes.

Le Docteur Dillen en décrit une eſpece, qu'il trouva ſur le ſommet des montagnes, en Caërnarvonshire dans le pays de Galles. Les habitans lui dirent qu'ils s'en ſervent pour teindre en rouge, & la trouvent préférable à celle qu'ils nomment *kenkerig*, & dont nous parlerons ci-deſſous. Il l'a nommée *lichenoides tartareum tinctorium candidum, tuberculis atris. Hiſt. Muſc. p.* 128 ; il penſe que c'eſt l'eſpece de mouſſe dont Martin fait mention, ſous le nom de *corkir*, dans ſon Hiſtoire Naturelle des iſles occidentales d'Ecoſſe, & dont

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

les habitans de l'iſle de Sky tirent une couleur écarlate. Sa préparation conſiſte à la ſécher, la pulvériſer, & enſuite la macérer pendant trois ſemaines dans l'urine. Linné met en queſtion ſi cette mouſſe n'eſt pas la même que ſon Lichen *calcarius* (*a*) : eſpece ſi particuliere aux roches calcaires, que par-tout où cette ſorte de pierre ſe préſente parmi les autres, on peut la diſtinguer au premier coup-d'œil, parce qu'elle eſt couverte de cette mouſſe. Dillen n'a pas fait mention de cette particularité par rapport à ſa mouſſe ; & d'un autre côté, Linné ne dit pas que la ſienne ait la propriété de teindre.

La pérelle d'Auvergne, ou orſeille de terre des François, appartient à cet Ordre de lichens (*b*). On la recueille en grande quantité dans les montagnes d'Auvergne, & on l'emploie comme l'orſeille, à laquelle elle eſt cependant très-inférieure. Les habitans la préparent avec la chaux & l'urine. Ils en connoiſſoient l'uſage pour la teinture, long-

(*a*) Lichen *calcarius*, leproſus candidus, tuberculis atris. *Linn.*

(*b*) *Lichenoides leproſum tinctorium, ſcutellis lapidum cancri figurâ. Dill. Hiſt. Muſc. Lichenoides cruſtaceum & leproſum ſcutellare cinereum. Raii Syn. p.* 70. Lichen *Parellus. Linn.*

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

tems avant que l'orſeille fût en réputation (*a*); & on s'en ſert encore aujourd'hui plus communément que de cette derniere. Elle eſt fréquente chez nous ſur les vieux murs, les rochers & les pierres. Mais on la trouve en plus grande abondance en divers autres pays de l'Europe.

Le lichen tartareux, à plaques brunes (*b*), forme un article de commerce pour les peuples de la Gothlande occidentale. Ils en fabriquent une belle teinture rouge, qu'ils vendent ſous le nom de *byttelet* (*c*). Le Docteur Hill dit que nous avons cette mouſſe en abondance dans le Leiceſtershire & dans le Warwickshire.

Les Gallois font une teinture rouge, moyennant le ſecours de l'urine, avec une autre mouſſe de cet Ordre, que Dillen décrit ſous le nom de grand *lichenoides* lépreux, à plaques jaunes (*d*).

(*a*) Voyage de Tournefort dans le Levant. Tom. 1, p. 233.

(*b*) *Lichenoides tartareum farinaceum, ſcutellarum umbone fuſco. Hiſt. Muſc.* 132. *Placodium bracteis majuſculis limbo albo cinctis. Hill. Hiſt. Pl. p.* 97. Lichen *tartareus. Linn.*

(*c*) *Flor. Suec. Ed.* 2, *p.* 407.

(*d*) *Lichenoides cruſtaceum & leproſum, acetabulis majoribus luteis, limbis argenteis. Raii Syn. p.* 71, *n°.* 46. *Hiſt. Muſc. p.* 132.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

Ces eſpeces ne ſont pas les ſeules qui aient la propriété de teindre. On a obſervé que d'autres donnoient une couleur rouge ou pourpre au papier dans lequel on les avoit ſerrés. Il eſt hors de doute que moyennant des épreuves ſuffiſantes, on en trouveroit pluſieurs qui vaudroient peut-être autant que l'orſeille.

Une remarque bien digne de notre attention, à l'égard de ces lichens cruſtacés en général, c'eſt qu'ils rempliſſent des objets auſſi importans que ſinguliers dans l'économie de la nature. Aucune claſſe de végétaux, aux yeux qui ne ſavent point obſerver, ne paroît plus inutile, ou moins propre à ſervir avantageuſement dans la Création. De pareils jugemens ſont ſouvent erronés. Ils le ſeroient certainement dans le cas dont nous parlons. Ces mouſſes ſi menues & ſi viles en apparence ſervent, ſuivant les circonſtances, à un uſage bien important. Un rocher n'eſt pas plutôt laiſſé à nud par la mer, que ces lichens dont les ſemences y ſont portées par les vents, s'en emparent. Ils le couvrent bientôt tout entier, & jettent les fondemens de ſa fertilité future. Leur corruption offre d'abord un ſol ſuffiſant pour nourrir d'autres petites mouſſes, qui à leur tour fourniſſent aſſez de terrein pour de

plus

plus groſſes plantes & pour des arbres ; ainſi le roc devient une iſle fertile (*a*).

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

V. LICHENES FOLIACEI SCUTELLATI.

Compoſés d'une matiere plus lâche & plus flexible, diſpoſée en forme de feuilles, ayant les parties de la fructification en forme de diſques (ſcutellæ).

Quelques plantes de cette diviſion ſont entremêlées avec les précédentes, dans les ſyſtêmes de différens Auteurs de Botanique. En général, cette diviſion contient toute la premiere ſérie du ſecond Ordre des *lichenoides*, dans Dillen, la premiere diviſion de la ſeconde ſérie, & la derniere partie de la ſeconde diviſion de la même. Elle comprend les *lichenes imbricati* & *umbilicati* de Linné ; & pluſieurs des *placodium* de Hill.

Les plantes de cet Ordre ſont pour la plupart auſſi communes en Angleterre que les précédentes, ſur les rochers, les pierres, les anciens pieux, les arbres, &c. Quelques-unes adherent de très-près à ce qui les porte, & ſemblent n'être foliées que vers

(*a*) *Vide* ŒCONOM. NATUR. *in Amœn. Acad. Vol. II, p.* 17.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

leurs bords. D'autres ſont moins adhérentes, ſe déploient & divergent beaucoup, au point de former comme des ramifications.

Nous avons remarqué d'après Linné, qu'un des lichens cruſtacés ne croît preſque jamais ailleurs que ſur les roches calcaires. Le même Auteur a obſervé d'un autre côté un lichen folié, appartenant à cet Ordre, qui végete ſur toute eſpece de rochers, à l'exception des ſeuls calcaires. C'eſt l'eſpece que Dillen a nommé : *Lichenoides vulgatiſſimum cinereo-glaucum lacunoſum & cirrhoſum* (*a*). Elle eſt très-commune chez nous ſur les arbres, ſur les vieux poteaux de bois, &c. ainſi que ſur les rocs & les pierres : c'eſt l'*uſnea cranii humani* de l'ancienne matiere médicale. Linné ajoute qu'elle donne une couleur tirant ſur le pourpre.

Ici nous devons rapporter le *cork* ou *arcel* (*b*), dont ſe ſervent les Écoſſois & d'autres peuples, pour teindre en pourpre ou en écarlate. La préparation conſiſte à le mettre en poudre, & en faire une maſſe

(*a*) *Hiſt. Muſc. p.* 88. *Lichenoides cruſtâ foliosâ ſupernè cinereo-glaucâ, infernè nigrâ & cirrhosâ, ſcutellis nigricantibus. Raii Syn. p.* 72. Lichen *ſaxatilis. Linn.*

(*b*) *Lichenoides ſaxatile tinctorium, foliis piloſis purpureis. Raii Syn. p.* 74, *n°.* 70. *Hiſt. Muſc. p.* 185. *Lichen petræus purpureus derbienſis. Park. Theatr. p.* 1315. Lichen *omphalodes. Linn.*

avec de l'urine. Parkinſon nous dit (*a*) que le pauvre peuple le ramaſſe ſur les rochers, & en fait le même uſage. M. Ray (*b*) ajoute à ce détail, que les Gallois, qui le nomment *kenkerig*, en connoiſſent depuis long-tems la propriété, & s'en ſervent très-communément. La couleur que donne ce lichen eſt très-morne; mais ſi on employoit pour la perfectionner les mêmes ſoins qu'exige l'orſeille, elle deviendroit indubitablement beaucoup plus belle & plus durable. Linné rapporte (*c*) qu'il y a une immenſe quantité de cette mouſſe autour des rochers de l'iſle d'Aland dans la mer Baltique, où les bonnes femmes en font elles-mêmes une teinture jaune, par la ſimple décoction, ſans y ajouter rien de ſalin. Il ajoute que ceux qui veulent rehauſſer la couleur ajoutent un peu de roucou (*d*) dans la décoction.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

Le même Auteur nous apprend que les habitans de Gothlande fabriquent une teinture jaune avec le lichen friſé (*e*). Il ajoute que c'eſt un remede vanté

(*a*) *Park. Theatr. Bot. p.* 1315.

(*b*) *Raii Hiſt. Plant. p.* 1109

(*c*) *Flor. Lappon. p.* 343. *V.*

(*d*) Autrement nommé *arnotto.*

(*e*) *Lichenoides vulgare ſinuoſum, foliis & ſcutellis luteis. Dill. Hiſt. Muſc. p.* 180. *Lichenoides cruſtâ foliosâ ſcutellatâ, flaveſcens. Raii Syn. p.* 72, *n°.* 59. Lichen *parietinus. Linn.*

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

parmi les gens de la campagne, comme ſpécifique contre la jauniſſe (*a*). Helwingius, dans le ſupplément à la *Flora Pruſſica*, affirme que ce lichen teint le papier & le linge d'une vive couleur incarnate, qui réſiſte long-tems à l'épreuve du ſoleil ſans ſe ternir. Il paroît cependant très-probable que cet Auteur a pris l'eſpece en queſtion pour quelqu'autre plante de ce genre, puiſque Dillen aſſure en avoir fait l'expérience ſans ſuccès.

La Suede produit une mouſſe de cet Ordre (*b*), qui paroît avoir été inconnue aux Botaniſtes juſqu'à Linné. Elle fournit à la teinture, ſuivant le rapport de cet Auteur, une couleur pourpre foncée.

VI. LICHENES ERECTI RAMOSI PLANI.

Compoſés d'une matiere ferme coriace, diſpoſée en ramifications plates & minces, qui s'élevent à angles droits, & qui portent leurs plaques (ſcutellæ) *ſur les bords, ſur les ſurfaces, & aux extrémités.*

Cette diviſion comprend les mouſſes d'arbre branchues plates, des Auteurs; un grand nombre

(*a*) *Flor. Suec. Ed.* 2, *p.* 416, *n°.* 1093.

(*b*) Lichen *ſtygius*, imbricatus, foliolis palmatis recurvis atris. *Linn.*

des lichens du quatrieme Ordre de Haller ; la premiere partie de la ſeconde diviſion de la ſeconde ſérie, dans Dillen ; & le genre *platyſma* de Hill.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

Les plantes de cette diviſion croiſſent ſur les vieux arbres, ſur-tout dans les bois épais & ſolitaires ; quelques-unes ſur les rochers. La plupart ſont extrêmement communes en Angleterre ſur toutes les ſortes d'arbres. Ces lichens étant de ceux qui s'offrent le plus ſouvent à la vue, furent auſſi des premiers dont les anciens Auteurs firent mention, ſous le nom de *lichenes arborum.*

On ſubſtituoit les mouſſes de cet Ordre à l'uſnée, dans la compoſition de la poudre de Chypre, & l'eſpece qu'on employoit le plus fréquemment à cet uſage étoit le lichen à feuilles canelées, de Dillen (*a*), parce qu'elle ſe réduiſoit facilement en poudre aſſez blanche. Il en eſt cependant d'autres eſpeces qui ſeroient ſans doute auſſi propres aux mêmes uſages ; & s'il étoit de quelque importance de les employer ainſi chez nous, on pourroit ſe les y procurer en quantité ſuffiſante.

Une des plantes de cet Ordre eſt propre aux

(*a*) *Lichenoides coralliforme roſtratum & canaliculatum. Hiſt. Muſc.* 170. *Lichenoides arboreum ramoſum, anguſtioribus cinereo-vireſcentibus ramulis. Raii Syn.* 75. Lichen *calicaris. Linn.*

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

mêmes uſages que l'orſeille, & paſſe pour ne lui être pas beaucoup inférieure. On la trouve dans les mêmes endroits, & très-ſouvent on en emballe de grandes quantités avec l'orſeille. Dillen l'a nommée *lichenoides fuciforme tinctorium, corniculis longioribus & acutioribus* (*a*). C'eſt vraiment & proprement une plante du genre lichen, quoique les plus anciens Auteurs du ſiecle dernier lui aient donné le nom de *fucus*. Ils furent induits en erreur, parce que ſes ramifications ſont aplatties, & parce qu'elle croît ſur les rochers au bord de la mer. On la trouve dans les Indes orientales, ſur les arbres, & elle eſt fréquente ſur les côtes de la Méditerranée, auſſi bien qu'autour des iſles Canaries.

VII. LICHENES PELTATI.

Compoſés d'une matiere ferme ou coriace, diſpoſée en apparences de feuilles; ſur les bords deſquelles ſont placées pour l'ordinaire les parties de la fructification, ſous la forme de corps oblongs & aplattis, qu'on nomme dans ces mouſſes écus *ou* boucliers.

Cette diviſion contient la troiſieme ſérie du ſecond Ordre des *lichenoides* de Dillen; les *liche-*

(*a*) *Hiſt. Muſc.* 168. *Platyſma corniculatum. Hill. Hiſt. Plant.* 90. Lichen *fuciformis. Linn.*

nes coriacei de Linné, & pluſieurs des *placodium* de Hill.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

La fameuſe hépatique terreſtre cendrée (ash-couloured-ground liverwort), de Ray (*a*), appartient à cet Ordre. Elle eſt très-commune par toute l'Angleterre, dans les lieux ſecs & ſtériles. Il paroît qu'elle croît en aſſez grande abondance dans preſque toute l'Europe, & même en Amérique; car elle a été obſervée par preſque tous les Auteurs de Botanique, depuis Ray, qui fut un des premiers à la décrire.

La premiere notion qu'on ait eue de ſon uſage contre la morſure du chien enragé eſt conſignée dans les Tranſactions Philoſophiques, Ann. 1698, n°. 237 (*b*). On la doit à M. Dampier, dans la famille duquel on la tenoit ſecrete depuis un nombre d'années. Cette plante fut d'abord communiquée au Chevalier Hans Sloane comme une eſpece de fungus ou d'agaric; & quelques années après, à la requiſition du Docteur Méad, on l'introduiſit

(*a*) *Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis ſinuoſis. Dill. Hiſt. Muſc.* 200. *Platyſma ſinuoſum, ſcutellis ovato-rotundis. Hill. Hiſt. Pl.* 89. Lichen *caninus. Linn.*

(*b*) *Note du Traducteur.* Il a été fait mention de cet Article dans le Tome I. de la Matiere Médicale, dans cet ABRÉGÉ, pag. 399.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

dans la Pharmacopée de Londres. Il n'eſt preſque aucun des ſpécifiques vantés dans les ſiecles précédens, qui ait acquis autant de réputation qu'en a eu de nos jours cette plante, comme remede de la rage. La recommandation d'un Savant tel que le Docteur Méad la fit ſuffiſamment connoître dans le monde. Ce ſeroit vraiment un grand bonheur, ſi elle pouvoit mériter les éloges qu'on lui a donnés. Un célebre Médecin (*a*) a douté qu'elle ait aucune vertu de ce genre, & chacun ſait que Boerhaave l'a même tournée en dériſion. Le Docteur Méad en avoit certainement une haute opinion. Il aſſure qu'il ne l'a jamais vu manquer ſon effet, pendant le cours de trente années d'expérience, lorſqu'elle étoit adminiſtrée à propos, avant que l'hydrophobie ſe déclarât (*b*). Des exemples récens ont fait voir qu'elle n'eſt pas infaillible, & la ſuppoſition du Docteur Van-Swieten n'eſt ſans doute que trop vraie. Il faut avouer que dans la pratique du Docteur Méad, elle étoit trop compliquée avec d'autres moyens pour laiſſer juger pleinement de ſon efficacité réelle; & l'on peut à bon droit mettre en queſtion, ſi la ſaignée, le

(*a*) Le Docteur Van Swieten. Voy. *Comment. in Boerh. Aphor.* §. 1147.

(*b*) *Mechanical Account of Poiſons. Ed. IV. p.* 156.

poivre & le bain froid n'ont pas eu plus de part aux ſuccès que le lichen.

La pulmonaire de chêne (*a*) appartient à cet Ordre. On la trouve autour des vieux chênes & ſur les roches & les pierres couvertes de mouſſe, dans la plupart des forêts en Angleterre. Mais elle n'y eſt pas très-abondante.

Peu de ſimples ont eu anciennement plus de réputation que cette plante. Elle a été célebre pendant des ſiecles par ſa prétendue vertu dans preſque toutes les différentes affections du poumon; & néanmoins, ſi l'on recherchoit l'origine de ſon uſage dans ces maladies, on trouveroit probablement qu'il eſt plutôt dû à une reſſemblance imaginaire entre cette plante & le poumon même, qu'à aucune preuve réelle & bien fondée, qu'on ait jamais eue de ſon efficacité. En qualité d'aſtringent, comme la plupart des autres eſpeces de cette famille, elle peut ſans doute contribuer au ſoulagement des malades, dans bien des cas où les poumons ſont affectés : comme dans l'hemophthiſie & autres affections analogues; mais elle

(*a*) *Lichenoides pulmonium reticulatum vulgare, marginibus peltatis. Dill. Hiſt. Muſc.* 212. *Lichenoides peltatum arboreum maximum. Raii Syn. p.* 76. *Muſcus pulmonarius. Off. & C. B. P.* Lichen *pulmonarius. Linn.*

Ann. 1758. Tom. 50. ne. partie. Hiſtoire des Lichens.

ne paroît poſſéder en aucune maniere l'éminente vertu médicinale que le préjugé lui avoit attribuée.

Les gens du peuple, dans le Héréfordshire, où cette mouſſe porte le nom de *rags*, teignent leurs bas en brun par ſon moyen. Il n'eſt beſoin pour cela que d'une très-forte décoction dans l'eau, & la couleur eſt très-ſolide (*a*).

Le lichen verd à verrues noires (*b*) eſt un remede célebre & très-en uſage dans la campagne autour d'Upſal, pour les aphtes des enfans. On le donne en infuſion dans du lait. Un remede de ce genre eſt très-important dans ces contrées, où cette maladie eſt beaucoup plus fréquente que chez nous (*c*). Il n'eſt pas reçu dans la Pharmacopée ſuédoiſe; mais on le connoît dans les boutiques ſous le nom de *muſcus cumatilis*. Nous ne l'avons point en Angleterre, & Dillen ne l'a trouvé qu'en un ſeul endroit aux environs de Gieſſen. Il eſt plus abondant en Suede dans les bois. Un cas ſingulier, rapporté dans les *Amœnitates Academicæ* (*d*) a donné lieu de le croire utile auſſi contre les vers. Voici l'hiſtoire en raccourci:

(*a*) *Dillen. Hiſt. Muſc. p.* 213.

(*b*) *Lichenoides digitatum lætè virens, verrucis nigris notatum. Dill. Hiſt. Muſc. p.* 207. Lichen *aphtoſus. Linn.*

(*c*) *Boerhaav. Aphor.* §. 982.

(*d*) *Vol. II, p.* 69. *De Tæniâ.*

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

Une fille de la campagne s'étoit plainte pendant près de ſix mois, de douleurs vives dans l'eſtomac & dans les inteſtins, accompagnées de vomiſſemens, d'anxiétés & de veilles continuelles. Tout ce qui lui avoit été ordonné par le Profeſſeur Linné & autres, qui la regardoient comme attaquée de vers, n'ayant eu abſolument aucun ſuccès, elle fut laiſſée à la merci de ſes parens & de ſes voiſins. Quelques bonnes femmes lui donnerent une décoction de ce lichen, que les Uplandois nomment *elſnefwer*. Après en avoir pris quelques jours, elle rendit par le haut ſix ou ſept vers rondelets, & fut guérie. A l'examen, on trouva que c'étoient des larves d'une eſpece d'abeille brune, décrite par M. Ray (*a*) & par Linné (*b*).

Quoique cette hiſtoire ne ſoit pas ſuffiſante pour conſtater la propriété vermifuge de cette plante, elle ſert du-moins à prouver que d'autres inſectes que les tænia, les lombris & les aſcarides, peuvent ſubſiſter long-tems dans les premieres voies du corps humain, & y occaſionner de grands déſordres (*c*).

(*a*) *Muſca apiformis tota fuſca, caudâ obtusâ, ex ejulâ caudatâ in latrinis degente orta. Raii Hiſt. Inſect. p.* 272.

(*b*) *Faun. Suec.* n°. 1084.

(*c*) Voyez deux cas à peu près ſemblables, obſervés par le Docteur Liſter, dans les *Tranſact. Philoſoph.* abrégées par

Ann. 1758. Tom. 50. ae. partie. Hiſtoire des Lichens.

La néceſſité eſt ſouvent la mere des plus utiles & des plus importantes découvertes. Nous trouvons une grande preuve de la vérité de cette maxime, dans l'uſage eſſentiel que font les Iſlandois d'une autre plante de cet Ordre. Leur climat admet à peine la culture de quelque eſpece de grain. Mais ils ſuppléent en grande partie à leurs privations en ce genre par le lichen à feuilles de panicaut (*a*), qui abonde dans les régions ſeptentrionales, & ſur-tout dans cette iſle, dont les habitans connoiſſent depuis long-tems les moyens de s'en ſervir & comme aliment, & comme remede.

Ray nous apprend (*b*), d'après Bartholin, que ce lichen au printems, tandis qu'il eſt jeune, a la propriété de purger, & qu'on s'en ſert en conſéquence comme d'une médecine ordinaire dans cette ſaiſon. Il perd bientôt cette qualité, & ce qu'il avoit de purgatif au printems eſt converti en aliment le reſte de l'année. Les habitans en ramaſſent de grandes quantités, le réduiſent en

---

Lowthorp (en anglois). Tom. III. p. 135. Nous en ferons mention dans la partie MÉDECINE de cet Abrégé, Sect. *des vers.*

(*a*) *Lichenoides rigidum, eryngii folia referens. Dill. Hiſt. Muſc. p.* 209. *Raii Syn. p.* 77. Lichen *iſlandicus. Linn.*

(*b*) *Hiſt. Plant. p.* 114.

farine, & en font du potage & du pain. Il eſt en uſage non ſeulement en Iſlande, mais encore en différens endroits de la Suede, où l'on éprouve que c'eſt un aliment très-convenable dans les cas de phthiſie (*a*). Ces notions ſur l'excellent uſage de ce lichen ſont parfaitement conformes aux détails que vient d'en donner M. Horrebow dans ſon *Hiſtoire Naturelle d'Iſlande*. Voici ce qu'il en dit : « Il y a une autre herbe nommée *muſcus* » *catharticus Iſlandiæ*, ou herbe de montagne » (mountain-graſs), dont on fait un mets délicat. » J'en ai ſouvent mangé, d'abord par curioſité ; » mais enſuite parce qu'il eſt auſſi agréable au » goût qu'il eſt ſalubre. Les excellentes qualités » de cette herbe ſont décrites dans les Mémoires » de la Société des Arts & Sciences de Suede. » Elle croît en abondance, & ceux qui demeurent » près des endroits où on la trouve, en amaſſent » de grandes quantités, tant pour leur uſage, que » pour la porter au marché. On en envoie cher- » cher des charges de cheval lorſqu'on eſt éloigné. » Beaucoup de gens ne conſomment point de » farine de grain, quand ils ont leur proviſion de » cette herbe, qui eſt à tous égards un excellent » aliment (*b*) ».

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

(*a*) *Flor. Lappon.* n°. 445.

(*b*) *Horrebow's Natural Hiſtory of Iceland*, p. 36.

Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie. Hiſtoire des Lichens.

Cette mouſſe n'eſt pas très-commune dans les pays méridionaux de l'Europe. L'Angleterre n'en produit que très-peu. M. Newton & Dillen l'ont trouvée dans le pays de Galles ; Sibbald en Ecoſſe. Elle eſt fréquente ſur les Alpes ſuiſſes ; & le Docteur Haller en fait mention dans ſon *Iter Hercynium*. La Suede & la Laponie l'ont en quantité ; & c'eſt enfin à raiſon de ſon abondance & du grand uſage dont elle eſt en Iſlande, que Bartholin, & d'autres après lui, l'ont nommée *muſcus iſlandicus*.

CONCLUSION.

Je ne puis m'empêcher de remarquer, en terminant ce Mémoire, que nous avons dans cette famille de plantes un exemple frappant de l'utilité qui peut réſulter de l'étude de l'Hiſtoire Naturelle en général, & même de ſes branches les plus minces, & juſqu'ici les plus négligées. Les uſages économiques des lichens dans les différentes parties du monde ſont déja, comme on vient de le voir, très-conſidérables & très-importans ; & quoique leurs qualités ſenſibles, & l'expérience des ſiecles paſſés, ne paroiſſent pas nous autoriſer à leur attribuer de grandes vertus médicinales, la poſtérité trouvera ſans doute de nouveaux moyens de les employer au profit de l'humanité, à des uſages qui nous ſont inconnus.

Digitized by Google

Ann. 1761. Tom. 51. 1e. partie. Cigüe de Stork.

ART. XII.

Sur la cigüe recommandée par le Docteur Stork. Par le Docteur Guillaume Watſon, Membre de la Société Royale. Lu le 17 Février 1761.

L'objet de l'Auteur eſt d'empêcher qu'on ne confonde avec la vraie cigüe de Stork, qui eſt le Conium *maculatum. Linn.*, quelques autres plantes qui ont du rapport avec elle. L'une eſt le *cicutaria vulgaris* des Botaniſtes (Chærophyllum *ſylveſtre. Linn.*), qui au printems, avant que la cigüe de Stork ait acquis les taches pourpres particulieres à ſes pédicules, lui reſſemble aſſez pour que les perſonnes peu inſtruites s'y trompent ; mais dans cette ſaiſon même, les feuilles de la vraie cigüe exhalent une odeur beaucoup plus forte ; elles ont des diviſions plus menues, & ſont d'un verd plus foncé. On les diſtingue enſuite plus aiſément, en ce que le cerfeuil ſauvage fleurit à la fin d'Avril & au commencement de Mai, & la vraie cigüe ne fleurit qu'en Juin, quand les fleurs du cerfeuil ſauvage ſont paſſées.

Une autre plante, qu'on a cueillie & vendue pour la vraie cigüe, eſt la *cicuta minor* de Parkinſon, *cicuta tenuifolia* de Ray (Æthuſa *Cynapium. Linn.*). On la diſtingue cependant aſſez

Ann. 1761. Tom. 51. 1e. partie. Cigüe de Stork.

facilement de la vraie cigüe par les circonſtances ſuivantes : ſes feuilles ont la couleur & la forme de celles du perſil ; ſes tiges n'ont point de taches, & elle n'exhale pas l'odeur particuliere à la vraie cigüe.

On peut à ces plantes en ajouter une troiſieme qui, ſur-tout aux environs de Londres, croît avec la vraie cigüe, & s'y trouve mêlée ; c'eſt le *myrrhis ſylveſtris, ſeminibus aſperis. C. B.* (Scandix *Antriſcus. Linn.*) On ne peut s'y méprendre auſſi que dans le printems ; & elle differe de la vraie cigüe, même alors, par ſes feuilles plus finement découpées, par ſa couleur plus pâle, par ſon odeur, moins forte que celle de la vraie cigüe, quoiqu'elle en ait un peu, & par l'abſence des taches. D'ailleurs cette plante fleurit en Avril, & ſes graines ſont mûres avant que la vraie cigüe commence à pouſſer des fleurs.

Le Docteur Stork rapporte que la racine de la cigüe rend un jus laiteux lorſqu'on la coupe à tranches ; l'Auteur aſſure qu'il n'en a jamais vu ſortir ce jus laiteux en Angleterre, & il croit que la différence du climat en eſt la cauſe.

N. B. Nous avons cru devoir ajouter ces détails à ce qui a été dit ſur cet article dans la partie MATIERE MÉDICALE de cet Abrégé, Tome I, Art. XXIII, pag. 348.

ART. XIII.

ART. XIII.

Deſcription d'une nouvelle plante du Pérou, introduite depuis peu dans les jardins anglois; & dont les caracteres different de ceux de tous les genres connus. Par M. George-Denis Ehret, Membre de la Société Royale. Lu le 12 Mai 1763.

« Cette plante fleurit en perfection pour la premiere fois dans le jardin médicinal de Chelſea en 1761. Ses fleurs ſont de couleur bleu-de-ciel à l'extérieur, ſur un fond pourpre foncé. Elles ſont monopétales, & leur limbe eſt diviſé en cinq lobes obtus, qui s'épanouiſſent exactement comme dans la fleur de l'*alkekengi indicum, glabrum, chenopodii folio. Dill. H. Elt.* (Phyſalis *angulata. Linn.*) La différence entre ces deux fleurs conſiſte ſeulement dans l'inſertion & la ſituation de leurs filamens. Ceux de l'alkekenge adherent à la baſe du tube: dans la plante en queſtion, ils ſont attachés au haut du tube, à l'endroit où il commence à s'élargir. Dans toutes deux, les filamens ſont velus à leur baſe, & les antheres ſont diſtantes les unes des autres; au lieu que dans les autres alkekenges elles ſont inclinées l'une vers l'autre. Le caractere le plus remarquable dans notre plante

Ann. 1763. Tom. 53. Nolana *proſtrata.*

Ann. 1763. Tom. 53. Nolana *proſtrata.*

eſt la poſition des cinq ſemences ſemblables, dont chacune a ſon réceptacle particulier, qui ſont ſituées au fond du calyce, de maniere qu'à la premiere vue, on diroit que cette plante appartient à la claſſe des plantes qu'on nomme *herbæ verticillatæ.* Mais en y regardant de plus près, on voit que chacune de ces ſemences ſemblables eſt un vaiſſeau ſéminal, ou un fruit triſperme, & contient trois ſemences.

Le ſavant Docteur Albert Schloſſer, d'Amſterdam, me fit préſent de pluſieurs exemplaires de plantes ſeches, qu'il avoit cueillies en 1755 au jardin de Botanique à Paris. La plante en queſtion s'y trouvoit ſous le nom de *belladonna peruviana minor. Juſſ. Hort. Reg. Par.*

M. Miller m'a propoſé d'honorer cette plante du nom de *Walkeria*, en reconnoiſſance pour Richard Walker, Profeſſeur en Théologie, & Vice-Maître du College de la Trinité à Cambridge, qui à force de ſoins & de dépenſes vient de fonder un jardin de plantes, pour encourager & propager l'étude de la Botanique dans cette fameuſe Univerſité ».

L'Auteur donne enſuite les caracteres & la figure de la plante.

Linné en a fait un genre particulier, qui n'a encore qu'une eſpece, ſous le nom de Nolana *proſtrata.*

ART. XIV.

Specimen Hiſtoriæ Naturalis volgenſis, Auctore J. R. Forſter. Lu le 18 Juin 1767.

Ann. 1767. Tom. 57. Hiſtoire Naturelle des bords du Volga.

L'Auteur ayant paſſé pluſieurs mois dans les pays qu'arroſe le Volga, depuis le 48e. juſqu'au 52e. degré de latitude nord, donne dans cet article, qui eſt en latin, un échantillon de ce qu'il y a obſervé dans les trois regnes de la nature. Je dirai un mot du regne végétal.

M. Forſter avoit fait dans ce pays un herbier de plus de 700 plantes. Le chariot qui le portoit ayant traverſé des eaux profondes, l'herbier fut mouillé, & les plantes ſe gâterent; en ſorte qu'il n'en a pu rapporter que 207, dont il donne le catalogue, rangé ſuivant la méthode ſexuelle de Linné, avec le nom des lieux où elles croiſſent, & quelques obſervations que je vais rapporter dans leur ordre.

Vaccinium *Oxicoccus*. Ses baies ſont fort en uſage en été parmi les Ruſſes, & on fait une boiſſon très-agréable de leur ſuc, mêlé avec de l'eau & du miel.

Scleranthus *annuus*. Potentilla *reptans*. Tormentilla *erecta*. Les femmes recueillent le *Coccus*

Ann. 1767. Tom. 57. Hiſtoire Naturelle des bords du Volga.

polonicus, qui eſt attaché aux racines de ces trois eſpeces de plantes, le tuent dans du vinaigre, & le portent aux marchés.

Dodartia *orientalis*: à fleurs bleues. Les chameaux, les chevaux, les bœufs & les brebis des Kalmoucks ſont très-avides de cette plante, & la rongent juſqu'à la racine; de telle ſorte que l'Auteur eut beaucoup de peine à trouver un lieu intact, où il en reſtât un ou deux pieds entiers pour ſon herbier.

Morus *tatarica*. Les vers à ſoie nourris des feuilles de ce mûrier ont produit une ſoie ſi brillante & de ſi bonne qualité, qu'elle ne cede en rien aux plus belles ſoies du Piémont. L'Impératrice a fait faire avec cette ſoie que lui offrit l'Auteur, de très-belles coëffures dont elle a daigné orner ſa tête.

Quercus *Robur*. Les forêts des environs du Volga & du Tanaïs ſont preſque entierement compoſées de chênes: ce qui eſt à remarquer, parce que cet arbre eſt rare dans la Ruſſie ſeptentrionale. Les Pêcheurs abattent ſouvent, au grand préjudice de ces bois, les jeunes chênes, dont ils emploient l'écorce avec de vieilles ferrailles pour teindre leurs filets en noir. L'Auteur leur a propoſé de ſubſtituer à cette mauvaiſe pratique la méthode uſitée en Pruſſe, où l'on noircit les filets en les

expoſant à la fumée : ce qui leur eſt moins préjudiciable, & eſt propre, à ce qu'on prétend, à attirer le poiſſon.

Ann. 1767. Tom. 57. Hiſtoire Naturelle des bords du Volga.

Veratrum *album*. Les habitans le croient mortel pour les beſtiaux qui en mangent. Ils ſaupoudrent de ſa racine ſeche & pulvériſée les bleſſures au dos des bœufs, à l'effet d'en écarter le taon.

ART. XV.

CROTON *ſpicatum*: nova plantæ ſpecies ex America, quam deſcriptione ex icone illuſtravit Petrus Jonas Bergius, M. D. Hiſt. Nat. & Pharm. Prof. Stockh., &c. *Lu le* 21 *Avril* 1768.

Ann. 1768. Tom. 58. Croton *ſpicatum*.

Cette eſpece de *croton* dont l'Auteur donne la deſcription & la figure, & qu'il nomme *croton ſpicatum, foliis ovatis glabris, ramis nudis, florum racemis ſpicatis terminalibus*, n'avoit pas été, ſuivant lui, aſſez bien décrite.

M. Bergius, à la fin de ſa deſcription de cette eſpece, avertit qu'il faut la diſtinguer du Croton *glabellum* de Linné. Nous croyons devoir renvoyer les curieux, pour le reſte de cet article, à l'original des Tranſact. Philoſ. Vol. cité en marge, pag. 132.

ART. XVI.

Sur les arbres qu'on ſuppoſe indigenes en Angleterre. Par M. Daines Barrington, Membre de la Société Royale. Lu le 9 & le 16 Février 1769.

Ann. 1769. Tom. 59. Arbres indigenes en Angleterre.

C'eſt une diſcuſſion très-étendue ſur ce ſujet, dans laquelle l'Auteur eſſaye de prouver que ni le châtaignier, ni l'orme ordinaire, ni le tilleul, ni le grand érable, improprement nommé ſicomore, ni le buis, ne ſont indigenes dans la Grande Bretagne. Il eſt dans le doute au ſujet de l'if, qui, maintenant très-commun en Angleterre, eſt très-rare en Ecoſſe. L'Auteur n'y en a vu qu'un, qui eſt à la vérité, d'une groſſeur déméſurée. On le voit dans le cimetiere de Glen-Lyon, à l'Eſt de Taymouth, où eſt le magnifique & pittoreſque château du Comte de Bredalbane.

L'Auteur rapporte qu'il a meſuré deux fois, de peur de ſe tromper, la circonférence de cet if. Il l'a trouvée de cinquante-deux pieds. Le centre de l'arbre tombe en pourriture depuis une vingtaine d'années, de ſorte qu'il n'en reſte maintenant preſque plus autre choſe que l'écorce extérieure, en partie détruite. Ce qui en paroît encore, a néan-

moins trente-quatre pieds de circonférence. C'eſt là peut-être le plus gros arbre dont il ait encore été fait mention. Car le gros chêne de Tortworth en Gloceſtershire n'avoit que cinquante-un pieds de circonférence, quand il fut meſuré, il y a quarante ans, par Greening, pere du Jardinier actuel de ce nom.

Ann. 1769. Tom. 59. Arbres indigenes en Angleterre.

Au catalogue des arbres douteux, M. Barrington ajoute l'aube, ou peuplier blanc. Il croit, au ſujet de celui-ci, qu'aucun Botaniſte ne s'eſt apperçu avant lui, que les feuilles ne préſentent ſur leur revers cette blancheur éclatante qui les diſtingue, que dans les dernieres pouſſes de cet arbre.

ART. XVII.

Lettre du Docteur Ducarel, Membre de la Société Royale & de celle des Antiquaires, concernant les châtaigniers. Avec deux autres lettres qui lui ont été adreſſées ſur le même ſujet. Lu le 8 Mars 1771.

Ann. 1771. Tom. 61. Arbres indigenes en Angleterre.

L'Auteur n'eſt pas de la même opinion que M. Daines Barrington au ſujet des châtaigniers. Il les croit indigenes en Angleterre, & rapporte beaucoup d'autorités à l'appui de ſon ſentiment. Les deux lettres qui ſuivent, l'une de M. Thorpe, l'autre de M. Edouard Haſted, Membre de la Société Royale, & de celle des Antiquaires, ſervent encore à le confirmer. Nous ne nous arrêterons pas davantage ſur cette diſcuſſion peu importante. Il faut ſeulement noter, d'après l'Auteur, que le bois de châtaignier n'a probablement ceſſé d'être en uſage pour la charpente des édifices, que parce qu'il eſt ſujet à ſe corrompre au bout d'un certain tems, & que la corruption commence au centre des ſolives; en ſorte qu'elle a fait de grands progrès avant qu'on puiſſe s'en appercevoir.

Ces Meſſieurs aſſurent encore, contre l'opinion

de M. Barrington, que l'if, l'orme, &c. ſont indigenes en Angleterre.

Ann. 1771. Tom. 61. Arbres indigenes en Angleterre.

Lettre de M. Daines Barrington, Membre de la Société Royale, au ſujet des trois lettres précédentes. Lue le même jour.

L'Auteur ne voit pas de raiſon, malgré ce que diſent ces Meſſieurs, de changer ſa façon de penſer ſur ce ſujet. Il ſe diſpenſeroit d'y revenir, ſi ce n'étoit pour relever l'eſpece de démenti qu'on lui donne ſur un fait dont il a été témoin oculaire, relativement à la régularité de certaines plantations de châtaigniers, &c.

ART. XVIII.

*Lettre de M. John Ellis, Membre de la Société Royale, à M. Guillaume Aiton, Jardinier Botaniſte de S. A. R. la Princeſſe Douairiere de Galles, à Kew, ſur une nouvelle eſpece d'*ILLICIUM. *Linn., ou d'anis étoilé, qu'on a découverte depuis peu dans la Floride occidentale. Lu le* 13 *Décembre* 1770.

Cet arbuſte qui avoit d'abord été découvert en Avril dans la partie occidentale de la Floride, le fut bientôt après dans la Floride orientale par le

Ann. 1770. Tom. 60. Illicium *floridanum*

Ann. 1770. Tom. 60. Illicium *floridanum.*

fils du fameux Botaniſte Américain, M. J. Bartram. Voici ce qu'il en dit dans ſon Journal, publié par le Docteur Stork (Détails ſur la Floride orientale):

« Mon fils a trouvé près d'ici un charmant arbre » odoriférant, dont les feuilles reſſemblent à celles » du *Magnolia*. Il a l'odeur du ſaſſafras, & pro- » duit une très-ſinguliere eſpece de gouſſe; mais » toutes ſes ſemences étoient tombées. La forte » gelée ne l'a pas endommagé. Il y en a qui ont » près de vingt pieds de haut. C'eſt un arbre verd, » aromatique, très-agréable ».

La faculté de braver les grandes gelées doit faire regarder cet arbuſte comme une très-précieuſe acquiſition à faire pour les jardins d'Europe.

Linné a adopté le nom d'Illicium *floridanum* que M. Ellis a donné à cette eſpece, & renvoie pour ſes caracteres & ſa figure à la page 289 du Vol. des Tranſact. Philoſ. cité en marge; il en a été déja fait mention dans la MATIERE MÉDICALE, Tom. I, pag. 433.

ART. XIX.

NYCTANTHES *elongata*: nova planta indica, quam deſcriptione atque icone illuſtratam, illuſtriſſimæ Societati Reg. Lond. reverenter offert Petrus Jonas Bergius, M. D. Suecus, Reg. Soc. Lond. aliarumque Societ. Membrum. *Lu le 9 Mai* 1771.

Ann. 1771. Tom. 61. Nyctanthes *elongata.*

Nous allons donner, d'après l'Auteur, les caracteres botaniques de cette nouvelle eſpece de plante, parce qu'il n'en eſt fait mention dans aucune des Editions du *Species Plantarum* de Linné. M. Murray l'a placée dans ſa nouvelle Édition du *Syſtema vegetabilium*, de 1784; mais il n'en donne point de deſcription, & ne cite que le Supplément qui fut publié par Linné le fils, à Brunſwick, en 1781.

NYCTANTHES *elongata*, foliis cordato-lanceolatis acutis elongatis minoribuſque, ramis teretibus.

DESCRIPTIO.

Caulis fruticoſus. *Rami* ſubprocumbentes, oppoſiti, teretes, inferiores glabri, ſuperiores villoſi, ramoſi: ramulis oppoſitis. *Folia* oppoſita, cordato-lanceolata, ſubbipollicaria, acuminata, integerrima, utrinque glabra, nervoſa, margine paululùm

Ann. 1771. Tom. 61. Nyctanthes *elongata.*

undulata, saturatè viridia; inferiora ramulorum sensim minora, infima verò cordato-ovata, parva. *Flores* in ramulis terminales, 5 vel 6 congesti, subumbellati, breviter pedicellati.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, minimum, persistens, sex vel septemfidum: laciniis subulatis, pilosis.

COR. monopetala; *tubus* cylindricus, striatus, longus, pollicaris, supernè incrassatus; *limbus* planus, octo vel novempartitus: laciniis ovato-oblongis, acutis.

STAM. *Filamenta* bina, brevia; *antheræ* lineares, obtusæ, utrinque sulcatæ, intra tubum corollæ occultatæ.

PIST. *Germen* subrotundum, truncatum, retusum, glabrum. *Stylus* filiformis longitudine staminum. *Stigma* incrassatum, bifidum.

(Voyez la Planche II.)

ART. XX.

Sur l'époque du renouvellement de la Botanique en Angleterre. Avec quelques particularités touchant John TRADESCANT, *Jardinier du Roi Charles I., & grand zélateur de la Botanique & de l'Hiſtoire Naturelle, dans le ſiecle dernier. Par le Docteur Ducarel, Membre de la Société Royale, & de celle des Antiquaires. Lu le 2 Novembre 1772.*

Ann. 1773. Tom. 63. Renouvellement de la Botanique.

Parmi les révolutions auxquelles les Sciences ſont ſujettes, une des plus extraordinaires eſt ſans doute celle qu'a éprouvée la Botanique, cette Science ſi utile à l'humanité & ſi bien connue des Anciens. Elle avoit abandonné l'Europe pendant pluſieurs ſiecles, & y fut preſque inconnue juſqu'au 16e. ſiecle, où l'on ſuppoſe qu'elle reparut tout d'un coup, pour être enſuite portée en peu de tems par les Modernes à ſon plus haut point de perfection.

Il eſt cependant de fait que la Botanique étoit retournée en Angleterre long-tems avant cette époque. Elle y fut reportée par les Saxons; & je tâcherai de faire voir que depuis leur arrivée, elle a toujours plus ou moins fleuri dans ce royaume.

Ann. 1773. Tom. 63. Renouvellement de la Botanique.

Je fonde mon opinion ſur l'autorité des quatre Mſſ. ſaxons qui ſuivent, dont deux ſont dans la Bibliotheque Bodleienne : ſavoir,

N°. 4125. *Herbarium Saxonicum (a).*

N°. 5169. *Liber medicinalis mſ. continens virtutes herbarum ſaxonicè (b).*

Et deux autres dans la Bibliotheque Harleienne : ſavoir,

N°. 5066. Intitulé, *herbarium, ſaxonicè.*

N°. 585. *Tractatus, qui ab Anglo-ſaxonibus dicebatur* LIBER MEDICINALIS : *ſcil. L. Apuleii madaurenſis libri de virtutibus herbarum, verſio anglo-ſaxonica.*

On ſait que ce Lucius Apuleius de Madaure étoit un fameux Philoſophe platonicien, qui floriſſoit vers l'an 200 de l'ere chrétienne.

Je ne trouve, après cette époque, aucun Mſ. concernant la Botanique, juſqu'au 13e. ſiecle. L'Évêque Tanner (*c*) fait mention de trois Mſſ. ſur ce ſujet, écrits par *Gilebertus Legleus, ſive Anglicus*, qui floriſſoit en l'an 1210, intitulés :

(*a*) *Cat. Mſſ. Angliæ, p.* 185.

(*b*) *Ibid. p.* 562.

(*c*) *Bibliotheca, p.* 474.

1. *De virtutibus herbarum, Mſ. Bodl. Digb.* 75.
2. *Gilberti liber de viribus & medicinis herbarum, arborum & ſpecierum. Mſ. olim Monaſt. Sion.*
3. *De re herbaria. Lib.* 1.

Le même Évêque (*a*) parle auſſi d'un John Ardern, fameux Chirurgien, qui vivoit à Newark dans le Nottinghamshire, depuis 1349 juſqu'en 1370, comme de l'Auteur d'un Mſ. qui ſe trouve maintenant dans la Bibliotheque du Chevalier Hans-Sloane, intitulé : *Volumen miſcellaneorum de re herbaria, phyſica & chirurgica.*

On trouve dans la Bibliotheque Ashmoléene les Mſſ. ſuivans (*b*).

L'un (n°. 7704.) intitulé : Traité de Chirurgie, avec un herbier, &c. en vieux anglois, *in*-4°. 1438.

Un autre (n°. 7709.) intitulé Herbier (an herbary), &c. rangé par ordre alphabétique ſuivant les noms latins, écrit en 1443.

Et un 3e. (n°. 7537.) intitulé : Livre de plantes & d'animaux, deſſinés en couleurs naturelles ſur velin, vieux anglois. A. D. 1504.

M. Ames nous apprend, dans ſes Antiquités Ty-

(*a*) *Bibliotheca, p.* 48.

(*b*) *Cat. Mſſ. Angl., p.* 341.

Ann. 1773. Tom. 63. Renouvellement de la Botanique.

pographiques, p. 470, qu'en 1516, Peter Treveris imprima à Southwark un livre in-fol°. intitulé : le Grand Herbier (the greate herball). Je crois que c'eſt le plus ancien livre imprimé que nous ayons ſur la Botanique.

Pour venir à des tems moins reculés : M. Gough rapporte, dans ſa Topographie Britannique, p. 61, « qu'avant l'année 1597, John Gerrard, Citoyen & » Chirurgien de Londres, paroît être le premier qui » ait cultivé un grand jardin médicinal; & qu'il l'a- » voit près de ſa maiſon dans Holborn, & y élevoit » 1100 plantes & arbres de différente eſpece ». Il auroit pu ajouter que Gerrard avoit un autre jardin médicinal dans Old-Street, contenant un grand nombre de plantes diverſes, dont on trouve le catalogue imprimé dans les Bibliotheques des curieux. Mais Gerrard eut un célebre contemporain qui avança beaucoup cette Science importante, & dont les Biographes modernes n'ont dit juſqu'ici que fort peu de choſe.

Je veux parler de John Tradeſcant. Il étoit Flamand ou Hollandois, ſuivant Antoine Wood. Parkinſon nous apprend qu'il avoit voyagé dans la plupart des contrées de l'Europe & dans la Barbarie ; & il paroît clairement par les emblêmes qu'on voit encore ſur ſon monument, dans le cimetiere de

de Lambeth, qu'il avoit visité la Grece, l'Égypte & d'autres parties de l'Orient.

Ann. 1773. Tom. 63. Renouvellement de la Botanique.

On suppose qu'il avoit recueilli dans ses voyages non seulement des plantes & des semences, mais encore la plus grande partie des curiosités en tout genre, qui après sa mort furent vendues par son fils au fameux Elie Ashmole, & déposées dans son Muséum à Oxford.

On ne peut déterminer précisément en quel tems il fixa sa résidence en Angleterre. Il est à présumer que ce fut vers la fin du regne d'Elisabeth, ou au commencement de celui de Jacques Ier.; si l'on en juge par son portrait, gravé par Hollar avant l'année 1656, dans lequel il est représenté très-avancé en âge.

Il habitoit une grande maison à Lambeth, où son Muséum étoit souvent visité par des personnes du plus haut rang, qui contribuerent à l'augmenter. De ce nombre étoient : le Roi Charles Ier., dont il étoit Jardinier, la Reine Henriette-Marie son épouse, l'Archevêque Laud, George Duc de Buckingham, Robert & Guillaume Cecil, Comtes de Salisbury, & plusieurs autres personnes de distinction (*a*).

(*a*) On peut en voir la liste à la fin du *Musæum Tradescantianum*, in-12. Londres 1656; où sont les portraits des deux John Tradescant, gravés par Hollar.

Ann. 1773. Tom. 63. Renouvellement de la Botanique.

On peut donc regarder à juſte titre John Tradeſcant comme le premier qui ait raſſemblé dans ce royaume tout ce qu'il y a de plus curieux dans l'Hiſtoire Naturelle, en minéraux, oiſeaux, poiſſons, inſectes, &c. &c. Il avoit auſſi une bonne collection de médailles de toute eſpece, outre un grand nombre d'objets rares & extraordinaires. Le catalogue que ſon fils en a publié (*a*), contient l'énumération d'un grand nombre de plantes, d'arbres & d'arbuſtes cultivés dans ſon jardin, qui étoit d'une vaſte étendue. Quelques-unes de ces plantes ſont devenues très-rares, même au moment préſent. Cet homme induſtrieux avoit fait voir, dans l'enfance de la Botanique, qu'il n'eſt preſque aucune plante exiſtant dans le monde connu, qui ne puiſſe au moyen des ſoins convenables croître & végéter dans ce royaume.

Voici la liſte de quelques plantes, des plus remarquables qu'on doive à Tradeſcant. Je l'ai tirée d'un Ouvrage de Parkinſon, intitulé, Jardin de fleurs agréables (garden of pleaſant flowers), & imprimé en 1656.

« 1. *Pſeudonarciſſus aureus maximus, flore pleno, ſive roſeus, Tradeſcanti.* John Tradeſcant a procuré à l'Europe cette fleur, qui, par ſa

(*a*) *Ibid.*

beauté, mérite d'être nommée la gloire des asphodeles ». *Page* 102.

Ann. 1773. Tom. 63. Renouvellement de la Botanique.

2. « *Moly Homericum vel potiùs Theophrasti* ».

3. « *Moly indicum, sive caucason.* Ces deux moly sont natifs d'Espagne, d'Italie & de Grece ; d'où ils ont été tirés par John Tradescant, qui les a fait fleurir dans son jardin à Cantorbery (il faut lire à South Lambeth) ». *P.* 141.

4. « *Ephemerum virginianum Tradescanti.* Cette espece est connue depuis peu. L'Europe en doit la connoissance à cet industrieux & infatigable scrutateur des productions de la nature, John Tradescant ». *P.* 152.

5. « *Gladiolus bizantinus.* John Tradescant rencontra, dans la Barbarie, plusieurs acres de terre, couvertes de cette espece de glaieul ». *P.* 190.

6. « *Elleborus albus vulgaris.* Il croît en plusieurs endroits de l'Allemagne, comme aussi dans certains cantons de la Russie, où il est si abondant, que John Tradescant en vit assez pour charger un vaisseau de ses racines ». *P.* 346.

7. « *Nardus montana tuberosa.* Cette valeriane a été découverte, dans une course botanique, par John Tradescant ». *P.* 388.

8. « John Tradescant avoit apporté de Bruxelles une nouvelle espece d'arbousier ; mais dans l'espace

Ann. 1773. Tom. 63. Renouvellement de la Botanique.

de ſept ans, il ne put en avoir une baie complettement mûre ». *P.* 528.

9. « John Tradeſcant avoit tiré un grand nombre de nouvelles variétés de pruniers de Turquie & d'autres parties du monde ». *P.* 575.

10. « L'abricot d'Alger (the argier or algier abricot). John Tradeſcant apporta cette eſpece avec beaucoup d'autres, à ſon retour d'Alger, où il avoit été ſur l'eſcadre qui fut envoyée contre les pirates en 1620 ». *P.* 579.

Lorſque Ashmole fut en poſſeſſion de la maiſon de John Tradeſcant à South-Lambeth, il y ajouta une grande ſalle, dont la cheminée fut ornée de ſes armes, écartelées de celles du Chevalier Guillaume Dugdale, dont il avoit épouſé la fille en troiſiemes noces, & on les y voit encore aujourd'hui.

Cette maiſon appartient maintenant à Mr. John Small, qui l'acheta, il y a environ douze ans, d'un des deſcendans d'Ashmole; & ma maiſon, qui faiſoit autrefois partie de celle de Tradeſcant, y eſt attenante.

Il auroit été à ſouhaiter que les amateurs de la Botanique euſſent viſité, avant le commencement de ce ſiecle, ou du-moins peu de tems après, ce jardin autrefois ſi renommé; mais il paroît avoir été totalement négligé, juſqu'à l'année 1749, où

Ann. 1773. Tom. 63. Renouvellement de la Botanique.

le Docteur Guillaume Watſon, & feu le Docteur Mitchel, nous donnerent le ſeul détail maintenant exiſtant des reſtes du jardin de Tradeſcant. (Voyez ci-deſſus ART. VII, page 265.

Je n'ai pu découvrir en quel tems mourut John Tradeſcant. Heſter veuve de ſon fils John Tradeſcant, fit élever en 1662, dans la partie méridionale du cimetiere de Lambeth, un ſingulier monument pour lui & pour le reſte de ſa famille, qui eſt éteinte depuis long-tems.

Ce monument a tant ſouffert des injures de l'air qu'on ne ſauroit, par l'inſpection, ſe former une idée des côtés du nord & du midi; mais cette perte eſt heureuſement ſuppléée par deux beaux deſſins, conſervés dans la Bibliotheque de M. Pepys à Cambridge. On y voit du côté du levant, les armes de Tradeſcant; du côté du couchant, une hydre, & au deſſous une tête de mort; du côté du midi, des colonnes briſées, des chapiteaux d'ordre corinthien, &c. qu'on ſuppoſe des ruines de la Grece, ou de quelqu'autre partie de l'Orient; du côté du nord, un crocodile, des coquillages, &c. avec des édifices égyptiens. Différentes figures d'arbres, &c. en relief, en ornent les quatre angles.

L'épitaphe qui ſuit étoit deſtinée pour ce monument; mais elle n'y a jamais été placée. On la

Ann. 1773. Tom. 63. Renouvellement de la Botanique.

conſerve à Oxford, & elle eſt imprimée dans les Antiquités de Surrey, de M. Aubrey, p. 11.

Know ſtranger, e'er thou paſs, beneath this ſtone
Lie John Tradeſcant, grandſire, father, ſon.
The laſt dy'd in his ſpring; the other two
Liv'd till they had travelled Art and Nature thro'.
As by their choice collections may appear,
Of what is rare in land, in ſeas, in air:
Whilſt they (as Homer's Iliad in a nut)
A world of wonders in one cloſet shut.
Theſe famous Antiquarians that had been
Both Gardiners to the Roſe and Lilly Queen,
Tranſplanted now themſelves, ſleep here; and when
Angels shall with their trumpets awaken men,
And fire shall purge the world, theſe hence shall riſe,
And change their garden for a paradiſe.

En voici la traduction vers par vers.

Paſſant, apprends que ſous cette pierre
Giſſent John Tradeſcant, aïeul, pere & fils.
Le dernier mourut dans ſon printems; les deux autres
Vécurent juſqu'à ce qu'ils euſſent parcouru l'Art & la Nature;
Comme on peut le voir par leurs collections choiſies
De ce qu'il y a de rare ſur la terre, dans les mers & dans l'air;
Puiſqu'ils renfermerent (comme l'Iliade d'Homere dans une noix)
Un monde de merveilles dans un cabinet.

Ces fameux Antiquaires, qui avoient été
L'un & l'autre Jardiniers de la Reine de la Roſe & du Lys,
Maintenant tranſplantés eux-mêmes, repoſent en ce lieu; & lorſque
Les anges au ſon de leurs trompettes réveilleront les hommes,
Et que le feu purifiera le monde, ils ſe leveront d'ici,
Et changeront leur jardin pour un paradis.

Ann. 1773. Tom. 63. Renouvellement de la Botanique.

ART. XXI.

Deſcription d'une plante rare d'Amérique, du genre des Brownea. *Avec quelques remarques ſur ce genre. Par M. Peter Jonas Bergius, Membre de la Société Royale. Lu le* 11 *Février* 1773.

M. Jacquin, dans ſes voyages en Amérique, fonda le genre *Brownea*, en mémoire du Docteur Patrick Browne, célebre Botaniſte Anglois; mais il n'en trouva qu'une eſpece, & le Chevalier Linné n'en a pas connu davantage. J'ai maintenant des exemplaires d'une nouvelle eſpece de Brownée, qui me mettent en état d'établir les caracteres de ce genre, avec ſes différences ſpécifiques. M. Pihl, de qui j'ai reçu ces plantes, les avoit cueillies à Portobello en Amérique.

Ann. 1773. Tom. 63. Brownea *Roſa de monte.*

Ann. 1773. Tom. 63. Brownea *Roſa de monte.*

Si l'on compare la deſcription de l'eſpece de M. Jacquin, avec celle que je donne de la mienne, on verra avec quel ſoin la nature a obſervé le même ordre & la même poſition des parties eſſentielles dans toutes les deux: circonſtance commune à tous les genres naturels.

BROWNEÆ GENUS.

1. BROWNEA *coccinea*, floribus disjunctis umbellatis.

Brownea *coccinea. Linn. Sp. Pl.* 958. *Jacq. Hiſt. Stirp. Americ.* 194. * *Tab.* 121.

Habitat in rupeſtribus ſylvaticis Zaucæ, ad ſinum Venezuelæ, Americes.

DESCRIPTIO.

Apud Jacquinium, loco citato.

2. BROWNÆA *Roſa de monte*, floribus aggregato-capitatis ſeſſilibus, ſtaminibus longiſſimis.

Hermeſias. *Læfling. Itin. p.* 278. *

Habitat in montoſis Terræ firmæ, Portobello.

DESCRIPTIO.

CAULIS arboreus.

Rami toruloſi, cortice cinereo.

Ann. 1773. Tom. 63. Brownea *Roſa de monte*

Ramuli, ſeu petioli communes, ſubalterni, teretes, glabri, baſi geniculo ſuberoſo rugoſo, patentes.

Folia coriacea, ſpithamæa, oppoſita, ovato-oblonga, integerrima, longiùs acuta, utrinque glabra, nervis alternis obſoletis, breviter petiolata; inferiora ſensìm minora; infima ovata, baſi ſubcordata.

Petiolelli breves, craſſi, rugoſi.

FLORES intrà calycem communem aggregati in capitulum, ſeu faſciculum ſubrotundum, ſpecioſiſſimum, magnitudine pugni.

Faſciculi ſolitarii, alterni, diſtantes, ſeſſiles, ſubaxillares.

CALYX *communis* imbricatus: foliolis ſeu bracteis ovatis, acutiuſculis, ſubmembranaceis, concavis, laxiuſculis, glabris, bipollicaribus, rubicundis; ſingulis includentibus ſingulos vel etiam 2 aut 3 flores; deciduis; exterioribus rotundatis; interioribus minoribus, ſensìm linearibus.

Perianthium proprium cylindricum, tubulatum, ſupernè paululùm ampliatum, rubicundum, villoſum, bifidum: laciniis ovatis, acutiuſculis, ſubæqualibus, erectis.

COROLLA *univerſalis* uniformis, ſanguinea.

Propria duplex.

Exterior infundibuliformis, calyce longior: tubus cylindricus, ſubangulatus, deorsùm anguſtatus, ſub-

Ann. 1773. Tom. 63. Brownea *Rosa de monte.*

coriaceus, perſiſtens; limbus quinquefidus (ſæpè quadrifidus): laciniis lanceolatis, obtuſis, erectis, inæqualibus, unicâ duplò latiore, deciduis.

Interior pentapetala: petalis ovato-lanceolatis, obtuſis, latiuſculis, erectis, corollâ exteriore ferè duplò longioribus: unguibus ſubulatis, margini tubi corollæ exterioris inſertis.

STAMINA. *Filamenta* conſtanter undecim, filiformia, longiſſima, hoc eſt, corollâ duplò longiora, erecta, ſubcurvata, æqualia, infernè coalita in tubum integrum, anticè hiantem, germen cingentem, margini tubi corollæ exterioris adnatum, dein in filamenta baſi æqualia fiſſum.

Antheræ ovatæ, incumbentes.

PISTILLUM. *Germen* ſuperum, è tubo corollæ exterioris pedunculatum: pedunculo tubo adnato; cylindricum, tomentoſum.

Stylus filiformis, longitudine ſtaminum, inflexus.

Stigma ſimplex.

PERICARPIUM. *Legumen* oblongum, compreſſum, circà diſſepimentum anguſtatum, plerùmque biloculare:

Diſſepimento membranaceo.

SEMINA ſolitaria, ovata, compreſſa, rugoſiuſcula, fibris fungoſis obvoluta.

(Voy. la Pl. I.)

ART. XXII.

*Deſcription d'une plante dont le ſuc eſt l'*Aſſa-fœtida. *Par le Docteur John Hope, Membre de la Société Royale. Lu le 9 Décembre* 1784.

Edimbourg le . . . Janvier 1783.

Ann. 1785. Tom. 75. Ferula *Aſſa-fœtida*

L'uſage de l'*aſſa-fœtida* fut introduit dans la Médecine par les Arabes, il y a près de mille ans. On a employé cette drogue pendant des ſiecles, ſans avoir aucun détail ſatisfaiſant ſur la plante qui la produit, juſqu'en 1712, que Kæmpfer publia ſes *Amœnitates Exoticæ*.

Kæmpfer, vers la fin du ſiecle dernier, voyagea dans une grande partie de l'Aſie, dans la Perſe, & ſur les lieux même où l'on recueille l'aſſa-fœtida. Il donne un détail circonſtancié de la maniere de la recueillir. Il décrit la plante qui la fournit; & ſa deſcription eſt accompagnée d'une figure qui differe à bien des égards de celles que je préſente maintenant à la Société Royale (*a*).

(*a*) *Note du Chevalier Joſ. Banks, Préſident de la Société Royale.* La plante d'aſſa-fœtida, de Kæmpfer, eſt probablement une eſpece différente de celle que décrit le Docteur Hope dans ce Mémoire. Kæmpfer a été en perſonne ſur

Ann. 1785. Tom. 75. Ferula *Aſſa-fœtida*

Le Docteur Guthrie, Membre de la Société Royale, m'envoya de St. Petersbourg, il y a ſix ans, deux racines d'aſſa-fœtida avec le billet ſuivant du Docteur Pallas. « Le Docteur Pallas fait » ſes complimens au Docteur Guthrie : il lui envoie » deux racines de Ferula *Aſſa-fœtida* : plante qu'il » croit qui n'a jamais été cultivée dans aucun jardin » en Europe, & que perſonne que lui n'a été » aſſez heureux pour faire lever de ſemences ; » quoique les graines qui avoient été envoyées » des montagnes de Ghilan, en Perſe, à l'Aca- » démie, euſſent été diſtribuées à pluſieurs cu- » rieux ».

Ces deux racines furent plantées en pleine terre dans le jardin de Botanique d'Edimbourg. L'une mourut. L'autre au bout de quelque tems végéta, & s'accrut ; l'été dernier elle pouſſa des fleurs & des graines. J'en fis faire par M. Fife un deſſin exact. Il exprime très-bien le port général de la plante, qui étoit d'un verd de mer pâle, & avoit

---

les montagnes où l'on recueille cette drogue ; & il n'a jamais été accuſé de manquer de fidélité, ſoit dans ſes deſcriptions, ſoit dans ſes figures. Le ſang-dragon & quelques autres gommes ſont produits indifféremment par diverſes eſpeces de plantes : pourquoi l'aſſa-fœtida ne ſeroit-elle pas dans le même cas ?

Ann. 1785. Tom. 75. Ferula *Aſſa-fœtida*

trois pieds de hauteur (*a*). La tige eſt caduque, mais la racine eſt vivace. Chaque partie de la plante répandoit lorſqu'on la bleſſoit, un ſuc laiteux épais, ayant l'odeur & le goût de l'aſſa-fœtida; & quelquefois on ſentoit à la diſtance de quelques pieds une odeur d'ail, pareille à celle qu'exhale une foible teinture de cette drogue.

En Perſe on coupe la racine à pluſieurs repriſes dans la ſaiſon convenable. Il découle des inciſions un ſuc de la conſiſtance de la crême, lequel étant épaiſſi conſtitue l'aſſa-fœtida.

J'ajouterai que puiſque cette plante croît en plein air, ſans abri; qu'elle a même produit beaucoup de ſemences dans une ſaiſon peu favorable, ſon ſuc paroiſſant de la même nature que l'aſſa-fœtida du commerce, il y a lieu d'eſpérer qu'elle pourra devenir un article de culture de quelque importance dans ce pays.

DESCRIPTION *Botanique de la* FERULA *Aſſa-fœtida.*

PLANTA *umbellifera*, tripedalis, erecta, ramoſa, glauca, flore luteo.

Radix perennis.

(*a*) Voyez pour la figure de cette plante l'original des Tranſact. Philoſ. Vol. cité, p. 38.

Ann. 1785. Tom. 75. Ferula *Aſſa-fœtida*

Folia radicalia ſex, procumbentia, trilobo-ovata, multoties pinnatim diviſa; foliolis inciſis, ſubacutis, ſubdecurrentibus; petiolo communi ſupernè plano, lineâ elevatâ longitudinaliter per medium decurrente.

Caulis bipedalis, erectus, teretiuſculus, annuus, leviter ſtriatus, glaber, nudus præter unam circà medium foliorum imperfectorum conjugationem; petiolo membranaceo, concavo.

Rami nudi, patuli; quorum tres inferi, alterni, ſuſtinentur ſinguli folii imperfecti petiolo membranaceo concavo. Quatuor intermedii verticillati ſunt. Supremi ex apice caulis octo, quorum interni erecti.

Omnes hi rami ſummitate ſuſtinent umbellam compoſitam ſeſſilem terminalem, & præterea 3 — 6 ramulos externè poſitos, umbellas compoſitas ferentes. Hoc modo, rami inferiores ſuſtinent 5, rarò 6 ramulos: intermedii 3 vel 4; ſuperiores 1 & 2.

CALYX. *Umbella univerſalis* radiis 20 — 30 conſtat.

Umbella partialis floſculis ſubſeſſilibus 10 — 20.

Umbella compoſita ſeſſilis convexo-plana.

Umbella compoſita pedunculata hemiſphærica.

Involucrum univerſale nullum.

Involucrum partiale nullum.

Ann. 1785. Tom. 75. Ferula *Aſſa-fœtida*

Perianthium proprium vix notabile.

COROLLA *univerſalis* uniformis.

Floſculi umbellæ feſſilis fertiles.

Floſculi umbellæ pedunculatæ plerumque abortiunt.

Propria, petalis quinque æqualibus, planis, ovatis: primò patulis, dein reflexis, apice aſcendente.

STAMINA. *Filamenta* 5, ſubulata, corollâ longiora, incurvata.

Antheræ ſubrotundæ.

PISTILLUM. *Germen* turbinatum, inferum.

Styli duo, reflexi.

Stigmata apice incraſſata.

PERICARPIUM nullum: fructus oblongus, plano-compreſſus, utrinque 3 lineis elevatis notatus eſt.

SEMINA duo, oblonga, magna, utrinque plana, 3 lineis elevatis notata.

Planta odorem alliaceum diffundit. Folia, rami, pedunculi, radix, truncus, ſecti ſuccum fundunt lacteum, ſapore & odore Aſſæ-fœtidæ.

ART. XXIII.

Sur la qualité ſenſitive de l'arbre Averrhoa *Carambola. Par le Docteur Robert Bruce. Lu le 14 Avril* 1785.

Calcutta 23 Novembre 1783.

Ann. 1785. Tom. 75. Averrhoa Carambola

Cet arbre, nommé au Bengale *camruc* ou *camrunga*, a une propriété analogue à celle des eſpeces de *mimoſa* qu'on nomme ſenſitives. ſes feuilles, qui ſont pinnées avec une impaire, ſe meuvent très-viſiblement lorſqu'on les touche. Mais la faculté de ſe mouvoir ne s'étend pas aux rameaux comme dans les ſenſitives.

L'Auteur a reconnu, par ſes expériences, que la ſenſibilité de ces feuilles réſide dans les pétioles.

Les feuilles de cet arbre paroiſſent s'endormir après le coucher du ſoleil. Elles ſe rapprochent alors l'une de l'autre en deſſous, au point de ſe toucher, & exécutent ainſi d'elles-mêmes un mouvement d'extenſion plus conſidérable que celui qu'on peut leur donner dans le jour par des impreſſions extérieures.

Linné fait mention de deux autres eſpeces de ce genre :

genre : ſavoir, Averrhoa *Bilimbi*, & Averrhoa *acida*. L'Auteur n'a pas été à portée de voir la premiere. Quant à la ſeconde, elle ne lui paroît pas appartenir à la même claſſe : auſſi ſes feuilles n'ont-elles pas le moindre mouvement ſpontané.

Ann. 1785. Tom. 75. Averrhoa *Carambola*

La deſcription générique de l'Averrhoa, ainſi que de pluſieurs autres plantes des Indes, que Linné n'avoit pas eu l'occaſion de voir fraiches, n'eſt pas tout-à-fait exacte, ſuivant notre Auteur. Les pétales dans ce genre ſont réunis par la partie inférieure de leurs lames, de maniere qu'ils forment une corolle monopétale, portée par cinq onglets diſtincts, qui reſtent quand elle tombe. Les étamines ſont au nombre de cinq paires, placées dans les angles du germe. Il n'y en a qu'une de chaque paire qui ſoit fertile ou garnie d'une anthere. Les filets ſont courbés & adaptés à la forme du germe. On peut les preſſer doucement de maniere à les faire tenir abattus ; & alors pour peu qu'on les ſouleve, ils ſe redreſſent avec élaſticité. Les étamines fertiles ont deux fois la longueur de celles qui ſont ſans antheres.

ART. XXIV.

Maniere de conſerver les plantes. Par le Chevalier Robert Southwell. Année 1698. N°. 237.

Ann. 1698. N°. 237. Maniere de conſerver les plantes.

Préparez deux plaques de fer de la grandeur que vous voulez donner à vos exemplaires de plantes. Il les faut aſſez épaiſſes pour ne pas fléchir; très-liſſes d'un côté, & percées à chaque coin pour le paſſage de quatre écroux diſtinés à les preſſer l'une contre l'autre. Prenez enſuite vos fleurs, feuilles, &c. dans leur état de perfection. Étendez-les ſur un papier brun, de maniere que les feuilles ſoient bien diſtinctes. Si les fleurs ſont grandes, il faut mettre un peu plus de papier par deſſous; ſi elles ſont épaiſſes, de même que la tige, on peut en enlever la moitié, afin d'applatir le tout. Enlevez & mettez de côté quelques feuilles, que vous ajouterez enſuite à la plante pour la completter. Après avoir mis un autre lit de papier brun par deſſus, ſerrez le tout fortement entre les deux plaques de fer, & mettez cette machine dans un four dont on vient de retirer le pain. Au bout de deux heures retirez-la, ôtez-les fleurs.

Prenez enſuite un mêlange d'eau forte & d'eau

de-vie à doſe égale, paſſez-en avec un pinceau ſur les feuilles des fleurs. Mettez-les après cela ſur de nouveau papier brun, & preſſez-les doucement avec un mouchoir ou avec les mains pour les ſécher. Faites diſſoudre gros comme une noix muſcade de gomme adragant dans une livre d'eau pure: la diſſolution ſera faite en moins de 24 heures; & avec un pinceau fin, enduiſez de cette eau gommée la ſurface inférieure de vos fleurs & de vos feuilles, pour qu'elles s'attachent. Mettez-les enſuite dans votre herbier, elles s'y coleront & paroîtront toujours fraîches.

Ann. 1698. N°. 237. Maniere de conſerver les plantes.

ART. XXV.

Notice des Mémoires de Botanique qui n'ont pu trouver place dans cet ABRÉGÉ.

1. Chêne nain, de la Nouvelle Angleterre. Par MM. J. Winthrop & Fr. Willoughby. Ann. 1670. N°s. 57 & 58. *Voyez la Collect. Acad. Partie Étrangere, Tom. II, pag.* 239 *&* 259.

2. Sur l'arbre à cacao. Par ***. Ann. 1673. N°. 93. *Collect. Acad. Part. Étr. Tom. IV, p.* 35.

Notice des Mémoires de Botanique, &c.

Notice des Mémoires de Botanique, &c.

3. *Sorbus pyriformis.* Par M. Edmond Pitt. Ann. 1678. N°. 139. *Collect. Acad. Part. Étr. Tom. IV, p.* 83.

L'Auteur dit qu'il a trouvé cet arbre croiſſant naturellement dans une forêt du Vorceſtershire.

4. » M. de Villermont, au rapport du rédacteur des Tranſact. Philoſ. Ann. 1685, n°. 172, avoit une ſorte de cannelle, venue de la Guadaloupe, de couleur blanche. Il en avoit une autre qui venoit du Maragnon, & qui reſſembloit à celle de Ceylan ».

« Il avoit auſſi un épi du petit millet de Guinée, d'environ dix pouces de longueur, fait exactement comme la panicule du roſeau ; les grains ne ſont pas plus gros qu'une tête d'épingle & ſont très-bons à manger. Les Negres en font leurs meilleurs gâteaux ».

5. Sur le cannellier ſauvage. Par le Docteur Hans Sloane. Ann. 1691. N°. 192.

C'eſt l'*arbor baccifera laurifolia aromatica, fructu viridi calyculato racemoſo* (*a*), dont l'écorce, ſuivant l'Auteur, paſſoit mal-à-propos dans les boutiques pour la véritable écorce de Winter.

6. Sur la véritable écorce de Winter. Par le Docteur Hans Sloane. Ann. 1693. N°. 204.

(*a*) Canella *alba. Linn. Syſt. Veget. Ed. XIV.*

Notice des Mémoires de Botanique, &c.

L'Auteur donne la deſcription & la figure de cet arbre : *Laurifolia magellanica, cortice acri. C. B. P.*, qui, ſelon les Modernes, eſt le même que celui de l'Article précédent. Il en a été fait mention dans la Partie de cet Abrégé, intitulée MATIERE MÉDICALE, Tom. Ier. ART. LV, *p.* 435.

7. Diſſertation ſur la cannelle & ſur le *caſſia lignea*. Par M. Taylor White, Membre de la Société Royale. Ann. 1758. Tom. 50. 2e. partie, pag. 860.

L'objet de ce Mémoire eſt d'établir que la cannelle de Ceylan eſt la même ſorte d'arbuſte qui croît dans le Malabar, à Sumatra, &c. ſous le nom de *caſſia lignea*; & l'Auteur penſe que les écorces qu'on nous apporte ſous ces noms reſpectifs ne different que par la culture, & par la préparation qu'on leur donne. Le vrai cannellier eſt coupé tous les trois ans : ce qui rend raiſon de la groſſeur & des formes de l'écorce qu'on tire de ſes jets. Les Hollandois font ſécher cette écorce dans du ſable; & c'eſt un bon moyen de lui enlever la viſcoſité dont on ſe plaint dans la *caſſia lignea*.

8. L'arbre d'argent du Cap de Bonne Eſpérance. Par le Docteur Hans Sloane. Ann. 1693. N°. 198.

L'Auteur donne la deſcription & la figure du *leucadendros africana, arbor tota argentea ſericea*,

Notice des Mémoires de Botanique, &c.

foliis integris. Pluk. Alm. 212, *t.* 200, *f.* 1. Atlas-tree, *D. Herman.* [Protea *argentea. Linn.*

9. Autre arbre conifere du Cap de Bonne Eſpérance. Par le même. *Ibid.*

Le Docteur Goddart avoit apporté du Cap de Bonne Eſpérance, une branche de cet arbre avec le fruit, de même qu'une branche de l'arbre d'argent. Le Docteur Hans Sloane en donne auſſi la deſcription & la figure, & la nomme : *Conifera, alypi folio, ſeminibus pennatis, pluribus in medio coni conglomeratis, & non inter ſquamas, aliorum conorum more, naſcentibus.*

10. *Phytologia tingitana :* ou Catalogue alphabétique des plantes qui croiſſent dans les fortifications de Tanger. 1673. Par M. Spotſwood. Ann. 1693. N°. 200.

11. Sur les truffes. Par le Docteur Tancr. Robinſon. Ann. 1693, 1694. N°s. 202, 204.

Il annonce que le Docteur Hatton a trouvé de vraies truffes à Rushton, dans le Northamptonshire; quoique M. Ray n'eût pas compté les truffes parmi les végétaux indigenes de la Grande Bretagne.

12. Détails ſur l'arbre à café. Par le Docteur Hans Sloane. Ann. 1694. N°. 208.

13. L'agneau de Tartarie. Par le Docteur Hans Sloane. Ann. 1698. N°. 247.

Notice des Mémoires de Botanique, &c.

Il eſt queſtion d'une racine velue dont on a coupé les tiges, & qui par ſes protubérances repréſente juſqu'à un certain point un agneau ſur ſes jambes. Linné en a donné la deſcription dans le *Species Plantarum* ſous le nom de Polypodium *Baromez*. Voyez l'Article qui ſuit.

14. Diſſertation ſur l'agneau de Scythie végétal. *En latin.* Par le Docteur J. Phil. Breynius, de Dantzic, Membre de la Société Royale. Aun. 1725. N°. 390.

Les anciens Auteurs d'Hiſtoire Naturelle ont parlé de cette prétendue merveille de la nature, ſous le nom de *baramez*, *boromets*, ou *boranez*. Tout ce qu'ils en ont rapporté n'eſt qu'une fable; & les pieces de ce genre qu'on a admirées dans les cabinets des Curieux ſont des ouvrages de la charlatanerie, &c.

15. Sur la ſerpentaire de Virginie. Par M. J. Baniſter. Ann. 1698. N°. 247.

16. Sur le vrai amome ou *tugus* des iſles Philippines. *En latin.* Par P. G. Camelli. Ann. 1699. N°. 248.

17. Nouvelle eſpece de noyer, &c. Par M. Reneaume. Ann. 1701. N°. 273.

18. Catalogue de quelques plantes rares, nouvellement obſervées dans quelques jardins curieux, autour de Londres, & particulierement dans le jardin

Notice des Mémoires de Botanique, &c.

médicinal de la Compagnie des Apoticaires ; à Chelſea. Par M. J. Pettiver. Ann. 1711, 1712, 1713, 1715. N°s. 332, 333, 337, 343, 344, 346.

19. Sur une plante de Tartarie, nommée *ginſeng*, &c. Par le Pere Jartoux. Extrait du Xe. Vol^e. des Miſſionnaires Jéſuites. Ann. 1713. N°. 337.

20. Deſcription de la fleur & du vaiſſeau ſéminal de la plante nommée *crocus autumnalis ſativus*, qui produit le vrai ſaffran d'Angleterre qu'on vend dans les boutiques. Par le Docteur James Douglas, Membre de la Société Royale. Ann. 1723. N°. 380.

21. Nouvelle famille de plantes nommée *oxyoides*. Par M. Garcin. *Traduit du françois*, par John Martin, Membre de la Société Royale. Ann. 1730. N°. 415.

Il eſt queſtion de l'Oxalis *ſenſitiva. Linn.*, dont l'Auteur donne la deſcription & la figure. Le Traducteur ajoute que ce n'eſt pas une eſpece nouvelle; qu'elle a été décrite, il y a long-tems, par A Coſta & autres, ſous le nom d'*herba viva*, & qu'il en a vu un bel exemplaire dans l'herbier du Chevalier Hans Sloane. Ce fut la premiere plante ſenſitive connue en Europe : bien différente de celles qu'on apporte d'Amérique, & qu'on cultive dans les jardins ſous ce titre.

22. Remarques ſur la famille de plantes, nommée

muſa. Par M. Garcin. *Traduit du françois*, par John Martin, Membre de la Société Royale. Ann. 1730. N°. 415.

Notice des Mémoires de Botanique, &c.

23. Deſcription du *cereus peruvianus*, qui fleurit à Nuremberg en 1730. Par le Docteur Chriſtoph. James Trew, Membre de la Société Royale. *Traduit du latin*, par le Docteur T. Stack. Ann. 1730. N°. 416.

24. Invitation de concourir à la publication d'une Hiſtoire des plantes de la Suiſſe. Par J. J. Scheuchzer, D. M. Membre de la Société Royale. *Traduit en anglois*, par M. Zollman, Membre de la Société Royale. Ann. 1731. N°. 421.

C'eſt un Proſpectus dans lequel l'Auteur rend compte de ſon plan, & invite les Amateurs à contribuer aux frais de gravure, &c. Il annonce qu'entr'autres figures, dont il ornera ſon Ouvrage, il emploiera celles de Fuchſius, dont il a acheté les cuivres.

25. Établiſſement d'un nouveau genre de plantes, nommé *Mangoſtans* par les Malayes. Par le Docteur L. Garcin, Membre de la Société Royale. *Traduit du françois*, par M. Zollman, Membre de la Société Royale. Ann. 1734. N°. 431.

Il s'agit du Garcinia *Mangoſtana*. *Linn.* dont l'Auteur donne la deſcription accompagnée de figures.

26. Obſervations botaniques contenant d'exactes

Notice des Mémoires de Botanique, &c.

descriptions de quelques plantes. Par le Docteur Paul-Henry-Gerard Moehring. Ann. 1739. N°. 454.

L'Auteur parle de six plantes, dont voici les noms triviaux :

Salicornia *herbacea. Linn.*

Verbascum *Blattaria. Linn.*

Senecio *erucifolius. Linn.*

Illecebrum *verticillatum. Linn.*

Ruppia *maritima. Linn.*

Hippuris *vulgaris. Linn.*

27. Description du *cyanus foliis radicalibus partìm integris, partìm pinnatis, bracteâ calycis ovali, flore sulphureo.* Par Albert Haller, Professeur d'Anatomie & de Botanique, à Gottingue, &c. Ann. 1744. N°. 472.

C'est le Centaurea *orientalis. Linn.* dont l'Auteur donne la description & la figure.

28. Sur une plante peu connue & jusqu'ici non décrite. Par Guillaume Watson, Membre de la Société Royale. Ann. 1744. N°. 474.

L'Auteur décrit le Lycoperdon *Carpobolus. Linn.* & en donne la figure.

29. Sur deux plantes rares en Angleterre. Par M. Guillaume Watson, Membre de la Société Royale. Ann. 1752. Tom. 47, pag. 428.

L'Auteur présenta à la Société Royale quelques exemplaires de deux plantes alors en fleurs. L'une

eſt le Lathræa *ſquamaria. Linn.* que Ray, dans ſon *Synopſis Plantarum Angliæ*, place dans le Surrey, & qui a été cueillie en Middleſex. L'autre eſt le Dentaria *bulboſa. Linn.* qui avoit entierement échappé aux recherches de Ray, & qui a été trouvée auſſi en Middleſex, par M. Blackſtone, habile Apoticaire de Londres.

30. Sur des boules végétales. Par M. Guillaume Dixon, Membre de la Société Royale. Avec des remarques, par M. Guillaume Watſon, Membre de la Société Royale. Ann. 1752. Tom. 47, p. 498.

Ces boules ſe trouvent dans un lac du Yorkshire. M. Watſon, à qui elles furent envoyées par M. Dixon, les préſenta à la Société Royale comme un végétal qu'il n'avoit jamais vu auparavant, & dont les Auteurs de Botanique ne faiſoient pas mention.

C'étoient des maſſes creuſes, couleur de mouſſe verte foncée, de figure ſphérique irréguliere, de différentes groſſeurs : ayant depuis un pouce & demi juſqu'à trois pouces de diametre ; couvertes d'un duvet très-court. Leur épaiſſeur étoit d'environ un quart de pouce. M. Watſon les regardoit comme une eſpece de *conferva*, à laquelle il donna le nom de *conferva globoſa.*

31. Deſcription de deux plantes : *Haleſia tetraptera* & *Gardenia jaſminoides* (Gardenia *florida.*

Notice des Mémoires de Botanique, &c.

Linn.). Par M. John Ellis, Membre de la Société Royale. Ann. 1760. Tom. 51, 2e. partie, p. 929.

L'Auteur a donné à ces deux genres de plantes le nom des Docteurs Étienne Hales & Alexandre Garden. Il joint à leur deſcription & à leurs caracteres génériques & ſpécifiques, des figures très-exactes.

32. Détails ſur le *Gardenia*. Par le Docteur Daniel C. Solander. Ann. 1762. Tom. 52, 2e. partie, p. 654.

Il eſt queſtion du *Gardenia jaſminoides*, ainſi nommé par M. Ellis. (Voyez l'art. précédent).

Cet arbriſſeau eſt connu en Angleterre ſous le nom de jaſmin du Cap (Cape jaſmine). Il y fut apporté du Cap de Bonne Eſpérance en 1744; & l'individu qu'on y tranſplanta, produiſit des fleurs doubles : ce qui porte l'Auteur à penſer qu'il n'eſt pas naturel au Cap même, & que ſon vrai pays natal eſt la Chine, où l'avoit obſervé M. Cunningham.

Les Chinois ſe ſervent de ſes ſemences pour teindre en écarlate. Le Docteur Solander voudroit qu'on eſſayât de le naturaliſer pour le même uſage dans les Colonies de l'Amérique.

Il confirme d'ailleurs tout ce qu'avoit dit M. Ellis de ſes caracteres génériques; il en donne la figure, & y joint les ſynonymes des Auteurs.

Notice des Mémoires de Botanique, &c.

33. Deſcription de l'andrachné, avec ſes caracteres botaniques. Par G. D. Ehret, Membre de la Société Royale. Ann. 1767. Tom 57, p. 114.

L'Auteur a joint à ſa deſcription de l'Arbutus *Andrachne. Linn.*, une excellente figure de cet arbuſte.

34. Sur une plante rare, trouvée dans l'iſle de Skye. Par le Docteur John Hope, Membre de la Société Royale, Profeſſeur de Médecine & de Botanique dans l'Univerſité d'Edimbourg. Ann. 1769. Tom. 59, p. 241.

C'eſt une deſcription botanique très-détaillée, accompagnée de figures, de l'Eriocaulon *decangulare. Linn.*

35. Lettre de M. John Ellis, Membre de la Société Royale, au Docteur Linné, Membre de la même Société, avec les caracteres & la figure d'un arbre toujours verd, nommé par les Jardiniers anglois *the loblolly-bay;* d'après des fleurs de cet arbre qui a fleuri près de Londres. L'objet de cette lettre eſt de montrer que ce n'eſt pas un *hibiſcus*, comme M. Miller le nomme, ni un *hypericum*, comme le Docteur Linné le ſuppoſe; mais un genre tout-à-fait différent & nouveau, auquel l'Auteur donne le nom de *Gordonia*. Ann. 1770. Tom. 60, p. 518.

Notice des Mémoires de Botanique, &c.

M. Ellis ayant examiné les fleurs de cet arbre, a reconnu qu'il appartient à la Monadelphie. Il en a fait un nouveau genre sous le nom de *Gordonia*, & il a nommé cette espece, qui est la seule connue, *Gordonia Lasianthus* : dénomination adoptée par Linné dans les Éditions de ses Ouvrages, postérieures à l'époque de cette lettre.

36. Description d'une espece d'ophris dont il est fait mention par Gronovius dans le *Flora Virginica*, p. 185, sous le nom d'*ophris scapo nudo, foliis radicalibus ovato-oblongis, dimidii scapi longitudine.* Par George Den. Ehret, Membre de la Société Royale. Ann. 1763. Tom. 53, p. 81.

Cette espece d'ophris, que Linné a nommée Ophrys *lilifolia*, fleurit en 1758 pour la premiere fois en Angleterre, dans le jardin de plantes étrangeres de M. Peter Collinson, qui l'avoit reçue de M. Bartram, de Philadelphie.

L'Auteur en donne la description & la figure.

37. Sur quelques plantes qui se trouvent en certaines parties de l'Angleterre. Par M. Richard Waring, Membre de la Société Royale. Ann. 1771. Tom. 61, p. 359.

C'est un catalogue de quelques plantes indigenes, croissant dans des lieux dont on n'avoit pas encore fait mention, &c. Avec des observations sur leur

pays natal, & ſur la difficulté de déterminer avec quelque certitude quelles ſont les plantes vraiment indigenes dans une contrée.

Notice des Mémoires de Botanique, &c.

38. Journal de trois voyages de la ville du Cap dans les parties méridionales de l'Afrique; entrepris pour la découverte de nouvelles plantes, deſtinées à enrichir le Jardin Royal de Botanique à Kew. Par M. Francis Maſſon, l'un des Jardiniers de Sa Majeſté Britannique. Ann. 1776. Tom. 66, Ire. partie, p. 268.

Cet article peut être intéreſſant pour les perſonnes qui ſe propoſeroient de viſiter ces contrées ſi fertiles en végétaux inconnus en Europe. Mais comme l'Auteur ne donne pas le catalogue des plantes qu'il y a recueillies, nous croyons devoir renvoyer les curieux à l'original des Tranſact. Philoſ. *loco citato.* Ces voyages ne ſont d'ailleurs pas auſſi curieux, à beaucoup près, que celui de Sparrman au Cap de Bonne Eſpérance, &c. dont M. Le Tourneur a publié la traduction. Paris. Buiſſon 1787. *In*-8°. 3 vol.

39. Sitodium *inciſum* & *macrocarpon*, uſuſque fructuum qui exinde naſcuntur, deſcripta à Carolo-Petro Thunberg. M. D. Ann. 1779. Tom. 69, p. 462.

C'eſt un Mémoire très-étendu, & en latin, ſur ces deux eſpeces de *rimu* ou *arbres-à-pain*, dont quel-

Notice des Mémoires de Botanique, &c.

ques Auteurs avoient déja fait mention. M. Thunberg les avoit décrites lui-même dans les Actes de Stockholm, pour 1776, p. 250, ſous les noms de Radermachia *inciſa*, & Radermachia *integra*. M. Murray les a inférées dans ſa 14e. Édition du *Regnum Vegetabile* de Linné, ſous les noms d'Artocarpus *inciſa*, & Artocarpus *integrifolia*.

40. Deſcription d'une nouvelle eſpece de plante dans la claſſe des champignons. Par Th. Woodward. Communiqué par le Chevalier Banks, Membre de la Société Royale. Avec une planche. Ann. 1784. Tom. 74, 2e. partie, p. 423.

41. Deſcription d'un nouveau quinquina trouvé dans l'iſle de Ste. Lucie. Par M. George Davidſon. Communiqué par le Docteur Donald Monro, Médecin des armées. Avec une planche. Ann. 1784. Tom. 74, 2e. partie, p. 452.

FIN du Tome premier.

TABLE

TABLE

ALPHABÉTIQUE

Des Noms génériques & triviaux, de Linné, qui ſe trouvoient, ou que nous avons inſérés dans le Catalogue des 2550 eſpeces de plantes, préſentées par la Compagnie des Apoticaires, à la Société Royale de Londres.

A

Acalipha *virginiana.* 24
Acanthus *mollis.* 26
— *ſpinoſus.* 25
Acer *monſpeſſulanum.* 29
— *Negundo.* 30
— *Platanoides.* 31
— *Pſeudoplatanus.* 32
Achillea *abrotaniſolia.* 39
— *ægyptiaca.* 1834
— *Ageratum.* 70. 1380
(*Ejuſd. varietas.*) 69
— *Clavennæ.* 1382
— *macrophylla.* 40
— *magna.* 41
— *Millefolium.* 1534
— *Millefolium. b.* 1532
— *nobilis.* 1529
— *odorata.* 1530
— *Ptarmica.* 1831
— *pubeſcens.* 1531. 1833
— *Santolina.* 42. 1835
— *tomentoſa.* 1533
Achyranthes *aſpera.* 43
— *aſpera. a. ſicula.* 134
Aconitum *Anthora.* 185
— *lycoctonum.* 48
— *Napellus.* 49
— *pyrenaicum.* 50
— *uncinatum.* 51
Acorus *Calamus. a. vulgaris.* 52
Actæa *racemoſa.* 569
— *ſpicata.* 570
Adiantum *Capillus Veneris.* 57
— *pedatum.* 56
Adonis *æſtivalis.* 63
— *autumnalis.* 61
— *vernalis.* 62
Adoxa *Moſchatellina.* 1558
Ægilops *ovata.* 64
Ægopodium *Podagraria.* 65
Æſchynomene *Sesban.* 66
Æſculus *Hippocaſtanum.* 67
— *Pavia.* 1703
Æthuſa *Cynapium.* 68

— *Meum.* 1522
Ageratum *Conyzoides.* 884
Agrimonia *Agrimonoides.* 76
— *eupatoria.* 74
(*Ejuſd. var.*) 73
— *repens.* 75
Agroſtemma *coronaria.* 1380
— *Flos Jovis.* 1406
Agroſtis *alba.* 80
— *canina.* 77
— *capillaris.* 78
— *miliacea.* 79
— *Spica venti.* 81
— *ſtoloniſera.* 82
Aira *cæſpitoſa.* 83
— *caryophyllea.* 84
— *præcox.* 85
Ajuga *orientalis.* 386
— *reptans.* 86
Alcea *ficifolia.* 91
Alchemilla *alpina.* 96
— *alpina. b. hybrida.* 95
— *vulgaris.* 98
Aliſma *Damaſonium.* 758
Allium *aſcalonicum.* 517
— *carinatum.* 105
— *urſinum.* 106
Alopecurus *agreſtis.* 108
— *bulboſus.* 109
— *geniculatus.* 110
— *monſpelienſis.* 111
— *paniceus.* 112
— *pratenſis.* 113
Althæa *officinalis.* 116
(*Ejuſd. var. b.*) 117
Alyſſum *calycinum.* 126
— *deltoideum.* 123
— *halimifolium.* 2223
— *incanum.* 125
— *ſaxatile.* 124
— *ſinuatum.* 121
Amaranthus *caudatus.* 132
— *græcizans.* 131
— *oleraceus.* 133
— *ſpinoſus.* 135. 356
Amaryllis *Atamaſco.* 136
— *lutea.* 137
Ambroſia *elatior.* 140
— *maritima.* 139
— *trifida. b.* 138
Amethyſtea *cærulea.* 142
Ammannia *latifolia.* 199
Ammi *majus.* 143
(*Ejuſd. var. a.*) 144
Amorpha *fruticoſa.* 315
Amygdalus *communis. b.* 146
Anagallis *Monelli.* 148
Anaſtatica *hierochuntica.* 151
Anchuſa *ſempervirens.* 381
— *undulata.* 154. 383
Andrachne *Telephioides.* 155. 2194
Andromeda *Daboecia.* 843
— *mariana.* 156
— *polifolia.* 157
Andropogon *Iſchæmum.* 158
Androſace *maxima.* 159
Andryala *integrifolia.* 1144
— *lanata.* 1140
— *raguſina.* 1137
Anemone *nemoroſa.* 162
— *penſylvanica.* 161
— *Pulſatilla.* 1846
— *thalictroides.* 163
— *virginiana.* 164
Angelica *lucida.* 169
Anthemis *maritima.* 182
— *mixta.* 183
— *Pyretrum.* 1849
— *valentina.* 390. 703
Anthericum *annuum.* 184
Antholyza *Cunonia.* 728
— *Meriana.* 2426

Anthoſpermum *æthiopicum.* 932
Anthoxantum *odoratum.* 186
Anthyllis *cytiſoides.* 316
— *tetraphylla.* 2400
— *Vulneraria.* 187. 2401
Antirrhinum *arvenſe. b.* 1335
— *bellidifolium.* 791
— *bipunctatum.* 191
— *chalepenſe.* 1327
— *Cymbalaria.* 1330
— *dalmaticum.* 1332
— *Elatine.* 819
— *geniſtifolium.* 192
— *Linaria.* 1338
— *monſpeſſulanum.* 1329
— *Orontium.* 193
— *purpureum.* 1336
— *ſpurium.* 820
— *triphyllum.* 1337
— *triſte.* 195. 1331
Aphanes *arvenſis.* 27
Apium *graveolens.* 202
Apocynum *androſæmifolium.* 209
Aquilegia *canadenſis.* 217
— *vulgaris.* 218
(*Ejuſd. var. c.*) 216
Arabis *alpina.* 804
(*Ejuſd. var. b.*) 1314
— *Thaliana.* 2302
— *turrita.* 1313
Aralia *racemoſa.* 220
Arbutus *Andrachne.* 222
— *Unedo.* 221
Arctium *Lappa.* 1276
Arctotis *acaulis.* 223
— *anguſtifolia.* 168
— *aſpera.* 166
(*Ejuſd. var. b.*) 165
— *calendulacea. b. hypochondriaca.* 167
Arduina *biſpinoſa.* 1407
Arenaria *ſaxatilis.* 2147
Argemone *mexicana.* 1686
Ariſtolochia *Clematitis.* 225
— *longa.* 226
— *rotunda.* 228
— *ſempervirens.* 227
Artedia *ſquamata.* 1030
Artemiſia *Abrotanum.* 4
— *Abſynthium.* 7
(*Ejuſd. var. a.*) 6
— *annua.* 12
— *campeſtris.* 1. 2
— *cæruleſcens.* 9
— *Dracunculus.* 3. 219
— *pontica.* 11
— *vulgaris.* 230
Arum *Colocaſia.* 232
— *maculatum.* 233
— *trilobatum.* 234
Arundo *Bambos.* 235
Aſarum *canadenſe.* 238
— *europæum.* 237
Aſclepias *curaſſavica.* 241
— *fruticoſa.* 218
— *incarnata.* 214
— *ſyriaca.* 213
— *variegata.* 242
— *verticillata.* 243
— *Vincetoxicum.* 239
(*Ejuſd. var. a.*) 240
Aſcyrum *Hypericoides.* 245
Aſparagus *horridus.* 248
— *officinalis. b.* 249
Aſperugo *procumbens.* 250
Aſperula *arvenſis.* 955
— *cynanchica.* 251
— *odorata.* 252
— *taurina.* 721
Aſplenium *Adiantum nigrum.* 58. 912
— *Ceterach.* 256

— *Ruta muraria.* 255. 1930
— *Scolopendrium.* 1343
(*Ejuſd. var. e.*) 1342
— *Trichomanoides.* 2274
Aſter *acris.* 273
— *Amellus,* 262
— *annuus.* 265. 271
— *chinenſis.* 261
— *cordifolius.* 275
— *dumoſus.* 269
— *fruticuloſus.* 266
— *grandiflorus.* 276
— *macrophyllus.* 258
— *tenellus.* 272
— *tenuifolius.* 257
— *Tradeſcanti.* 274
Aſtragalus *bæticus,* 283
— *chriſtianus.* 290
— *Cicer.* 288
— *contortuplicatus.* 284
— *Epiglottis.* 293
— *galegiformis.* 289
— *glycyphyllos,* 287. 1042
— *hamoſus.* 286
— *Hypoglottis,* 294
— *incanus,* 840
— *piloſus,* 292
— *Stella.* 282
— *Tragacantha,* 2264
Aſtrantia *major.* 295. 296
Athamanta *cretenſis.* 762
— *Libanotis.* 205
Athanaſia *crithmifolia.* 646
Atractylis *cancellata.* 633
— *oppoſitifolia.* 461
Atragene *alpina.* 607
Atriplex *roſea.* 298
Atropa *Mandragora,* 1444
— *phyſaloides,* 300
Avena *fatua,* 301
— *fragilis.* 302
— *nuda,* 303
— *ſativa.* 304
Azalea *viſcoſa.* 305

B

Baccharis *halimifolia.* 2050
— *ivæfolia.* 307
Ballota *alba.* 308
— *lanata.* 310
— *nigra.* 309
Barleria *coccinea.* 318
Bartſia *alpina.* 617
Bauhinia *divaricata.* 320
Berberis *vulgaris.* 323
Betonica *hirſuta.* 324
— *officinalis.* 330
— *orientalis.* 329
Betula *nana.* 331
Bidens *bipinnata.* 340
— *bullata.* 341
— *frondoſa.* 338
— *nivea.* 348
— *piloſa.* 347
— *tripartita.* 346
Bignonia *Catalpa.* 351
— *radicans.* 349
(*Ejuſd. var. a.*) 350
Biſcutella *apula.* 2227
— *ſempervirens.* 2228
Biſerrula *Pelecinus.* 1704
Blitum *capitatum.* 354
Boerhaavia *diffuſa.* 359
Borago *indica.* 361
— *orientalis.* 360
Braſſica *Eruca.* 854
— *Napus. b.* 1579
— *orientalis.* 363
Briza *Eragroſtis;* 364
Bromus *ciliatus.* 366
— *dyſtachios.* 367
— *giganteus,* 368
— *mollis.* 369

— *rubens.* 370
— *ſecalinus.* 371
Bryonia *africana.* 377
— *alba.* 378
Bubon *macedonicum.* 203
— *rigidius.* 899
Bunias *Cakile. b.* 400
— *orientalis.* 389
Bunium *Bulbocaſtanum.* 387
Buphthalmum *aquaticum.* 277
— *arboreſcens.* 279. 572
— *grandiflorum.* 281. 580
— *maritimum.* 280
Buplevrum *fruticoſum.* 392
— *junceum.* 393
— *odontites.* 395
— *rotundifolium.* 1712
— *tenuiſſimum.* 394
Buxus *ſempervirens.* 397

C

Cacalia *atriplicifolia.* 1585
— *ſuaveolens.* 398
Cactus *flagelliformis.* 399
Calceolaria *pinnata.* 406
Calendula *fruticoſa.* 410
— *graminifolia.* 409
— *pluvialis.* 414
Calla *æthiopica.* 231
Caltha *paluſtris.* 415
Calycanthus *floridus.* 319
Campanula *Erinus.* 424
— *glomerata.* 430
— *latifolia.* 427
— *Medium.* 425
— *perfoliata.* 428
— *perſicifolia.* 429
— *rapunculoides.* 426
Camphoroſma *monſpelienſis.* 431
Canarina *Campanula.* 425
Canna *glauca.* 433
— *indica.* 437
Cannabis *ſativa.* 436
Capparis *ſpinoſa.* 438
Capſicum *annuum.* 440
— *frutiſcens.* 441
Cardamine *hirſuta.* 445
— *impatiens.* 446
— *pratenſis.* 442
— *trifolia.* 443
Cardioſpermum *Halicacabum. b.* 680
(*Ejuſd. var. c.*) 681
Carduus *acaulis.* 450
— *eriophorus.* 454
— *helenoides.* 588
— *heterophyllus.* 592
— *monſpeſſulanus.* 590
— *ſyriacus. a.* 452
Carica *Papaya.* 459
Carlina *corymboſa.* 460
Carpinus *Oſtrya.* 1653
Carthamus *arboreſcens.* 634
— *Carduncellus.* 630
— *cernuus.* 631
— *corymboſus.* 462. 811
— *creticus.* 632. 635
— *lanatus.* 629
— *tinctorius.* 463
— *tingitanus.* 637
Caſſia *marilandica.* 476
— *occidentalis.* 475
— *Senna. b.* 2051
Caſſyta *filiformis.* 483
Catananche *cærulea.* 485
— *lutea.* 484
Caucalis *daucoides.* 497
Ceanothus *americanus.* 500. 873
Celaſtrus *pyracanthus.* 502
— *ſcandens.* 870
Celtis *occidentalis.* 503

Cenchrus *echinatus.* 1045
— *racemosus.* 504
Centaurea *alpina.* 514
— *benedicta.* 505
— *Centaurium.* 515
— *Cineraria. b.* 1196
— *collina.* 506
— *Crupina.* 2058
— *Cyanus.* 507
(*Ejusd. var. c.*) 733
— *Eriophora.* 1206
— *galactites.* 456
(*Ejusd. var. a.*) 457
— *Isnardi.* 407
— *melitensis.* 508
— *montana.* 734
— *moschata.* 735
— *moschata. b. Amberboi.* 509
— *paniculata.* 1198
— *pectinata.* 1197
— *peregrina.* 510
— *ragusina.* 511. 1200
— *romana.* 455. 1207
— *salmantica.* 1199
— *sempervirens.* 1201
— *solstitialis.* 512
Cephalanthus *occidentalis.* 519
Ceratium *dichotomum.* 1563
— *pentandrum.* 520
— *perfoliatum.* 1565
— *repens.* 1564
— *semidecandrum.* 1562
— *tomentosum.* 521
Ceratocarpus *arenarius.* 525
Ceratonia *Siliqua.* 2094
Cerbera *Ahoval.* 2217
Cercis *Siliquastrum.* 2097
Cerinthe *major.* 530
— *minor.* 529
(*Ejusd. var. d.*) 528
Chærophyllum *aromaticum.* 1566
— *bulbosum.* 1570
— *coloratum.* 1567
— *hirsutum.* 531
Cheiranthus *Cheiri.* 546
— *chius.* 1118
— *Erysimoides.* 1121
— *tricuspidatus.* 1124
— *tristis.* 1123
Chelidonium *corniculatum.* 1035
— *Glaucium.* 1033
— *majus. b.* 547
Chelone *glabra.* 549
(*Ejusd. var. b.*) 550
— *obliqua.* 550
Chenopodium *album.* 560
— *ambrosioides.* 554
— *aristatum.* 556
— *Bonus Henricus.* 357
— *Botrys.* 553
— *glaucum.* 557
— *hybridum.* 562
— *maritimum.* 355
— *rubrum.* 559
— *Scoparia.* 561
— *Vulvaria.* 563
Chionanthus *virginicus.* 564
Chironia *frutescens.* 565
Chondrilla *juncea.* 568
Chrysanthemum *coronarium.* 574
(*Ejusd. var. c.*) 576. 579
— *corymbosum.* 573
— *floseculosum.* 312
— *frutescens.* 1850
— *indicum.* 577
— *inodorum.* 1312
— *Leucanthemum.* 578
— *millefoliatum.* 1311
— *serotinum.* 322

Chryſocoma *cernua*. 647
— *Comaurea*. 582
— *Linoſyris*. 648. 668
Chryſoſplenium *oppoſitifolium*. 1973
Cicer *arietinum*. 583
Cineraria *Anthelloides*. 264
— *geiſolia*. 798
— *maritima*. 1215
Circæa *alpina*. 585
— *lutetiana*. 584
Ciſtus *ægyptiacus*. 594
— *albidus*. 601
— *apenninus*. 1092
— *creticus*. 597
— *halimifolius*. 1090
— *Helianthemum*. 1093
— *ladaniferus*. 598
(*Ejuſd. var. b.*) 599
— *monſpelienſis*. 600
— *piloſus. c.* 1089
— *populifolius*. 602
— *ſalicifolius*. 603. 1091
— *ſalviſolius*. 596
Claytonia *virginica*. 606
Clematis *cirrhoſa*. 609
— *erecta*. 611
— *integrifolia*. 612
— *Viorna*. 610
— *Viticella*. 613
Cleome *pentaphylla*. 614
— *ſpinoſa*. 2099
— *violacea*. 2100
Cleonia *luſitanica*. 1818
Clethra *alnifolia*. 615
Cliffortia *ilicifolia*. 616
Clinopodium *incanum*. 610
Clutia *Alaternoides*. 88
— *pulchella*. 626
Clypeola *maritima*. 628
Cneorum *tricoccon*. 540
Cnicus *Acarna*. 28
— *centauroides*. 513
— *cernuus*. 631
Cochlearia *Coronopus*. 1587
— *Draba*. 1308
— *glaſtifolia*. 638
Coffea *arabica*. 1221
Coix *Lachryma*. 1256
Collinſonia *canadenſis*. 640
Colutea *arboreſcens*. 645
(*Ejuſd. var. b.*) 642
— *fruteſcens*. 641
Comarum *paluſtre*. 1711
Commelina *africana*. 649
— *communis*. 650
— *tuberoſa*. 651
Conium *maculatum*. 652
Convallaria *bifolia*. 2111
— *majalis*. 1320
— *Polygonatum*. 1797
(*Ejuſd. var. b.*) 1799
— *racemoſa*. 653. 1798
— *verticillata*. 654
Convolvulus *althæoides*. 662
(*Ejuſd. var. b.*) 656
— *canarienſis*. 659
— *Cantabrica*. 661
— *Cneorum*. 660
— *hederaceus. b.* 658
(*Ejuſd. var. c.*) 657
— *ſiculus*. 664
Conyza *africana*. 665
— *candida*. 673
— *hirſuta*. 667
— *ſaxatilis*. 834
Corchorus *capſularis*. 674
— *olitorius*. 675
— *ſiliquoſus*. 673
Coreopſis *chryſantha*. 336
— *lanceolata*. 343. 677
— *leucantha*. 678
— *tripteris*. 339
Coriandrum *ſativum*. 679

Coris *monſpelienſis.* 682
Coriſpermum *hyſſopifolium.* 683
Cornus *ſericea.* 684
Coronilla *cretica.* 695. 697
— *Emerus. b.* 841
— *glauca.* 698
— *juncea.* 696
— *Securidaca.* 2044
— *valentina.* 699
— *varia.* 700
Cotula *coronopifolia.* 149. 321
Cotyledon *laciniata.* 704
Crambe *hiſpanica.* 1876
— *maritima.* 708
Craſſula *coccinea.* 705
Cratægus *Aria.* 712
— *coccinea.* 1514
— *Crus galli.* 1515
— *torminalis.* 711
Crepis *alpina.* 1128
— *barbata.* 1129
(*Ejuſd. var. b.*) 1138
— *fœtida.* 1130
— *rubra.* 713
— *ſibirica.* 1131
— *tectorum.* 1132
Crithmum *maritimum.* 714
— *pyrenaicum.* 204
Crocus *ſativus.* 715
— *ſativus. a. officinalis.* 716
— *ſativus. b. vernus.* 717
Crotalaria *chinenſis.* 719
— *incana.* 173
— *laburnifolia.* 720
Croton *caſtaneifolium.* 1899
— *tinctorium.* 1901
Cucubalus *bacciferus.* 726
— *Behen.* 723. 724
— *reflexus.* 1396
— *ſtellatus.* 2089
— *tataricus.* 725
Cucumis *Anguria.* 170
Cucurbita *Citrullus.* 609
Cupreſſus *diſticha.* 731
— *ſempervirens.* 729
— *thyoides.* 730
Cyclamen *europæum.* 736
— *indicum.* 737
Cynanchum *monſpeliacum.* 738
Cynogloſſum *cheirifolium.* 739
— *linifolium.* 740. 1623
— *Omphalodes.* 1624
Cynoſurus *ægyptiacus.* 742
— *aureus.* 743
— *criſtatus.* 744
— *echinatus.* 745
Cyperus *eſculentus.* 747
— *longus.* 746
Cytiſus *auſtriacus.* 750
— *Laburnum.* 749
— *nigricans.* 752
— *ſeſſilifolius.* 753
— *ſupinus.* 756

D

Daphne *Laureola.* 759
— *Mezereum.* 760
Datura *faſtuoſa.* 2173
— *ferox.* 2175
— *Metel.* 761. 2174
— *Tatula.* 2176
Daucus *Carota.* 764
— *Gingidium.* 763
— *muricatus.* 499
Delphinium *Conſolida.* 769
— *elatum.* 47. 765
— *grandiflorum.* 766
— *Staphiſagria.* 768
Dentaria *bulbifera.* 772

Dianthus *Armeria*. 470. 773
— *carthuſianorum*. 774
— *ferrugineus*. 472
— *glaucus*. 775
— *monſpeliacus*. 776
— *prolifer*. 474
— *ſuperbus*. 777
Dictamnus *albus*. 927
Digitalis *ambigua*. 783
— *canarienſis*. 780
— *ferruginea*. 781
— *lutea*. 784
— *Thapſi*. 782
Dioſma *ericoides*. 786
— *hirſuta*. 2151
— *oppoſitifolia*. 787
Dioſpyros *Lotus*. 810
— *virginiana*. 1060
Dipſacus *laciniatus*. 788
— *piloſus*. 789
Dirca *paluſtris*. 790
Diſandra *proſtrata*. 2074
Dodecatheon *Meadia*. 1460
Doronicum *Pardalianches*. *b*. 802
— *plantagineum*. 801
Draba *aizoides*. 122
— *alpina*. 805
— *muralis*. 127. 806. 1368
Dracocephalum *canarienſe*. 808. 1487. 1546
— *caneſcens*. 1549
— *Moldavica*. 1488
— *nutans*. 809. 1547
— *peltatum*. 1550
— *Ruiſchiana*. 1931
— *thymiflorum*. 1548
— *virginianum*. 807

E

Echinops *Ritro*. 812
(*Ejuſd. var. b.*) 813
— *ſtrigoſus*. 814
Echium *creticum*. 815
— *luſitanicum*. 816
Eclipta *erecta*. 878
— *proſtrata*. 876
Elæagnus *anguſtifolius*. 817
Elliſia *Nyctelea*. 835
Elymus *caninus*. 836
— *Hyſtrix*. 837
— *ſibiricus*. 838
— *virginicus*. 839
Ephedra *diſtachia*. 842
Epilobium *anguſtifolium*. 1415
Erica *abietina*. 846
— *cinerea*. 847
— *multiflora*. 849
Erigeron *acre*. 850
— *bonarienſe*. 851
— *canadenſe*. 2382
— *fœtidum*. 666
— *graveolens*. 852
— *viſcoſum*. 670. 2375
Ervum *Ervilia*. 1645
— *hirſutum*. 706
— *tetraſpermum*. 219
Eryngium *amethyſtinum*. 860
— *aquaticum*. 864
— *campeſtre*. 863
— *fœtidum*. 857
— *maritimum*. 859
— *puſillum*. 862
Eryſimum *Barbarea*. 317
— *cheiranthoides*. 865. 1559. 2299
— *officinale*. 866
Evonymus *americanus*. 871
— *europæus*. *a*. *tenuifolius*. 874
— *europæus*. *b*. *latifolius*. 872

Eupatorium *Ageratoides.* 880
— *altiſſimum.* *ibid.*
— *cannabinum.* 882
— *perfoliatum.* 886
— *purpureum.* 883
— *rotundifolium.* 885
Euphorbia *aleppica.* 2244
— *Apios.* 2255
— *characias.* 2241
— *coralloides.* 887
— *Cyparisſias.* 2243
— *dendroides.* 2240
— *helioſcopia.* 2247
— *hiberna.* 2249. 2256
— *hypericifolia.* 2245
— *myrſinites.* 2253
— *orientalis.* 2254
— *Paralias.* 2251
— *Peplus.* 2246
— *piloſa.* 2242
— *Pithyuſa.* 2248
— *portlandica.* 2252
— *ſegetalis.* 2250
Euphraſia *Odontites.* 890

F

Fagopyrum *tataricum.* 894
Ferula *communis.* 902
— *Ferulago.* 900
— *glauca.* 901
Feſtuca *bromoides.* 903
— *duriuſcula.* 904
— *elatior.* 905. 909
— *fluitans.* 906. 1047
— *myurus.* 907
— *ovina.* 908
Forskohlea *tenaciſſima.* 924
Fragaria *ſterilis.* 925
— *veſca.* 926
Fraxinus *Ornus.* 928
Fritillaria *Meleagris.* 931
(*Ejuſd. var. c.*) 929
Fumaria *bulboſa, b. cava.* 935
— *Capnoides.* 936
— *capreolata.* 937
— *lutea.* 938
— *officinalis.* 940
— *ſempervirens.* 941
— *ſpicata.* 939
— *veſicaria.* 934

G

Galega *officinalis.* 944
(*Ejuſd. var. c.*) 942
Galenia *africana.* 945
Galeopſis *Galeobdolon.* 950
— *Ladanum.* 949
Galium *boreale.* 951
— *glaucum.* 954
— *minutum.* 956
— *pariſienſe.* 197
— *ſpurium.* 198
— *verum.* 953
Gardenia *florida.* 957. 1223
Garidella *Nigellaſtrum.* 958
Geniſta *anglica.* 959
— *canarienſis.* 751
— *candicans.* 960
— *ſagittalis.* 963
— *tinctoria.* 964
Gentiana *acaulis.* 967
— *amarella.* 968
— *Centaurium.* 516
— *lutea.* 969
— *Pneumonanthe.* 970
Geranium *acetoſum.* 985
— *alceoides.* 1011
— *alchimilloides.* 974
— *capitatum.* 986. 987
— *chium.* 998

— *ciconium.* 999
— *cicutarium.* 1001
(*Ejuſd. var. b.*) 993
— *columbinum.* 1003
— *coriandrifolium.* 981
— *cucullatum.* 978
— *diſſectum.* 1007
— *gibboſum.* 989
— *glaucophyllum.* 972
— *gruinum.* 1014
— *hybridum.* 976
— *inquinans.* 977
— *lucidum.* 1015
— *macrorhizum.* 997
— *maculatum.* 994
— *maritimum.* 1021
— *moſchatum.* 1002
— *nodoſum.* 1017
— *odoratiſſimum.* 983
— *papilionaceum.* 979
— *peltatum.* 982
— *phæum.* 1020
— *pratenſe.* 995
— *puſillum.* 1005
— *pyrenaicum.* 1008
— *robertianum.* 1022
(*Ejuſd.* var.) 1023
— *romanum.* 1018
— *rotundifolium.* 1006
— *ſanguineum.* 1013
(*Ejuſd. var. a.*) 1025
— *ſibiricum.* 1026
— *ſtriatum.* 1024
— *ſylvaticum.* 996
— *triſte.* 973
— *zonale.* 975
Geropogon *glabrum.* 1027
— *hirſutum.* 2266
Geum *montanum.* 464
(*Ejuſd. var. a.*) 466. 467
— *rivale.* 465
— *virginianum.* 468
— *urbanum.* 469
Gladiolus *ramoſus.* 1032
— *triſtis.* 1031
Glecoma *hederacea.* 1037
Globularia *vulgaris.* 1038
Glorioſa *ſuperba.* 1039
Glycyrrhiza *echinata.* 1040
— *glabra.* 1041
Gnaphalium *cymoſum.* 824
— *dioicum : fœm.* 829
— *fœtidum.* 822*
— *luteo-album.* 833
— *margaritaceum.* 828
— *orientale.* 830
— *rutilans.* 823
— *Stœchas.* 831. 2170
— *undulatum.* 827. 1043
Gomphrena *globoſa.* 129
(*Ejuſd. var.*) 130
Gorteria *rigens.* 224
Goſſypium *hirſutum.* 2412
Gratiola *officinalis.* 785
Gronovia *ſcandens.* 2392
Gualtheria *procumbens.* 1061
Gundelia *Tourneſortii.* 1063
Gypſophila *altiſſima.* 1064
— *faſtigiata.* 1065
— *muralis.* 471
— *proſtrata.* 1067
— *rigida.* 1068
— *Struthium.* 1384

H

Haleſia *tetraptera.* 1069
Hamellia *patens.* 1070
Hedera *quinquefolia.* 1072
Hedyſarum *canadenſe.* 1080
— *Caput galli.* 1077
— *coronarium.* 1078
— *Onobrychis.* 1628
Helenium *autumnale.* 1083. 1086

(*Ejuſd. var. a.*) 1084
Helianthus *ſtrumoſus.* 687
(*Ejuſd. var. a.*) 691
Helicteres *baruenſis.* 1094
Heliotropium *curaſſavicum.* 1099
— *europæum.* 1098
— *indicum.* 1097
— *peruvianum.* 1096
Helleborus *fœtidus.* 1104
(*Ejuſd. var. b.*) 1101
— *hyemalis.* 46
— *niger.* 1103
— *viridis.* 1106
Hemerocallis *Liliaſtrum.* 253
Hermannia *alniſolia.* 1109
— *althæifolia.* 1112
— *hyſſopifolia.* 1111
— *lavendulifolia.* 1113
— *trifoliata.* 1110
Hernandia *ſonora.* 1115
Herniaria *glabra.* 1116
— *hirſuta.* 1117
Heſperis *inodora.* 1125
— *verna.* 2298
Heuchera *americana.* 1126
Hibiſcus *Malvaviſcus.* 1434
— *ſyriacus.* 1252
(*Ejuſd. var. d.*) 1251
— *Trionum.* 1127. 1254
(*Ejuſd. var. b.*) 1253
— *amplexicaule.* 1143
— *aurantiacum.* 1136
Hieracium *Auricula.* 1758
— *pyrenaicum. b. blattarioides.* 1142
— *ſabaudum.* 1135
— *umbellatum. e.* 1134
Hippocrepis *comoſa.* 897
— *multiſiliquoſa.* 898
— *uniſiliquoſa.* 1145
Holcus *bicolor.* 1146. 1523
— *halepenſis.* 1046
— *ſpicatus.* 1147
Holoſteum *cordatum.* 1148
— *umbellatum.* 1149
Hordeum *diſtichon.* 1150
— *murinum.* 1151
— *vulgare.* 1152
— *vulgare. b. cæleſte.* 1153
— *Zeocriton.* 1154
Hydrangea *arboreſcens.* 1164
Hydraſtis *canadenſis.* 2405
Hydrophyllum *virginicum.* 1165
Hyoſciamus *albus.* 1166
— *aureus. b.* 1167
— *muticus.* 1168
— *reticulatus.* 1169
Hyoſeris *Hedypnois.* 1073
(*Ejuſd. var. b.*) 1074
— *radiata.* 1170
Hypecoum *pendulum.* 1172
— *procumbens.* 1171
Hypericum *Androſæmum.* 160. 1173
— *Aſcyron.* 246
— *balearicum.* 244. 1174. 1572
— *canarienſe.* 1177
— *chinenſe.* 1182
— *elodes.* 1175
— *hircinum.* 1176
— *hirſutum.* 1180
— *humifuſum.* 1181
— *montanum.* 1183
— *olympicum.* 1184
— *pulchrum.* 1188
— *tomentoſum.* 1189
Hypoxis *erecta.* 1191
Hyſſopus *officinalis.* 1192
(*Ejuſd. var. b.*) 1193
— *Lophanthus.* 1589

J

Jaſminum *azoricum.* 1222
— *grandiflorum.* 1224
— *odoratiſſimum.* 1225
— *officinale.* 1226
Jatropha *goſſypifolia.* 1903
— *multifida.* 1900
Iberis *amara.* 2219
— *linifolia.* 2222
— *ſempervirens.* 2224
Illecebrum *lanatum.* 44
— *Paronychia.* 1692
— *polygonoides.* 128
Impatiens *Balſamina.* 311. 1229
Imperatoria *Oſtruthium.* 1230
Inula *bifrons.* 669
— *crithmifolia.* 267
— *Helenium.* 1085
— *pulicaria.* 671
— *ſalicina.* 268
— *ſquarroſa.* 1231
Ipomœa *coccinea.* 1851
— *triloba.* 1232
Iris *Pſeudacorus.* 1234
— *tuberoſa.* 1235
Iſatis *ægyptia.* 1236
— *tinctoria. b.* 1237
Iſopyrum *fumarioides.* 1102
Itea *virginica.* 1238
Juniperus *communis.* 1239
— *lycia.* 501
Juſticia *Adhatoda.* 55
— *hyſſopifolia.* 54. 1240
Ixia *bulbifera.* 1242
— *Bulbocodium.* 388
— *corymboſa.* 1241
— *crocata.* 1245
— *polyſtachia.* 1244

K

Kæmpferia *Galanga.* 1246
Kalmia *anguſtifolia.* 1248
Kiggelaria *africana.* 869
Knautia *orientalis.* 1255

L

Lactuca *perennis.* 1258
— *ſaligna.* 1260
— *Scariola.* 1259
Lagoecia *Cuminoides.* 727
Lamium *album.* 1261
(*Ejuſd. var. a.*) 1266
— *amplexicaule.* 1262
— *garganicum.* 1263
— *purpureum.* 1265
(*Ejuſd. var. d.*) 1267
Lantana *aculeata.* 419
— *africana.* 1220
— *involucrata.* 417. 1268
— *ſalvifolia.* 1269
Lapſana *Rhagadiolus.* 1889
— *ſtellata.* 1888
— *Zacyntha.* 2413
Laſerpitium *anguſtifolium.* 1279
— *gallicum.* 1283
— *latifolium. c.* 1280. 1281
(*Ejuſd. var. d.*) 1282
— *Siler.* 1317
— *trilobum.* 2093
Lathyrus *Aphaca.* 200. 1286
— *articulatus.* 617
— *latifolius.* 1287
— *Niſſolia.* 1603
— *odoratus.* 1288
— *ſylveſtris.* 1289
— *tingitanus.* 1291
— *tuberoſus.* 1292

Lavandula *dentata.* 2171
— *multifida.* 1295
(*Ejuſd var. c.*) 1294
— *ſpica. a.* 1293
(*Ejuſd. var. b.*) 1296
— *Stœchas.* 2172
Lavatera *cretica.* 1433
— *olbia.* 119
Laurus *nobilis.* 1299
Leontodon *Taraxacum. c.* 771
Leonurus *africanus.* 1302
— *Cardiaca.* 448
— *Marrubiaſtrum.* 1305
— *ſibiricus.* 1304
— *tataricus.* 449
Lepidium *bonarienſe.* 1307
— *Iberis.* 1309
— *latifolium.* 1310
— *perfoliatum.* 1586
Liguſticum *Leviſticum.* 1315
— *ſcoticum.* 1318
Linum *perenne.* 1345
Liriodendron *Tulipifera.* 1346
Lithoſpermum *orientale.* 385
Lobelia *Cardinalis.* 1879
— *cliffortiana.* 1880
— *Erinoides.* 1347
— *Erinus.* 1348
— *inflata.* 1349
— *ſiphilitica.* 1878
— *triquetra.* 1350
Lœflingia *hiſpanica.* 1351
Lolium *perenne.* 1352
— *temulentum.* 1055. 1353
Lonicera *Periclymenum.* 439
— *ſempervirens.* 1714
— *Symphoricarpos.* 2179
— *Xyloſteum.* 532
Lotus *anguſtiſſimus.* 1364
— *conjugatus.* 1355
— *corniculatus. c. tenuifolius.* 1362
— *Dorycnium.* 803
— *edulis.* 1356
— *hirſutus.* 1358. 1359
— *jacobæus.* 1354
— *maritimus.* 1361
— *ornithopodioides.* 1363
— *rectus.* 1360
— *tetragonolobus.* 1366
Lunaria *annua.* 1367
Lupinus *albus.* 1374
— *anguſtifolius.* 1370
— *hirſutus.* 1373
— *luteus.* 1372
— *perennis.* 1371
Lychnis *chalcedonica.* 1379
— *Viſcaria.* 1402
Lycium *barbarum.* 1219
Lycopodium *alpinum.* 1409
Lycopſis *variegata.* 380. 382
Lycopus *virginicus.* 1410
Lyſimachia *Ephemerum.* 1416
— *Nummularia.* 1604
— *quadrifolia. b. ciliata.* 1413
— *thyrſiflora.* 1412
— *vulgaris.* 1414
Lythrum *Hyſſopifolia.* 1417. 1933

M

Magnolia *glauca.* 1418
Malope *Malacoides.* 1421
Malpighia *glabra.* 1422
Malva *abutiloides.* 14
— *Alcea.* 94
— *bryonifolia.* 118
— *capenſis.* 89
(*Ejuſd. var. c.*) 1419

— *caroliniana.* 20
— *crispa.* 92
— *gangetica.* 1435
— *limensis.* 1426
— *rotundifolia.* 1432
— *scabrosa.* 1429
— *verticillata.* 1430
Marrubium *acetabulosum.* 1452. 1821
— *Alyssum.* 1453
— *candidissimum.* 1448
— *peregrinum.* 1450
(*Ejusd. var. b.*) 1447
— *Pseudodictamnus.* 1822
— *vulgare.* 1451
Martynia *annua.* 1454
— *perennis.* 1455
Matricaria *Asteroides.* 1458
— *Parthenium.* 1459
Medicago *arborea.* 754
— *circinnata.* 1478
— *lupulina.* 1476
— *marina.* 1468
— *muricata.* 1462
— *polymorpha. a. orbicularis.* 1471
— — *b. scutellata.* 1473
— — *c. tornata.* 1474
— — *d. turbinata.* 1465
— — *e. intertexta.* 1466
— — *k. rigidula.* 1463
— — *l. minima.* 1461
— *radiata.* 1475
— *sativa.* 1467
Melia *Azedarach.* 1479
Melica *ciliata.* 1480
— *nutans.* 1481
Melissa *Calamintha.* 405
— *fruticosa.* 401
— *grandiflora.* 402
— *Nepeta.* 404
(*Ejusd. var. b.*) 403
— *officinalis. a.* 1489
Melochia *depressa.* 18
Menispermum *canadense.* 1491
— *virginicum.* 1493
Mentha *aquatica.* 1840
— *canariensis.* 1095
— *cervina.* 1838
(*Ejusd. var. a.*) 1839
— *gentilis.* 1497
— *hirsuta. b.* 1501
— *perilloides.* 1612
— *piperita.* 1498
— *rotundifolia.* 1502
— *sativa.* 1499
— *sylvestris.* 1506
— *viridis.* 1495
Menyanthes *trifoliata.* 1490
Mercurialis *annua.* 1507
— *perennis.* 1508
— *tomentosa.* 1509
Mesembryanthemum *falcatum.* 910
— *glaucum.* 1510
Mespilus *Amelanchier.* 141
— *canadensis.* 1519
— *Cotoneaster.* 1518
— *Pyracantha.* 1520
Milium *paradoxum.* 1524
Milleria *biflora.* 1537
— *quinqueflora.* 1536
(*Ejusd. var. b.*) 1535
Mimosa *casta.* 1539
— *pudica.* 1540
Mimulus *ringens.* 1542
Mirabilis *Jalapa.* 60. 1544
— *longiflora.* 1543
Mitella *nuda.* 1545
Mollugo *verticillata.* 1552
Moluccella *lævis.* 1551
Momordica *Balsamina.* 1553
— *Elaterium.* 818

Monarda *fiſtuloſa.* 1303. 1555
— *punctata.* 625. 1556
Morus *papyrifera.* 1557
Myagrum *rugoſum.* 1561
— *ſativum.* 1560
Myoſotis *apula.* 152
— *virginiana.* 741
Myrſine *africana.* 1571
Myrtus *communis.* 1573
— — *a. romana.* 1577
— — *b. bætica.* 1576
— *Pimenta.* 1575

N

Napæa *lævis.* 93. 1578
Narciſſus *Bulbocodium.* 1584
— *minor.* 1581
— *Pſeudonarciſſus.* 1582 1583
Nepeta *Cataria.* 491. 1588
(*Ejuſd. var. b.*) 486
(— — *c.*) 487
(— — *e.*) 495
— *hirſuta.* 494
— *italica.* 492
— *nuda.* 488
— *pannonica.* 496
— *tuberoſa.* 490
— *violacea.* 489
Nerium *Oleander.* 1590
(*Ejuſd. var. b.*) 1591
Nicotiana *fruticoſa.* 1594
— *glutinoſa.* 1592
— *paniculata.* 1595
— *Tabacum.* 1593
Nigella *arvenſis.* 1597
— *damaſcena.* 1596
— *hiſpanica.* 1599
— *orientalis.* 1600
— *ſativa.* 1601
Nolana *proſtrata.* 2405
Nyctanthes *Sambac.* 1227

O

Ocymum *baſilicum. b.* 1610
— *ſcutellarioides.* 1611
Œnanthe *pimpinelloides.* 1613
— *prolifera.* 1614
Œnothera *biennis.* 1627
— *fruticoſa.* 1616
— *molliſſima.* 1625
— *pumila.* 1617
Oldenlandia *biflora.* 1618
— *corymboſa.* 1619
Olea *europæa.* 1620
Ononis *alopecuroides.* 179
— *criſpa.* 1629
— *fruticoſa.* 180
— *minutiſſima.* 176
— *mitiſſima.* 172
— *Natrix.* 181
(*Ejuſd. var. c.*) 177
— *ornithopodioides.* 1630
— *rotundifolia.* 1631
Ophioglooſſum *vulgatum.* 1632
Ophrys *ovata.* 1633
Orchis *militaris.* 1634
Origanum *ægyptiacum.* 1420
— *Dictamnus.* 778
— *heracleoticum.* 1635
— *Majorana.* 1636
— *ſipyleum.* 779
— *ſmyrnæum.* 1419
— *vulgare.* 1637
Ornithopus *compreſſus.* 1641
— *perpuſillus. c.* 1640
— *Scorpioides.* 1639
Orobus *lathyroides.* 1642
— *niger.* 1643
— *vernus.*

— *vernus.* 1644
Ortegia *hiſpanica.* 1646
Oryza *ſativa.* 1647
Oſmunda *criſpa.* 1648
— *regalis.* 1649
Oſteoſpermum *moniliferum.* 571
— *ſpinoſum.* 1652
Othonna *coronopifolia.* 1654
— *pectinata.* 1655
Oxalis *Acetoſella.* 1660
— *caprina.* 1656
— *corniculata.* 1661
(*Ejuſd. var. b.*) 1662
— *incarnata.* 1658
— *purpurea.* 1659
— *ſtricta.* 1657

P

Pæderota *Bonarota.* 2341
Pæonia *anomala.* 1665
— *officinalis. a. fœminea.* 1667
— — *b. maſcula.* 1666
Pancratium *illyricum.* 1580
Panicum *capillare.* 1669
— *colonum.* 1670
— *Crus galli.* 1053
— *filiforme.* 1671
— *glaucum.* 1673
— *italicum.* 1672. 1675
— *miliaceum.* 1525. 1676
— *patens.* 1677
— *polyſtachion.* 1678
— *ſanguinale.* 1049
— *verticillatum.* 1052. 1679
— *viride.* 1054. 1680
Papaver *cambricum.* 1683
— *hybridum.* 1682
— *nudicaule.* 1684
— *orientale.* 1685
— *ſomniferum. b.* 1681
Parietaria *judaica.* 1690
— *luſitanica.* 1687
— *officinalis.* 1688
Paris *quadrifolia.* 1108
Parnaſſia *paluſtris.* 1691
Parthenium *Hyſterophorus.* 1693
— *integrifolium.* 1694
Paſpalum *virgatum.* 2048
Paſſerina *filiformis.* 1695
— *hirſuta.* 1696
Paſſiflora *cærulea.* 1697
— *fœtida.* 1056
— *incarnata.* 1058
— *laurifolia.* 1698
— *lutea.* 1057
— *rubra.* 1699
— *ſerratifolia.* 1059. 1700
— *Veſpertilio.* 1701
Paſtinaca *ſativa.* 1702
Pectis *linifolia.* 333. 384
Peganum *Harmala.* 1071
Peltaria *alliacea.* 1705
Periploca *africana.* 210. 215
— *græca.* 1715.
Petiveria *alliacea.* 1725
Peucedanum *officinale.* 1726
Phalaris *arundinacea.* 1727
— *canarienſis.* 1728
— *nodoſa.* 1729
— *utriculata.* 1730
Phaſeolus *vulgaris. b.* 1731
Phlomis *fruticoſa.* 1736
— *Herba venti.* 1738
— *Leonitis.* 1306
— *Lychnitis.* 1742
— *purpurea.* 1740. 1741
— *ſantia.* 1745
— *tuberoſa.* 1746
Phlox *carolina.* 1375
— *glaberrima.* 1747

Phormium *Hyacinthoïdes.* 1163
Phylica *ericoides.* 87
Phyllanthus *Niruri.* 1602
Phyllis *Nobla.* 1748
Phyſalis *angulata.* 102. 1749
— *curaſſavica.* 101. 1750
— *penſylvanica.* 104
— *pubeſcens.* 1751
— *viſcoſa.* 1752
Phytcuma *comoſa.* 1877
Phytolacca *decandra.* 1753
— *octandra.* 1756
Picris *Echioides.* 1133
Pimpinella *Aniſum.* 171
— *magna.* 2269
Pinus *Cedrus.* 1278
— *Larix.* 1277
Piper *obtuſifolium.* 1970
Piſtacia *Lentiſcus.* 1301
Piſum *maritimum.* 1763
— *Ochrus.* 1609
— *ſativum.* 1765
(*Ejuſd. var. c.*) 1764
Plantago *afra.* 1766. 1827
— *aſiatica.* 1768
— *coronopifolia.* 701
— *Cynops.* 1769. 1826
— *Lagopus.* 1767
— *mariiima.* 1771
— *media.* 1770
— *Pſyllium.* 1829
Platanus *occidentalis.* 1773
— *orientalis.* 1774
Plumbago *zeylanica.* 1775
Poa *anguſtifolia.* 1776
— *annua.* 1777
— *ciliaris.* 1778
— *compreſſa.* 1779
— *Eragroſtis.* 1780
— *pratenſis.* 1782
— *rigida.* 1783
— *trivialis.* 1784
Podophyllum *peltatum.* 150
Poinciana *pulcherrima.* 2052
Polemonium *cæruleum.* 1786
— *reptans.* 1785
Polycarpon *tetraphyllum.* 114. 1794
Polycnemum *arvenſe.* 1795
Polygala *myrtifolia.* 1796
Polygonum *amphibium.* 1800
— *Biſtorta.* 352
— *Convolvulus.* 896
— *divaricatum.* 1107
— *Fagopyrum.* 895
— *orientale.* 1719
— *penſylvanicum.* 1718
— *Perſicaria.* 1717
— *ſcandens.* 1801
— *virginianum.* 1716
Polymnia *Uvedalia.* 1651
Polypodium *aculeatum.* 916. 1802. 1804
— *cambricum.* 1803
— *Filix mas.* 917
— *fragile.* 918
— *vulgare.* 1807
Populus *balſamifera.* 1808. 2184
Potentilla *alba.* 1854
— *anſerina.* 1810
— *argentea.* 1856
(*Ejuſd. var. a.*) 1857
(— — *c.*) 1860
(— — *d.*) 1858
— *fruticoſa.* 1710
— *monſpelienſis.* 1708
— *multifida.* 1811
— *norvegica.* 1812
— *penſylvanica.* 1706
— *recta.* 1861
— *rupeſtris.* 1707

Digitized by Google

— *verna.* 1859
Poterium *Sanguiſorba.* 1761
Prenanthes *alba.* 1814
— *muralis.* 566
— *purpurea.* 567
Primula *farinoſa.* 1817
— *veris. c. acaulis.* 1816
Prunella *grandiflora. b. vulgaris.* 1819
— *laciniata.* 373
— *vulgaris.* 375
(*Ejuſd. var. e.*) 374
Prunus *canadenſis.* 523
— *luſitanica.* 1663
— *Mahaleb.* 522
— *Padus.* 524. 1664
Pſoralea *bituminoſa.* 2278
(*Ejuſd. var. b.*) 2279
— *bracteata.* 2290
— *corylifolia.* 1824. 2399
— *Dalea.* 757
— *pinnata.* 314. 1825
Ptelea *trifoliata.* 933
Pteris *aquilina.* 1836
Pulmonaria *virginica.* 1845
Punica *Granatum.* 1848
(*Ejuſd. var. b.*) 1847
Pyrus *baccata.* 709

Q

Quercus *Ilex.* 1228. 1852
— *Suber.* 1853

R

Ranunculus *aconitifolius. b.* 1862
— *acris. b.* 1872
— *amplexicaulis.* 1870
— *arvenſis.* 1863
— *auricomus.* 1864
— *bulboſus.* 1865
— *falcatus.* 1866
— *Ficaria.* 1874
— *flammula.* 1867
— *illyricus.* 1869
— *parviflorus.* 1868
— *pyrenæus.* 1871
Rauwolfia *caneſcens.* 1882
Reſeda *alba.* 1883
— *lutea. b.* 1884
— *Phyteuma.* 1886
— *undata.* 1887
Rhamnus *catharticus.* 1890
— *Frangula.* 107
— *Paliurus.* 1668
Rheum *palmatum.* 1891
— *Rhaponticum.* 1273
Rhexia *virginica.* 1892
Rhus *Cotinus.* 702
— *glabrum.* 1895
— *radicans.* 1894
Ribes *nigrum.* 1898
Ricotia *ægyptiaca.* 1904
Rivina *humilis.* 1754
— *lævis.* 1755
— *octandra.* 1757
Robinia *Caragana.* 1905
— *hiſpida.* 1906
— *Pſeudacacia.* 23. 1820
— *pygmæa.* 247
Roſa *pendulina.* 1908
— *villoſa.* 1911
Roſmarinus *officinalis.* 1913
Rubia *peregrina.* 1914
— *tinctorum.* 1916
Rubus *arcticus.* 1917
— *odoratus.* 1918
Rudbeckia *anguſtifolia.* 676
— *hirta.* 1607
— *laciniata.* 800. 1606
(*Ejuſd. var. a.*) 1605
Ruellia *ſtrepens.* 1921

Rumex *Acetoſa.* 1922
— *Acetoſella.* 1923
— *ægyptiacus.* 1270
— *alpinus.* 1272
— *aquaticus.* 1271
— *bucephalophorus.* 36
— *digynus.* 37
— *Lunaria.* 34
— *Patientia.* 1274
— *roſeus.* 33
— *veſicarius.* 38
Ruſcus *androgynus.* 1925
— *Hypophyllum.* 1300
— *racemoſus.* 1926
Ruta *chalepenſis. a.* 1927
— *graveolens. d.* 1929
— *linifolia.* 1928

S

Salicornia *herbacea.* 1934
Salſola *altiſſima.* 558
— *Tragus.* 1247
Salvia *Æthiopis.* 2017
— *africana.* 1935
— *argentea.* 2016
— *canarienſis.* 2012
— *ceratophylla.* 2015
— *dominica.* 1936
— *glutinoſa.* 1156
— *hæmatodes.* 1938
— *hiſpanica.* 1939
— *Horminum.* 1155. 1940
— *indica.* 2013
— *lyrata. b.* 1162
— *mexicana.* 1942
— *nemoroſa.* 1944
(*Ejuſd. var. a.*) 2011
— *officinalis.* 1941
(*Ejuſd. var. b.*) 1943
— *pinnata.* 1946. 1947
— *Sclaræa.* 2009
— *Verbenaca.* 1160. 1161
(*Ejuſd. var. a.*) 1158
— *verticillata.* 1159
Sambucus *canadenſis.* 1948
— *Ebulus.* 1950
— *laciniata.* 1949
— *nigra.* 1951
— *racemoſa.* 1952
Samolus *Valerandi.* 1953
Samyda *ſerrulata.* 1062
Sanguinaria *canadenſis.* 548
Sanguiſorba *officinalis.* 1760
(*Ejuſd. var. b.*) 1759
Sanicula *europæa.* 1955
— *marilandica.* 1954
Santolina *Chamæcypariſſus.* 1959
(*Ejuſd. var. b.*) 1960
(— — *d.*) 1957
— *roſmarinifolia.* 1964
Saponaria *officinalis.* 1400
— *officinalis. b. hybrida.* 1395
— *orientalis.* 1390. 1965
— *Vaccaria.* 1397
Satureia *hortenſis.* 1967
— *juliana.* 2232
— *montana.* 1968
— *Thymbra.* 2231
Saxifraga *aizoides.* 1971
— *Cotyledon. c.* 1977
— *granulata.* 1976
— *hirſuta.* 1028
— *hypnoides.* 1974
— *oppoſitifolia.* 1972
— *ſtellaris.* 1978
— *tridactylites.* 1980
— *umbroſa.* 1029. 1981
Scabioſa *africana.* 1982
(*Ejuſd. var. b.*) 1983
— *alpina.* 1985
— *arvenſis.* 1999

— *atropurpurea.* 1997
(*Ejuſd. var. c.*) 1998
— *columbaria.* 1990. 1992
— *cretica.* 1988. 2003
— *graminifolia.* 1995
— *gramontia.* 1989
— *integrifolia.* 1987
— *ochroleuca.* 1996
— *rigida.* 1984
— *ſtellata.* 2000
(*Ejuſd. var. b.*) 2001
(— — *c.*) 2002
— *Succiſa. b.* 1994
— *tranſylvanica.* 1986
Scandix *auſtralis.* 2007
— *Cerefolium.* 2006
— *odorata.* 1568
Scilla *bifolia.* 2008
Scleranthus *annuus.* 2018
Scolymus *hiſpanicus.* 2020
— *maculatus.* 2019
Scoparia *dulcis.* 2335
Scorpiurus *ſubvilloſa.* 2023
— *ſulcata.* 2022
— *vermiculata.* 2024
Scorzonera *hirſuta.* 2267
— *laciniata.* 2026
— *tingitana.* 2027. 2138
Scrophularia *aquatica.* 2028
— *canina.* 2039
— *coccinea.* 2036
— *fruteſcens.* 2033
— *lucida.* 2040
— *nodoſa.* 2034
— *orientalis.* 2038
— *peregrina.* 2030
— *ſambucifolia.* 2031
(*Ejuſd. var. b.*) 2035
— *Scorodonia.* 2041
— *trifoliata.* 2037
— *vernalis.* 2029
Scutellaria *albida.* 2042
— *cretica.* 478
— *galericulata.* 480
— *lateriflora.* 2043
— *lupulina.* 477
— *orientalis.* 479
Sedum *Aizoon.* 147
Senecio *aureus.* 2047
— *Doria.* 794
(*Ejuſd. var. a.*) 799
— *elegans. b.* 1211
— *hieracifolius.* 2048
— *illicifolius.* 1212
— *longifolius.* 797
— *Pſeudochina.* 2049
— *trilobus.* 1214
— *viſcoſus.* 1216
Serapias *latifolia.* 1100. 2053
— *longifolia.* 2054
Seriola *æthnenſis.* 1190. 2055
Serratula *glauca.* 2059. 2060
— *noveboracenſis.* 2061
— *ſcarioſa.* 1203. 2062
— *ſpicata.* 593. 1195. 1204. 2063
— *tinctoria.* 2057
Seſeli *annuum.* 2064
— *montanum.* 2065
— *tortuoſum.* 2066
Sherardia *arvenſis.* 2067
Sibbaldia *procumbens.* 2072
Sibthorpia *europæa.* 2073
Sicyos *angulata.* 2075
Sida *Abutilon.* 13
— *criſpa.* 17
— *criſtata.* 21
— *indica.* 2077
— *periplocifolia.* 22
— *rhombifolia. a.* 1441
— *ſpinoſa.* 1441
Sideritis *cretica.* 2157
— *incana.* 2082

— *montana.* 1445
— *perfoliata.* 2082
— *romana.* 2083
— *ſcordioides.* 2084
Sigesbeckia *orientalis.* 879. 2086
Silene *acaulis.* 2087
— *amœna.* 1388
— *Behen.* 1381
— *buplevroides.* 1391
— *cretica.* 1404
— *Muſcipula.* 1401
— *pendula. b.* 1398
— *polyphylla.* 2090
— *quinquevulnera.* 1383. 2091
— *valleſia.* 2092
Silphium *Aſteriſcus.* 278
— *perfoliatum.* 2096
Sinapis *erucoides.* 2097
— *lævigata.* 2098
Siſon *Amomum.* 2108
— *canadenſe.* 1569. 2102
— *ſegetum.* 2109
Siſymbrium *barbareæ.* 2105
— *burſifolium.* 1120
— *Irio.* 2103
— *monenſe.* 2104
— *orientale.* 867
— *polyceratium.* 868
— *Sophia.* 2106
— *ſtrictiſſimum.* 1122
— *tanacetifolium.* 856
— *tenuifolium.* 855
— *vimineum.* 853
Siſyrinchium *Bermudiana.* 2107
Sium *Falcaria.* 145
— *nodiflorum.* 2110
— *Siſarum.* 2101
Smyrnium *integerrimum.* 2113
— *Oluſatrum.* 2112
Solanum *bahamenſe.* 2115
— *bonarienſe.* 2116
— *campechienſe.* 2117
— *ferox.* 2122
— *igneum.* 2132
— *indicum.* 2127
— *Lycoperſicum.* 1408
— *macrocarpon.* 2121
— *nigrum.* 2130
— *Pſeudocapſicum.* 2124
— *ſodomæum.* 2131
— *virginianum.* 2133
Soldanella *alpina.* 2134
Solidago *altiſſima.* 2368
— *cæſia.* 2376
— *canadenſis.* 2370
(*Ejuſd. var. c.*) 2367
(*Ejuſd. var. e.*) 2383
— *flexicaulis.* 2371
— *mexicana.* 2377
— *rigida.* 793. 2137. 2380
— *ſempervirens.* 2136. 2381
— *Virgaurea.* 2384
(*Ejuſd. var. c.*) 2379
Sonchus *maritimus.* 2141
— *tenerrimus.* 2139
Sophora *alopecuroides.* 2142
Sorbus *aucuparia.* 2144
— *domeſtica.* 2143
Spartium *junceum.* 962
— *radiatum.* 2146
— *ſphærocarpon.* 2145
Spermacoce *tenuior.* 2148
Spigelia *Anthelmia.* 2149
Spinacia *oleracea.* 2150
Spiræa *Aruncus.* 2389
— *crenata.* 2152
— *Filipendula.* 915
— *hypericifolia.* 2153
— *opulifolia.* 2154
— *ſalicifolia.* 2155

— *trifoliata.* 913
— *Ulmaria.* 2388
Stachys *annua.* 2079
— *arvenſis.* 1446
— *cretica.* 2158
— *germanica.* 2163
— *glutinoſa.* 2080
— *maritima.* 2164
— *palæſtina.* 2156
— *paluſtris.* 948. 2161
— *recta.* 2085
— *ſylvatica.* 946
Staphylea *pinnata.* 2165
— *trifolia.* 2166
Statice *Limonium.* 1324
— *monopetala.* 1323
— *Pſeudarmeria.* 2168
— *ſinuata.* 1325
— *ſpecioſa.* 2169
Styrax *officinale.* 2177
Swertia *perennis.* 2178
Symphytum *officinale.* 2180
— *tuberoſum.* 2181
Syringa *laciniata.* 2182
— *perſica.* 1319
— *vulgaris.* 2183

T

Tamarix *gallica.* 2187
— *germanica.* 2186
Tanacetum *annuum.* 2190
— *Balſamita.* 313
— *fruteſcens.* 2188
— *ſuffruticoſum.* 2189
— *vulgare.* 2192
— *vulgare. b. criſpum.* 2191
Tarchonanthus *camphoratus.* 665
Taxus *baccata.* 2193
Telephium *Imperati.* 2195
Tetragonia *fruteſcens.* 2196
— *herbacea.* 2197
Teucrium *Botrys.* 537
— *Chamædrys.* 539
— *Chamæpitys.* 545. 2200
— *flavum.* 535
— *fruticans.* 2198
— *hircanicum.* 2201
— *latifolium.* 2199
— *lucidum.* 533. 2202
— *Marum.* 1456
— *montanum.* 2203
— *multiflorum.* 536
— *Polium.* 1792
(*Ejuſd.* var. *b.*) 1791
(— — *d.*) 1790
— *pyrenaicum.* 1793
— *Scordium.* 2204
— *Scorodonia.* 2021. 2205
— *virginicum.* 2206
Thalia *geniculata.* 434
Thalictrum *aquilegifolium.* 2207
— *Cornuti.* 2208
— *flavum.* 2209. 2210
— *lucidum.* 2212
— *minus.* 2211
— *tuberoſum.* 2213
Thapſia *villoſa.* 2214
Theligonum *Cynocrambe.* 2216
Thlaſpi *arvenſe.* 2218
— *campeſtre.* 2221
(*Ejuſd. var. b.*) 2225
Thuja *occidentalis.* 2230
— *orientalis.* 2229
Thymus *acinos.* 621. 2233
— *alpinus.* 622
— *Serpillum.* 2234
(*Ejuſd. var. f.*) 2056
— *virginicus.* 1966
— *vulgaris.* 2235
Tilia *americana.* 2236

— *europæa. e.* 2237
Tordylium *apulum.* 2257
— *maximum.* 2258
— *officinale.* 2260
— *ſyriacum.* 2259
Tormentilla *erecta.* 2262
— *reptans.* 2261
Trachelium *cæruleum.* 2263
Tradeſcantia *virginica.* 843
Tragopogon *Dalecampii.* 2265
Trianthema *monogyna.* 1809. 2270
Tribulus *maximus.* 2273
— *terreſtris.* 2272
Trichomanes *canarienſe.* 59
Tridax *procumbens.* 2275
Trifolium *anguſtifolium.* 2276
— *arvenſe.* 2277
— *Cherleri.* 2281
— *clypeatum.* 2280
— *Lupinaſter.* 1369. 2283
— *Melilotus cærulea.* 1485. 2284
— — *cretica.* 2286
— — *indica.* 2285
— — *italica.* 1482
— — *meſſanenſis.* 1484
— — *officinalis.* 1486
(*Ejuſd. var. b.*) 1483
— *reſupinatum.* 2287
— *rubens.* 2289
— *ſquarroſum.* 2282
Trigonella *corniculata.* 920. 2291
— *Fœnum græcum.* 921
— *monſpeliaca.* 923. 2293
— *platycarpos.* 2292
— *polycerata.* 2294
— *ſpinoſa.* 922. 2295
Trillium *cernuum.* 2296
Trioſteum *anguſtifolium.* 1813
Triticum *maritimum.* 1781
Trollius *europæus.* 1105
Tropæolum *majus.* 53
Turnera *ulmifolia.* 2297
Turritis *hirſuta.* 2301
Tuſſilago *alba.* 1724
— *Farfara.* 2303
— *hybrida.* 1723
— *Petaſites.* 1722

V

Vaccinium *Oxycoccos.* 2304
Valantia *Aparine.* 197. 952
— *articulata.* 2305
— *Cruciata.* 2306
— *hiſpida.* 2307
— *muralis.* 722. 2308
— *Calcitrapa. b.* 2809
Valeriana *Cornucopiæ.* 2315
— *locuſta. c. coronata.* 2316
— *montana.* 2312
— *officinalis.* 2314
— *Phu.* 2310
— *pyrenaica.* 2311
— *ſibirica.* 2313
Vella *annua.* 2317
Veratrum *album.* 2318
— *nigrum.* 2319
Verbaſcum *Blattaria. b.* 353
— *Myconi.* 2321
— *phlomoides.* 2320
Verbena *bonarienſis.* 2325
— *caroliniana.* 2323
— *jamaicenſis.* 2071
— *nodiflora.* 2069. 2327
— *officinalis. a.* 2326
— *ſtæchadiſolia.* 2068
— *ſupina.* 2329
— *urticifolia.* 2328

Verbeſina

Verbesina *alata*. (Le N°. de cette espece a été omis par erreur typographique. Elle se trouve entre les N°s. 346 & 347.)
— *Nodiflora*. 334
Veronica *agrestis*. 2334
— *austriaca*. 2330
— *Chamædrys*. 2332
(*Ejusd. var. c.*) 2339
— *fruticulosa*. 2337
— *hederifolia*. 2333
— *incana*. 2344
— *longifolia*. 2345
— *montana*. 2338
— *officinalis*. 2336
— *spuria*. 2342
— *triphyllos*. 2331
— *virginica*. 2347
Viburnum *Cassinoides*. 482
— *dentatum*. 2348
— *Lantana*. 2351
— *Lentago*. 2350
Vicia *biennis*. 2352
— *dumetorum*. 2358
— *Faba. b. minor*. 2354
— *lutea*. 2355
— *narbonensis*. 2356
— *sylvatica*. 2359
Vinca *major*. 2361
— *minor*. 1731
— *rosea*. 2360
Viola *calcarata*. 2365
— *canina*. 2362
— *hirta*. 2363
— *montana*. 2364
— *odorata*. 2366
Vitex *Agnus castus*. 2385
Vitis *arborea*. 2387
Ulmus *campestris*. 2390
Volkameria *inermis*. 2391
Urena *lobata*. 1443
Urtica *balearia*. 2397
— *canadensis*. 2395
— *cannabina*. 2396
— *cylindrica*. 2393
— *divaricata*. 2394
— *nivea*. 2398
Uvularia *perfoliata*. 930

W

Wachendorfia *thyrsiflora*. 2402
Waltheria *americana*. 2404
Winterania *Canella*. 432

X

Xanthium *spinosum*. 2407
— *strumarium*. 2408
Xeranthemum *annuum*. (*var.*) 2409
(*Ejusd. alia var.*) 2410
(*Ejusd. alia var.*) 2411

Z

Zinnia *multiflora*. 2414
— *pauciflora*. 342. 2415
Ziziphora *capitata*. 2416
— *tenuior*. 45. 623. 2417
Zygophyllum *Fabago*. 891
— *Morgsana*. 892
— *sessilifolium*. 2418
— *sessilifolium. b. fulvum*. 2419

TABLE
DES MATIERES.

A

A Coſta. *Page* 392
Abeille brune. 347
Abeilles. 287
Abrégé de Lowthorp. 332. 347
Abricot. 372
Acacia (faux). 271
Acer *Negundo*. 269. 271
— *Platanoides*. 269
— *rubrum*. *Ibid.*
Acetoſa. 259
Acini pulchra ſpecies. *Ibid.*
Acorus *Calamus*. 285
Actes de Breſlaw. 286
— de Stockholm. 409
Ædidium. 302
Æſculus *Pavia*. 269
Æthuſa *Cynapium*. 351
Agaric. 343
Agaricoides. 263
Agaricus. *Ibid.* 302
Agaricus *piperatus*. 300
— *umbelliferus*. 301
Agneau de Scythie. 390
— de Tartarie. 391
Aira *præcox*. 276
Aiton (M. Guill.). 361
Aland (Iſle d'). 339
Alchemilla *vulgaris*. 277
Alger. 372
Alkekenge. 353
Alkekengi. *Ibid.*
Allemagne. 282. 371
Allium *vineale*. 285
— *urſinum*. *Ibid.*
Alpes ſuiſſes. 350
— tyroloiſes. 259
Amérique. 343. 375. 392
Ames (M.). 367
Ammanita. 264
Amœnitates Academicæ. Citées *paſſim*.
Amœnitates Exoticæ. 379
Amome (vrai). 391
Anagallis *tenella*. 279
Anchuſa *ſempervirens*. 266
Andrachné. 397
Angleterre. 257. 267 & *paſſim*.
Anis étoilé. 361
Anthoceros *lævis*. 298
Anthyllis *Vulneraria*. 291
Antiquités de Surrey. 374
— typographiques. 367
Aphtes. 346
Apoticaires (Compagnie des). 1. 2. 392
Appât pour les loups. 320
Apuleïus (Lucius). 366
Aquilegia *vulgaris*. 289
Arabes. 317
Arbor baccifera, &c. 388
Arbouſier. 266. 371
Arbre à café. 390
— à pain. 399
— conifere. 390

— d'argent. 389. 390
Arbres indigenes. 358. 360. 361
Arbutus *alpina*. 261
— *Andrachne*. 397
— *Unedo*. 269
Arcel. 338
Archipel. 327
Ardern (John). 367
Argol. *Voyez* Orſeille.
Ariſtolochia. 266
Ariſtolochia *Clematis*. *Ibid*.
Arnotto. 339
Art de la teinture. 328
Artocarpus *inciſa*. 400
— integrifolia. *Ibid*.
Arum *Dracunculus*. 266
Aſcarides. 347
Ashmole (Élie). 369. 372
Aſperula *odorata*. 277
Aſphodele. 266
Aſphodeles (gloire des). 371
Aſplenium *Adiantum nigrum*. 297
— *trichomanoides*. *Ibid*.
Aſſa fœtida. 379 — 381
Aſter *Tradeſcanti*. 266
Athamanta *cretenſis*. 260
Atlas tree. 390
Atropa *Belladonna*. 280
Aube. 359
Aubrey (M.). 374
Averrhoa *acida*. 385
— *Bilimbi*. *Ibid*.
— *Carambola*. 384
Auvergne. 333
— (montagnes d'). 334

B

Bagneres. 261
Baies de bourgêne. 281
— de myrtille. 286
— de nerprun. 281
Bain des pauvres. 262
Baltique (mer). 339
Baniſter (M. J.). 391
Banks (le Chev. Joſ.). 379. 400
Barametz. 391
Barbarie. 368. 371
Barcelonne. 264
Barrington (M. Daines). 358. 360. 361
Bartholin. 306. 348. 350
Bartram (M.). 319. 362. 398
Baſilic ſauvage (grand). 290
— — (petit). *Ibid*.
Bauhin (Gaſpard). 306. 317
— (Jean). 318. 321
Belladonna. 354
Bellon. 317
Bengale. 384
Bergius (M. P. J.). 357. 363. 375
Bibliotheque Ashmoléenne. 367
— Bodleienne. 366
— de M. Pepys. 373
— des Sciences & des Arts. 281
— du Chev. Hans-Sloane. 367
— Harleienne. 366
Biere. 286
Blackſtone (M.). 395
Bodœus à Stapel. 316
Boerhaave. 308. 309. 344
Boiſſon. 355
Boletoides. 263
Boletus. 262. 263. 301
Boletus *bovinus*. 302

Boranetz. 391
Boromets. *Ibid.*
Borrago. 266
Botanicon Parisiense. 278. 309
Botanique (le plus ancien livre anglois sur la). 368
— (renouvellement de la). 365
Boucliers. *Voyez* Écus.
Boules végétales. 395
Bourgêne. 281
Bredalbane (le Comte de). 358
Bretagne (Grande). 390
Breynius (le Doct. Phil.). 391
Brown (le Doct.). 318
Browne (le Doct. Patrick). 375
Brownea. *Ibid.*
Brownea *coccinea.* 376
— *Rosa de monte.* *Ibid.*
Brownée. 375
Bruce (le Doct. Robert). 384
Bruxelles. 371
Bruyere. 286. 287
Bryon. 316
Bryum. 257
Bryum *glaucum.* 298
— *hypnoides.* 257
Buchanan. 280
Buddle (M.). 305
Buis. 358
Byttelet. 335

C

Cacalia. 259
Cacao (arbre à). 387
Caernarvonshire. 333
Café (arbre à). 396
Calcutta. 384
Cambden. 257
Cambridge. 354. 373
Camelli (P. G.). 318. 391
Camerarius. 278
Campanula *glomerata.* 279
— *hybrida.* 280
— *patula.* 279
— *Speculum.* 280
Camruc. 384
Camrunga. *Ibid.*
Canaries (isles). 327. 328. 342
Canary weed. Voy. Orseille.
Cancer (remede contre le). 281. 282
Canella *alba.* 388
Cannelle. 388. 389
Cannellier. 267
— (vrai). 389
— sauvage. 388
Cap de Bonne Espérance. 389. 390. 396. 399
Cap-verd. 327.
Cardamine. 257. 260
Cardamine *hirsuta.* 290
— *impatiens.* 257. 290
— *trifolia.* 260
Carduus *eriophorus.* 294
— *heterophyllus.* *Ibid.*
Caryophyllata. 260
Cassia lignea. 389
Catalogne. 264
Catalogue de plantes. 1. 308. 390. 391. 398
Catalogus Nottinghamensis. 293
Caucalis *latifolia.* 282
Cecil (Guillaume). 369
— (Robert). *Ibid.*
Cedre. 316

Celtis *auſtralis.* 269
— *Siliquaſtrum.* *Ibid.*
Centaurea *orientalis.* 394
Ceraſtium *aquaticum.* 288
— *arvenſe.* 287
— *ſemidecandrum.* 288
— *viſcoſum.* *Ibid.*
Ceratophyllum *ſubmerſum.* 295
Cereus peruvianus. 393
Cerfeuil. 351
Ceylan (iſle de). 267. 388. 389
Chærophyllum *ſylveſtre.* 351
Chamærhododendros. 260
Champignon. 301. 303
Champignons (Claſſe des). 400
— (Table ſynoptique des). 263
Chanterella. *Ibid.*
Charbon de bourgêne. 281
Charlatanerie. 391
Charles I. 369
Charpente. 360
Châtaignier. 358. 360. 361
Chelſea. 2. 353. 392
Chêne. 359
— nain. 387
Chênes. 316. 356
Chiens enragés. 277. 343
Chine. 396
Chinois. *Ibid.*
Chryſoſplenium *oppoſitifolium.* 287
Cicuta. 351
Cicuta *viroſa.* 283
Cicutaria. 351
Ciguë. 351. 352
Cimetiere de Lambeth. 373
Cineraria *alpina.* 260
Cladonia. 313. 322. 327
Clavaria. 302
Clavaria *Coralloides.* 302. 303
— *Hypoxylon.* 262. 303
Clinopodium *vulgare.* 290
Coccus polonicus. 355. 356
Cochlearia. 257
Cochlearia *groenlandica.* *Ibid.*
Collinſon (M. Peter). 398
Colonie de Finlandois. 325
Colonies de l'Amérique. 396
Commelin. 269
Comment. in Boerh. Aphor. 344
Compagnie des Apoticaires. 1. 2. 392
Compton (Henry). 268
Conferva. 308
— *globoſa.* 395
Conifera alypi folio, &c. 390
Conium *maculatum.* 351
Conſomptions. 299
Conſtantinople. 317
Conſtipation de boyaux. 286
Convallaria *majalis.* 285
— *Polygonatum.* 266
Coqueluche. 299. 331
Coralloides. 304. 307. 312. 322. 326. 327. 331
Cork. 338
Corkir. 333
Corps de cypre. 318
Corylus. 271
Cotoneaſter. 260
Cotyledon *Umbilicus.* 287
Couleur brune. 346
— d'orange. 319. 321
— jaune. 281
— incarnate. 340
— verte. 281. 285

Crâne humain. 321. 322
Cratægus. 260
Cratægus *Aria.* *Ibid.*
Crete (iſle de). 327
Crocus. 391
Croton *glabellum.* 357
— *ſpicatum.* *Ibid.*
Cupreſſus. 266
Cupreſſus *diſticha.* *Ibid.*
— *ſempervirens.* 270
Cuſcuta *europæa.* 278
Cuſcute. *Ibid.*
Cyanus. 394
Cytiſus *Laburnum.* 270

D

Dale (M.). 305. 322
Dalibard (M.). 278
Dampier (M.). 343
Danois. 280
Dantzic. 391
Daphne *Laureola.* 287
Davidſon (M. George). 400
Dax. 261
Deering (le Docteur). 293. 301
Dentaria *bulboſa.* 395
Diarrhées. 318
Digitellus. 263
Dillen (le Profeſſeur). 274. 301. 305. 308. 312. 315. 317. 319. 321. 326. 333 — 335. 340. 346. 350.
Dioſcoride. 305. 316.
Dioſpyros. 260
Dioſpyros *Lotus.* 260
— *virginiana.* 270
Dipſacus *piloſus.* 276
Diſques. 337
Dixon (M. Guillaume). 395
Dodartia *orientalis.* 356
Doody (M.). 305
Doria. 360
Doucette. 280
Douglas (le Doct. James). 392
Dracontium. 266
Ducarel (le Docteur). 360. 365
Dugdale (le Chev. Guill.). 372

E

Ecarlate. 396
Economie de la nature. 336
Ecorce de chêne. 356
— du cannellier. 389
Ecoſſe. 350. 358
Ecoſſois. 280
Ecus ou *ſcutellæ.* 314. 342
Edimbourg. 379. 380. 397
Ehrard (le Doct. Balthaſar). 259
Ehret (M. George-Denis). 353. 397. 398
Elfneſwer. 347
Eliſabeth. 369
Elleborus. 371
Ellis (M. John). 361. 396 — 398
Empetrum. 257
Empetrum *nigrum.* *Ibid.*
Empoiſonnement des Danois. 280
Enum. Stirp. Helv. 283. 285. 286. 296. 310. 325
Ephémere. 266
Ephémérides d'Allemagne. 319
Ephemerum. 371
Epitaphe des Tradeſcant. 374
Equiſetum. 274

Erable (grand). 358
— de Virginie. 271
Erica. 257. 260
Erica *cinerea*. 257. 286
— *scoparia*. 260
— *tetralix*. 286
Erinaceus. 263
Eriocaulon *decangulare*. 397
Eriophorum *polystachion*. 275
Espagne. 264. 371
Etoile de la terre. 277
Europe. 265. 271. 282. 315. 328. 343. 350. 365. 368

F

Farine. 314
Fer (isle de). 328
Ferrailles. 356
Ferula *Assa fœtida*. 380. 381
Festuca. 257
Festuca *bromoides*. 258
Févier. 271
Fife (M.). 380
Filets. 356
— noircis à la fumée. 357
Filix mas. 258
Finlandois. 325
Fleurs femelles. 314
— mâles. *Ibid.*
Flora Anglica. 279. 282. 296
— *Lapponica*. 275. 276. 281. 283. 286. 296
— *Œconomica*. 300. 301
— *Prussica*. 340
— *Sibirica*. 284
— *Suecica*. 281. 292
Florence. 328
Floride. 361
Folkes (M.). 261
Fontainebleau. 329
Forster (M. J. R.). 355
Forte-ventura. 328
Fourrage. 276. 320. 325
Fragaria *sterilis*. 289
— *vesca*. *Ibid.*
Fraise. *Ibid.*
France. 279. 318
François. 318
Fraxinus *Ornus*. 270
Fructification (parties de la). 314
Fuchsius. 393
Fucus. 327. 342
— *thermalis*. 262
Fumaria *claviculata*. 291
Fungus. 262. 301. 303. 343

G

Galeopsis *Tetrahit*. 258
Galium *saxatile*. 260
Galles (pays de). 275. 326. 333
Gallium. 260
Gangrene. 282
Garcin (le Doct. Laurence). 264. 392. 393
Garcinia *Mangostana*. 393
Garden (le Doct. Alexandre). 396
Gardenia *florida*. 395
— *jasminoides*. *Ibid.* 396
Gascogne. 261
Gâteaux. 368
Gazon d'Olympe. 284
Gesner. 303
Gentiana *amarella*. 281. 295
George, Duc de Buckingham. 369
Geranium. 258
Geranium *dissectum*. 291
— *lucidum*. 258. 298

— *molle*. 291
— *pratenſe*. *Ibid.*
— *rotundifolium*. *Ibid.*
Gerard (John). 265. 306. 331. 368
Geſner. 278
Geum *montanum*. 260
Ghilan (montagnes de). 380
Gieſſen. 308. 346
Gilebertus legleus. 366
Ginſeng. 392
Gladiolus. 371
Glaieul. *Ibid.*
Gleditſchia *triacanthos*. 270. 271
Glen-lyon. 358
Gloceſtershire. 359
Gmelin (le Docteur). 277. 283
Goddart. 390
Gomera. 328
Gommes. 380
Gordonia. 397. 398
Gordonia *Laſianthus*. 398
Gothlande. 335. 339
Gottingue. 394
Gough (M.). 368
Goutte (remede pour la). 275
Gramen. 257
Grande Bretagne. 390
Graſſette (la). 275
Grece. 371
Greening. 359
Gronovius. 398
Guadaloupe. 388
Guinée. *Ibid.*
Guthrie (le Docteur). 380

H

Hales (le Docteur Etienne). 396
Haleſia *tetraptera*. 393
Hall en Saxe. 281
Haller (le Docteur). 277. 278. 280. 281. 283. 285. 286. 296. 305. 309. 310. 325. 394.
Hampton-court (Jardin d'). 268
Hans-Sloane (le Docteur ou le Chevalier). 2. 343. 367. 388 — 390.
Haſted (M. Edouard). 360
Hatton (le Docteur). 390
Hedyſarum *Onobrychis*. 292
Heiſter. 282
Helene (Ste.). 318
Hellot (M.). 327. 329
Helvela *Mitra*. 302
Helwingius. 340
Hémophthiſie. 345
Henriette-Marie. 369
Hépatique. 305. 306. 343
Herba viva. 392
Herbe de montagne. 349
Herbier. 265
— d'Hans-Sloane. 392
Herefordshire. 346
Herman (le Docteur). 390
Hermann (Paul). 267. 269
Hermeſias. 376
Heſter. 373
Hibiſcus. 397
Hieracium *murorum*. 294
— *umbellatum*. 293
Hill (le Docteur). 313. 330
Hippuris *vulgaris*. 273. 394
Hiſtoire des lichens. 304 & *ſuiv.*
— des plantes. 306. 313
— des plantes d'Eſpagne. 265
— des plantes de la Suiſſe. 393

— Nat.

— Nat. d'Iſlande. 349
— Nat. de Norwege. 320
Hiſtoria Muſcorum. 312
— *Oxonienſis.* 307
Hoffman. 274
Hollande. 268
— (États de). 267
Hollandois. 389
Hollar. 369
Hope (le Docteur John). 379. 397
Horminum. 260
Horrebow (M.). 349
Hortus Lugduni-Batavus. 268
Hottonia *paluſtris.* 279
Houblon. 286
Huxham (le Docteur). 332
Hydnum *imbricatum.* 301
Hydrophobie. 344
Hypericum. 397
Hypericum *humifuſum.* 293
— *pulchrum.* *Ibid.*
Hypnum. 322

J

Jacques I. 369
Jacquin (M.). 375
Jamaïque. 268
Jardin de Cambridge. 354
— de Chelſea. 2. 353. 392
— de Collinſon. 398
— d'Edimbourg. 380
— de fleurs agréables. 370
— de Fulham. 268
— d'Hampton-court. *Ibid.*
— de John Gerard. 265. 368
— de Kew. 399
— de Paris. 354
— de Paul Hermann. 268
— de Tradeſcant. 265. 370. 371
— du Duc d'Argyll. 266
Jardins curieux. 391
— d'Europe. 362
Jardinage. 268
Jartoux (le Pere). 392
Jaſione *montana.* 294
Jaſmin du Cap. 396
Jauniſſe. 340
Iberis *nudicaulis.* 290
Jéſuites (Miſſionnaires). 392
If. 358. 361
Illicium. 361
Illicium *floridanum.* 362
— *verticillatum.* 394
Imperatus. 328
Inchiquin (le Comte d'). 268
Indes orientales. 318. 342
Index alter Plantarum. 308
Indiens. 318
Inula *pulicaria.* 294
Iſagoge in rem herbariam. 264
Iſlande. 349. 350
Iſlandois. 348
Italie. 301. 316. 317
Iter helveticum. 277. 296
— *hercynium.* 350
Itinera. 300
Juglans *nigra.* 270. 271
Jungermannia *furcata.* 298
Juniperus *virginiana.* 270
Jus laiteux de la ciguë. 352
Juſſieu (M. Bernard de). 329

K

Kæmpfer. 379
Kalmoucks. 356
Kenkerig. 333. 339
Kew. 361

L

Lactuca. 258
Lactuca *ſaligna.* 293
Ladanum. 258
Lait de Suiſſe. 277
— des rennes. 314
— nauſéeux. 301
Lambeth. 265. 369. 372. 373
Lamium. 258
Lancerota. 328
Laponie. 283. 300. 319. 320. 323 — 326. 350
Lapons. 275. 323. 324
Laricus muſcus. 321
Larix. 260
Larves. 347
Laſerpitium *Siler.* 261
Lathræa *ſquamaria.* 395
Lathyrus *paluſtris.* 292
— *ſylveſtris.* *Ibid.*
Laud (l'Archevêque). 369
Laurifolia. 389
Laurus *Benzoin.* 270
Le Tourneur (M.). 399
Leiceſter. 282. 302. 303
Leiceſtershire. 272. 282. 285. 326. 335
Leucadendros. 389
Leyde. 268
Lichen. 305. 309
Lichen *aphthoſus.* 346
— *articulatus.* 320
— *barbatus.* 317
— *calcarius.* 334
— *calicaris.* 341
— *caninus.* 298. 299. 343
— *floridus.* 299
— *fragilis.* *Ibid.*
— *fuciformis.* 342
— *hirtus.* 299
— *iſlandicus.* 348
— *jubatus.* 320
— *lanatus.* 299
— *omphalodes.* 258. 338
— *parellus.* 334
— *parietinus.* 339
— *paſchalis.* 299. 326
— *plicatus.* 317
— *pubeſcens.* 259
— *pulmonarius.* 298. 299 345
— *pyxidatus.* 299. 331
— *rangiferinus.* 299. 323
— *Roccella.* 327
— *ſcxatilis.* 322. 338
— *ſtygius.* 340
— *ſubulatus.* 299. 323
— *tartareus.* 335
— *Uſnea.* 318
— *vulpinus.* 321
Lichenes. 310. 311. 322
Lichenoides. 258. 304. 308 — 348
Lichens (hiſtoire des). 304 *& ſuiv.*
Limnopeuce. 274
Lincolnshire. 280. 282. 288. 292
Linné. 275. 278 — 280 & *paſsim.*
Liſter (le Docteur). 332
Lithoſpermum *arvenſe.* 279
— *officinale.* *Ibid.*
Livre anglois (le plus ancien) ſur la Botanique. 368
Loblolly-bay. 397
Lombris. 347
Londres. 1. 257. 294. 328. 391. 397
Loughborough. 303
Loups. 320

Lowthorp. 332. 348
Lychnis. 258
Lycoperdon. 263
Lycoperdon *Carpobolus.* 394
— *ſtellatum.* 303
Lycopodium. 258
Lycopodium *complanatum.* *Ibid.*
— *Selago.* 259
Lyſimachia *nemorum.* 279
— *Nummularia.* *Ibid.*
— *vulgaris.* *Ibid.*

M

Madagaſcar. 317
Malabar. 389
Malayes. 393
Mangoſtans. *Ibid.*
Manuſcrits ſur la Botanique. 366. 367.
Maragnon. 388
Marchantia. 310
Martin (John). 257. 262. 333. 392. 393
Maſſon (M. Francis). 399
Matthiole. 316. 319
Méad (le Docteur). 299. 343. 344
Mechanical Account of poiſons. 344
Méditerranée. 342
Meleze. 316
Melica *nutans.* 276
Meliſſa *Nepeta.* 290
Mentha *gentilis.* *Ibid.*
— *ſylveſtris.* *Ibid.*
Merveille de la nature. 391
Merulius. 263
Meſpilus *Cotoneaſter.* 260
Micheli. 301. 305. 309 — 311. 314. 328
Middleſſex. 395
Miel. 287
Miller (M.). 354. 397
Millet (petit). 388
Mimoſa. 384
Mitchell (le Docteur). 265. 373
Moehring (le Docteur Paul-Henry-Gerard). 394
Moly. 371
Monro (le Docteur Donald). 400
Monteſquieu (M. Secondat de). 261
Montpellier. 318
Monument de Tradeſcant. 373
Morifolia. 270
Moriſon. 305. 307
Mortalité des beſtiaux. 283
Morus *tatarica.* 356
Mouſſes. 298. 306 & *ſuiv.*
Multiplication des eſpeces. 278. 310. 311
Mûrier. 356
Murray (M.). 363. 400
Muſa. 393
Muſca. 347
Muſco-fungus. 307
Muſcus. 306. 345. 349. 350
— *cumatilis.* 346
Muſéum d'Ashmole. 369
— de Tradeſcant. *Ibid.*
Mutellina. 278
Myriophyllum *ſpicatum.* 295
Myrrhis. 352

N

Nardus. 371
Nardus *ſtricta.* 276
Narciſſus *Pſeudonarciſſus.* 285

Nepeta *Cataria*. 290
Nerprun. 267. 281
Neufchatel. 264
Newark. 367
Newton (M.). 350
Nolana *proſtrata*. 354
Northamptonshire. 390
Norwegiens. 320
Nottinghamshire. 367
Nova Plantarum genera. 310
Noyer (nouvelle eſpece de). 391
— noir. 271
Nummulaire. 279
Nuremberg. 393
Nyctanthes *elongata*. 363

O

Obſervations botaniques. 393
Ophioglossum *vulgatum*. 297
Ophris. 398
Ophrys *lilifolia*. *Ibid.*
— *ovata*. 295
— *ſpiralis*. *Ibid.*
Opuſc. Bot. 296
Orchel. Voyez Orſeille.
Orchis *bifolia*. 294
Orme. 358. 361
Orobanche *major*. 290
Orſeille. 299. 306. 313. 323. 328. 334
— de terre. 334
Oſmunda *Lunaria*. 297
— *regalis*. *Ibid.*
— *Spicant*. *Ibid.*
Oxalis *ſenſitiva*. 392
Oxford. 369. 374
Oxycoccus. 258
Oxyoides. 392

P

Pan ſuecus. 286
Paraplégie. 282
Paris (jardin de). 354
Parkinſon. 275. 296. 306. 368. 370
Parnaſſia *paluſtris*. 284
Pêcheurs. 356
Peck (le). 257
Penſylvanie. 319
Perelle d'Auvergne. 334
Perſe. 380. 381
Perſil. 352
Petiver (M.). 305
Peucedanum *Silaus*. 282
Peuplier blanc. 359
Peziza. 263
Phallus. *Ibid.*
Pharmacopée de Londres. 344
— ſuédoiſe. 346
Pharmacopées. 317
Phaſcon. *Ibid.*
Phellandrium *aquaticum*. 282
— *Mutellina*. 278
Philadelphie. 398
Philippines (iſles). 391
Phthiſie. 349
Phyſalis *angulata*. 353
Phytologia tingitana. 390
Piémont. 356
Pihl (M.). 375
Pimpinella *magna*. 284
Pimprenelle. *Ibid.*
— jaune. 279
Pin d'Amérique. 271
Pinaſtella. 274
Pinaſter. 260
Pinax. 306
Pinguicula *vulgaris*. 275

Pins. 320
Pinus *Abies*. 270
— *Cedrus*. *Ibid.*
— *Cembra*. 260
— *Larix*. 260. 270
— *Picea*. 270
— *Pinea*. *Ibid.*
— *Tæda*. 270. 271
Piſtacia *vera*. 270
Pitt (M. Edmond). 388
Placodium. 314. 333. 335. 337
Plantago *lanceolata*. 277
Plantain. *Ibid.*
Plante aquatique. 261
— la plus ſimple. 274
— ſenſitive. 392
Plantes (famille de). *Ibid.*
— (maniere de conſerver les). 386
— alpines. 259
— du Peck en Derbyshire. 257
— indigenes. 399
— rares du Leiceſtershire. 272
Platyſma. 314. 340. 342. 343
Pline. 305
Plot (le Docteur). 286
Plukenet. 269
Poiſons végétaux. 272
Polygonatum. 266
Polygonum. 274
Polygonum *Biſtorta*. 287
Polypodium *aculeatum*. 298
— *Baromez*. 391
— *Filix famina*. 258
Pontoppidan. 320
Portobello. 375
Portrait de J. Tradeſcant. 369
Potentilla *alba*. 261
— *argentea*. 289
— *reptans*. 355
Poterium *Sanguiſorba*. 295
Poudre à tirer. 281
— d'*arum*. 284
— de Chypre. 341
— parfumée. 318
Poumon. 345
Prêles. 274
Prenanthes *muralis*. 259
Procédé pour les lichens. 329
Protea *argentea*. 390
Pruniers. 372
Pſeudo-narciſſus. 370
Pulmonaire. 294. 306. 313. 345
Pultney (M. Richard). 272
Pyrénées. 264
Pyxidium. 314. 330. 331

Q

Quercus *alba*. 270
— *Ilex*. *Ibid.*
— *Robur*. 356
— *Suber*. 270
Quinquefolium. 261
Quinquina. 332
— (nouveau). 400

R

Racine velue. 391
Radermachia *inciſa*. 400
— *integra*. *Ibid.*
Rage. 344
Rags. 346
Ray (M.). 305. 306. 319. 328. 329. 343. 348. 390. 395
Regnum vegetabile. 400

Reneaume (M.). 391
Rennes. 300. 324. 325
Reſeda *lutea*. 288
Rhamnus *catharticus*. 267
— *Frangula*. 281
Rhus *glabrum*. 270
Richardſon (M.). 305
Rimu. 399
Robinia *Pſeudacacia*. 270. 271
Robinſon (le Docteur Tancrede). 390
Roſa. 258
Roſa *alba*. *Ibid*.
— *ſpinoſiſſima*. 288
Roucou. 339
Rubus. 358
Rubus *cæſius*. 288
— *idæus*. 258. 288
Rumex *alpinus*. 259
— *maritimus*. 285
— *ſanguineus*. *Ibid*.
Ruppia *maritima*. 394
Ruppius. 274
Ruſcus *racemoſus*. 270
Rushton. 390
Ruſſes. 355
Ruſſie. 283. 286. 356. 371

S

Saffran. 391
Sainte Lucie (iſle de). 400
Saliaga. 318
Salicornia *herbacea*. 394
Salix. 258. 296
Salix *fuſca*. 296
— *pentandra*. 258
Salvador (M.). 264
Salvadora *perſica*. *Ibid*.
Salvia *glutinoſa*. 260
Samolus *Valerandi*. 280
Sang-dragon. 380
Sanguinaria. 274
Sapins. 320
Saxifrage. 284
Saxons. 365
— (mſſ.). 366
Scandix *Antriſcus*. 352
Scariola. 258
Scheuchzer (J. J.). 393
Schloſſer (le Doct. Albert). 354
Scirpus *ſylvaticus*. 275
Scleranthus *annuus*. 355
Scordium. 289
Scrophularia. 259
Scrophularia *Scorodonia*. *Ibid*.
Scutellæ. 314. 315. 337. 340
Scythie. 391
Sedum. 261
Sedum *rupeſtre*. *Ibid*.
Sel fixe. 277
Selago. 259
Senecio *erucifolius*. 394
Senſitives. 384
Serapias *grandiflora*. 295
Serapion. 318
Serpentaire. 391
Serres chaudes. 268
Sherard (M.). 305
Sibbald. 350
Sibérie. 283. 286
Sicomore. 358
Silene *nutans*. 258
Siler. 261
Sirop purgatif. 275
Siſon *Amomum*. 282
Sitodium *inciſum*. 399
— *macrocarpon*. *Ibid*.
Sium *latifolium*. 282
Skye (iſle de). 334. 397
Small (M. John). 372
Smoland. 321

Soar, riviere. 282. 285. 300
Soie des bords du Volga. 356
— du Piémont. *Ibid.*
Solander (le Doct. Dan. C.). 396
Solidago *Virgaurea*. 294
Solives. 360
Sorbus *pyriformis*. 388
Source (nouvelle). 262
— bouillante. 361
— de la Reine. 262
Southlambeth. 371. 372
Soutwark. 368
Soutwell (Robert). 386
Sparrman. 399
Species Plant. 363
Spécifique contre le cancer. 281
Spergula *nodosa*. 288
Sphagnum *paluſtre*. 298
Spotſwood (M.). 390
Stachys. 259
Stachys *germanica*. *Ibid.*
Stack (le Docteur T.). 264. 393
Staffordshire. 286
Stahl. 284
Statice *Armeria*. *Ibid.*
Stork (le Docteur). 351. 352. 362
Suede. 275. 281. 286. 300. 321. 340. 350
Suiſſe. 264
— (Plantes de la). 393
Synopſis ſtirpium britannicarum. 273. 308
Syringa *perſica*. 270
Syſtema vegetabilium. 363

T

Tænia. 347
Tanaïs. 356
Tanger. 390
Tanner (l'Evêque). 366
Taon des bœufs. 357
Tar-ſlough. 300
Tartarie. 390. 392
Taymouth. 358
Teignes. 377
Teinture écarlate. 338
— jaune. 321. 339
— noire. 356
— pourpre. 278. 327. 336. 338. 340
— rouge. 327. 336
Ténériſe. 328
Teucrium *Scorodonia*. 289
Thalictrum. 259
Thalictrum *minus*. *Ibid.*
Theophraſte. 327
Thorpe (M.). 360
Thunberg (C. P.). 399. 400
Thymus *acinos*. 290
— *alpinus*. 259
Tordylium *nodoſum*. 282
Tormentilla *erecta*. 355
— *reptans*. 289
Tormentille. *Ibid.*
Torneo. 283
Tortworth. 359
Tournefort (M. de). 264. 307
Toux invétérées. 299. 331
Tradeſcant (John). 265. 365. 368 — 372
Tradeſcantia *virginica*. 266
Tremella *Noſtoc*. 300
Treveris (Peter). 368
Trew (le Doct. Chriſtoph. James). 393
Trifolium *arvenſe*. 292
— *glomeratum*. *Ibid.*
— *ſcabrum*. *Ibid.*
— *ſtriatum*. *Ibid.*

— *ſubterraneum.* *Ibid.*
Triglochin *paluſtre.* 285
Truffes. 390
Tuber. 263
Tugus. 391
Tumeurs ſquirreuſes. 282
Turquie. 372
Tuſſilago *frigida.* 259
— *hybrida.* 294
Tylney (Comte de). 269

V

Vaccinium *Myrtillus.* 286
— *Oxycoccus.* 258. 355
Vaillant (M.). 274. 278. 305. 309
Valantia *Cruciata.* 296
Valériane. 371
Van-Swieten. 344
Veratrum *album.* 357
Verbaſcum *Blattaria.* 394
Veronica. 274
Veronica *officinalis.* *Ibid.*
— *ſcutellata.* 275
— *ſerpillifolia.* 274
Véronique. 274. 275
Vers. 347
Vers à ſoie. 356
Veſſes de loup. 303
Viburnum *prunifolium.* 270
Ville du Cap. 399
Villermont (M. de). 388
Viola. 259
Viola *calcarata.* *Ibid.*
Virginie. 320. 391
Viſcoſité du *caſſia lignea.* 389
Vitis idæa. 261
Ulva *inteſtinalis.* 300
Volga. 355. 356
Vomiſſement. 318
Vorceſtershire. 388
Voyage au Cap de Bonne Eſpérance. 399
Voyages dans l'intérieur de l'Afrique. *Ibid.*
Uplandois. 347
Upſal. 346
Uſnea. 259. 304 & *ſuiv.*
Ufnech. 317
Uſnée. 306. 312 & *ſuiv.*

W

Walker (le Profeſſeur Richard). 354
Walkeria. *Ibid.*
Waring (M. Richard). 398
Warwickshire. 336
Watſon (M. Guillaume). 265. 267. 268. 272. 294. 304. 351. 373. 394. 395
Wepfer. 283
White (M. Taylor). 389
Willis (le Docteur). 331
Willoughby (M. Fr.). 387
Winter (écorce de). 388
Winthrop (M. J.). 387
Witton. 266
Wood (Antoine). 368
Woodward (Th.) 400

Y

Yorkshire. 395

Z

Zollman (M.). 393

Fin de la Table des Matieres.

615226

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.





Fig. 6.

Fig. 4.